

DE PLANTIS
Epitome vtilissima,
PETRI ANDREAE
MATTHIOLI SENEN-
SIS, MEDICI EXCEL-
lentissimi, &c.

NOVIS ICONIBVS ET DESCRI-
ptionibus pluribus nunc primum dili-
genter aucta, à

D. IOACHIMO CAMERARIO ME-
dico inclytæ Reip. Noribergensis.

ACCESSIT CATALOGVS PLANTARVM,
quæ in hoc compendio continentur, exactiss.



M. D.



LXXXVI.

Cum gratia & privilegio S. Caesaræ Maiestatis ad hæc specialiter concessis.
FRANCOFVRTI AD MOENVM.

ILLVSTRISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
DN. MAVRICIO, LANTGRAVIO

Halsia, Comiti in Catzenelnbogen, Dietz, Zi-
genhan & Nida, &c. Domino suo
clementissimo,

S. D.

ILLVSTRISSE Princeps, Domine
clementissime, Quanquam iam dudum
nihil prius neque antiquius habuerim,
quam (sicut multis receperam) Latinum
opus Botanologicū collectum à me nō exi-
guis laboribus & sumptibus, tam ex inchoatis lucubrati-
onibus Medicie & Philosophi præstantiss. D. Conradi Gesne-
ri, p. m. quā meis observationibus proprijs quamplurimis,
tandē elaborando perficere atq; in publicū dare: hoc tamen
meum institutum huc usq; varia occupationes multaq; al-
lie cause retardarunt & quominus id ad optatum finem
perduceretur, impediuerunt. Cum vero imprimis, Illu-
striss. princeps, D. parens vester, Dominus meus clemen-
tissimus, pro sua Celsitud. singulari erga rem herbariam,
affectione, cuius ut est peritiss. ita etiam amantissima &
benignissima in me voluntate, quam nunquam satis præ-
dicare animo subiectissimo possum, me hac in parte muni-
fica liberalitate non parum adiuerit, ac simul etiam ali-

Epistola

quoties à me postulauerit, ut in cepto opere sedulo pergerem, illudq; omnibus modis urgerem, erubesco profecto nonnihil, ut verum fatear, quod nondum ipsius Celsitud. aliorumq; expectationi, quod tamen non mea culpa sed alijs remoris nonnullis subinde interuenientibus accidit, satisfacere potuerim. Interea autē, ne videar plane malum nomen (quod sane cupio à me esse longissimum) promissi huius admonere me ipsum, & illius loco, hoc aliunde desumptū specimen, Epitomen videlicet plantarū olim ab Excelentiss. Petro Andrea Matthiolo p.m. editam, & nunc rogatu amicorum & typographi à me pluribus in locis auctam nouisq; typis exornatam, ad V. Ill. CL. mittere statui, submissee orans ut V. Ill. CL. quam in sua ineunte iam aetate, quemadmodum ad omnes liberales artes & praecellera studia, ita quoq; ad utilissimam cognitionem stirpium, aliarumq; rerum naturalium peculiari quadam inclinatione ferri & exemplo paterno duci omnes norunt, mihiq; est perspectum, meo nomine apud Illustriss. principem Dominum parentem Vestrum, Dominum meum clementiss. intercedere, ipsiusq; Cels. persuadere non grauetur, me, quod dicitur, omnem lapidem moturum esse, ut primo quoq; tempore promissum opus, Deo adiuvante, absolua-
tur atq; in lucem prodeat. Præterea etiam ab V. Ill. CL. submissee peto atq; contendo, ut hanc exiguum meam opellam hilari benignoq; vultu accipere & me sua benignitatis fauore, sicuti hucusque Clementiss. fecit, imposterum quoq; complecti ac me sibi commendatum habere non dedigne-

Dedicatoria.

dignetur. Quod superest, ego Deum opt. max. dies noctesq; orare non desinam, ut V. Illustr. & praeclariss. indolisuo spiritu semper aſsit, & laudatiſſ. curſum uniuersae vite una cum illuſtriſſ. principe Domino patre ſuo, Domino & meccenate meo clementiſſ. ac ceteris illuſtriſſima Domus Haſſiaca principibus ſaluam & incolumem in omni proſperitate conſeruare quam diutiſſ. velit. Bene valeat V. Ill. CL. Norimb. Cal. Martij Anno Chriſti. 1586.

V. Ill. CL.

deditiſſ.

Ioachimſ Camerariuſ M.D.

)(

3

SERENIS-

SERENISSIMO PRINCIPI
FERDINANDO ARCHIDUCI
AVSTRIAE, DUCI BVRGVNDIAE,
*Ec. Comiti Tyrolis, Ec. Domino
suo clementissimo.*



AMETSTINGrauescente iam ætate decreuiss-
sem SERENISS. PRINCEPS, omiſſis ſtu-
dijs ac lucubrationibus, quod vitæ reliquū
erat, in otio atq; animi, & corporis tranquil-
litate tranſigere, cū tamen ab iſſis primor-
dijs is à natura ſim factus, qui ſemper putē, ſi
tantum poſſem, ſtudioſam iuuare poſteritatem, non potui
meam non immutare ſententiam, nec multorum precibus
non indulgere. Nam cū non pauci, qui diſcendæ medicæ
materiæ, magno ac feruenti tenentur deſiderio, me ſepe ro-
garent, vt in eorum gratiam atq; vſum Compendium con-
ſcriberem, in quo plantarum icones cum nominibus, &
compendioſa earum hiſtoria extarent, vteo duce quæcun-
que loca vbi ſtirpes proueniant, tutò ad eas noſcendas in-
dagandasq; adire poſſent, ne de ſua ipſorum in me confiden-
tia fruſtrarentur, Compendium hoc in eorum vſum con-
ſcribere decreui, quod quamuis ſuccincto ac Laconico ſer-
mone conſcriptum videatur, erit tamen (ni fallor) & gra-
tum, & perutile, non ſolū ijs, qui indagandis, noſcendisq;
ſimplicibus medicamentis, nauant operam, ſed ijs quoque,
qui hanc facultatem iam adepti, publicè morbis omnibus
paſſim medentur. Siquidem in hoc plantarum Compendio
non ſolū earundem omnium nomina, diuerſarum natio-
num idiomate conſcripta ſpectabuntur, & hiſtoriæ, ac qui-
bus o-

bus oriatur in locis, vt à me studiosi postulabant. Sed etiam qualitates cum primæ, tum secundæ, ac tertiæ & omnium quoque vires, ac singularia quædam nostra auxilia compendiosè descripta sunt. Caterum vbi quispià plura, melioraq; legere concupierit, ad nostra amplissima in Dioscoridem commentaria se conferre poterit, vbi (vt spero) quæ desiderabit, inueniet. Atqui cum in adeo magnam molem opus illud excreuerit, vt haud commodè hinc inde circūferri possit, non sanè absque ratione rogarunt me studiosi, de quibus diximus, vt Compendium conscriberem: quod cum rectè factum iri cognouerim, eò quoque libentius ad eum conscribendum me appuli, vt noscat futura posteritas quot modis Matthiolus illam iuuare contenderit. Verum quoniam apud omnes scriptores mos inualuit, vt sub magnorū Principum, Heroumq; nominibus, & auspicijs, sua scripta quicq; in lucem producant, cum ego quoque id ipsum institutum sim semper sequutus, haud alijs iustius, & rectius compendium hoc meum consacrare potui, quàm tuæ Amplissimæ Celsitudini, quòd iam in sextum decimum annum in eius corporis cura (quæ sua est clementia, & optima de me opinio) primarij Medici munere fungar. Huc accedit, quòd quicquid est meæ substantiæ, & facultatum, id sanè omne tuæ Celsitudini acceptum referre possum. Quin etiam eiusdem liberalitate, beneficentia ac dilectione foveor, sustentor, & alor. Siquidem hæc me multis modis, si haud ad reponendam gratiam, saltem ad declarandam gratitudinem, vel gratitudinis conatum me reum statuunt: quare cum Celsitudini tuæ mea hæc, qualiacunque sint, ei iure debeantur, eam suppliciter peto, vt hæc meas lucubrationes, & plantarum veluti manipulem libellum alacriter ac be-

nignè excipere, meq; in hac laboribus confecta ætate, suo
patrocinio, gratia, & fauore prosequi, ac tueri non desinat.
Vicissim ego, quæ fidelem seruitorem, & Clientem decent,
summa fide, ac voluntate, pro virili mea vsque ad occasum
vitæ meæ me præstiturum polliceor, meq; totum tuæ Cel-
situdini dedo, ac voueo: quam Deus Opt. Max. incolumem,
& modis omnibus florentem quàm diutissime conseruet.

E. Sereniss. Celsitud. tuæ

Fidelis & humilis Seruitor

Petrus Andreas Matthiæolus.

BENE-

BENEVOLO LECTORI IOACHIMUS
Camerarius Medicus, S. D.

SINGULARIS amor & innata quadam propensio ad cognitionem rerum naturalium, imprimis verò erga studium rei herbaria, ex quo non solum liberalis admodum oblectatio, & ingenua voluptas percipi, sed etiam utilitas atque fructus non exiguus ad Medicum imprimis peruenire solet, me incitarunt, quo semper nullis laboribus aut sumptibus pro ratione mearum facultatum parcendo studuerim, hoc tam praeclarum & tantum prosequi, excolere, atque etiam pro virili illustrare. Quae causa fuit, ut ante aliquot annos, opera & humanitate eximia Cl. V. D. Casparis VVolfy Medici Tigurini doctissimi, cōsecutus fuerim Opus istud amplum & laboriosum (quamuis solummodo adhuc inchoatum & sparsim minoribus in cartis quamplurimis annotatum) quod seculi nostri (ut verè quidam vir doctus illum nominare consuevit) alter Plinius, Doctiss. vir D. Conradus Gesnerus p. m. iam dudum in manibus habuit. Idq; in ordinem redigere, elaborare & proprijs meis obseruationibus additis, tandem ad utilitatem communem in publicum dare iam pridem constitui, à quo meo proposito, accedentibus praesertim amicorum multorum, qui editionem hanc expetunt, quotidianis adhortationibus, me nullis alijs rebus auocari patiar.

Cum verò hac in parte varia occupationes & longiores nonnulla mea superiorum annorum peregrinationes, non parum impediementi mihi obiecerint, quo minus extremam manum huic operi imponerem, in ista autem bibliotheca herbaria D. Gesneri aliquot plantarum icones partim iam sculptas, partim solummodo delineatas reperissem: quidam non solum artis Medicae peritis. sed etiam nonnulli magni nominis viri φιλοσοφῶντες, à me postularunt, ut reliquam partem typorum, etsi profecto maxima pars adhuc cōcinnanda restabat, eodem modo curarem parari, atque interea dum alterum volumen, de quo superius dixi, absolueretur, hanc Epitomen Excellentiss. Medici Petri Andreae Matthioli, &c. (cum illius exempla apud nos pauca inuenirentur, & typographi ideo ea recudere cuperent) auctam prodire in lucem sinerem.

Quanquam verò in eiusmodi scriptis aliorum expoliendis, certis de causis non libenter verser, atque in illa multum temporis mihi insumendum non existimem (neg. mihi aliorum de illis ignota sunt iudicia) sed potius ad proprias lucubrationes, qualescung; sane illae sint, elaborandas me conuertere totis viribus studeam: tamen alijs hanc editionem à me requirentibus honestè hoc officium denegare non potui, omnino mihi persuadens, beneuolum lectorem candido animo, dum meliora, volente Deo, consequantur, hosce meos labores accepturum,

pturum, meq; pro sua humanitate ad reliqua quæ in manib. habeo recte absol-
uenda, libenter esse adiuturum, quod equidem, ut faciat, illum magnopere ro-
gatum velim.

Quam assidua autem diligentia & accurata inspectione opus sit, in pictori-
bus & sculptoribus recte instruendis, qui (ut hoc & simile genus artificum so-
let) præter alia mirifica ac sæpenumero permolesta vitia, potissimum idio, vici-
orum quadam laborant, & ego ad fastidium usque iam pridem sum expertus, &
norunt alij, quibus cum eiusmodi ingeniis aliquid fuit negotii. Nisi enim quis-
piam continuo illis assistet, eosq; instiget, urgeat atq; instruat, ne elegantia nescio
quam, nimirum qualem ipsi somniant, affectet potius quam genuina proprie-
tati stirpium animum aduertant, vel negligentius etiam sæpenumero tractet,
atq; peruertant omnia, facillime aliquid deprauari & naturalem gratiam atq;
formam amittere solet.

Cum verò aliorum negotiorum multitudo, & crebra ad exteros auocatio-
nes me illis præsto semper esse minime permiserint (quamuis ante operis absolu-
tionem, nam initio mecum esse non illi fuit concessum, perdoctus & diligens
admodum iuuenis M. Ioach. Iungermannus meæ sororis filius ad hanc partem
Medicina illustrandam planè natus, mihi ut plurimum vsui fuerit) non caue-
ri ideo potuit, quin interdum, ubi præsertim æugustæ examinare peritiores
singula voluerint, aliquid desiderari vel etiam reprahendi queat, quem admo-
dum, exempli causa ingenna quadam confessione ipsemet quadam hic breuiter
indicare non dubitavi. Acori folia mucronata magis esse par erat. Phu maius
caule altiore indiget. Flores lasmini quinis plerumq; folijs ornantur. Cedri ma-
ioris coni calum spectare perhibentur. Chamaecerasi foliis minutas crenas abo-
lenit sculptor. Siliqua Ceratia fructus binos ternos aut plures sæpenumero con-
iunctos producit. Sycomori 2. folia nimis acuminata pinguntur. Sesami effi-
gies nusquam acurata inuenitur, eius folia inferiora tripartita ferè herbam
cannabinam emulantur, flores nonnihil cum digitali & antirrhino commu-
ne habent, ut nuper obseruavi in siccis Syriacis Clariss. viri Domini D. Leon-
hardi Rauwolfii, quas ipsemet pro singulari nostra amicitia liberaliter mihi
communicauit. Flores Xyli non exquisite picti pleniores esse debebāt. Auriculæ
muris folia iusto tenuiora & acutiora sunt, totius plantæ iconem aliquādo me-
liorem exhibebimus. Melanthium sylvestre alterum cornicula plerumq; graci-
liora, & curuiora, & exarcedn nonnunquam profert. Oblongam capsulam semi-
num Cannæ Indicæ, qualis pingitur, nondum vidi, triplicem enim, qualem
Ricinus, ut plurimum gignit, & quasi spinosam, sed non pungentem. Flores
stramonie utriusque pentagoni tantum visuntur, & potissimum in altera spe-
cie, quam Daturam vocant, plures tam fructus quam flores desiderantur, &

ordo foliorum ramulorumq; turbatus pictoris incuriam arguit. Eiusdem negligentia argumenta sunt in Ricino omissi geniculi. Et si qua sunt alia.


Horum omnium nomine confido beneuolum lectorem facile me habiturum excusatum, vel etiam meam qualemcumq; diligetiam esse approbaturū. Quod si Deus Opt. Max. vitam mihi & plusculum temporis quam hucusque factum est, atq; alia τὰ δέοις largitus fuerit, nihil in me laboris, studij aut opera desiderari patiar, ut promissa reliqua in hoc genere primo quoq; tempore à me expediantur & cum alijs communicentur.

Videbit autem mediocriter in cognitione herbaria versatus, plantarū icones, quantum fieri ob commemoratas causas potuit, nos studuisse, imitari in hoc CL. V. D. Conradi Gesneri institutum, non solum integras, quod ab alijs quoq; antea saepe est factitatum, sed præcipuas quoq; earum partes, ut sunt radices, caudices, caules, cortices, folia, flores, semina, fructus tam exterius quam interius ante oculos quasi per anatomiam quandam proponere. Vtinam verò plures typi essent nonnihil grandiores à D. Gesnero facti. Sed cum id à me postea mutari non potuerit, in ceteris eadem forma necessario fuit sequenda. Ceterum ubi nota asterisci* est apposita, de meo id esse additum profiteor. Omitti verò etiam quasdam stirpes, cum descriptionibus suis contigit, partim quod nobis vel nondum visa, vel ad manus non essent, ideòq; exactè pingi non possent. Partim quo caueremus ne nimium auctus liber modum excederet. In animo tamen habemus alteram quoq; partem concinnare, in qua illa, quas modo excludi necesse fuerat inter alias plures, locum inueniēt suum. Interea hac ipsa

beneuolus lector equi boniq; consulere & meos conatus in positorum promouere & ab obrectatoribus quibus τὸ μῦθεός potius quam
τὸ μῦθεός cordi est, morsibus defendere ut velit,
etiam atque etiam peto. Vale.

Iris, Græcè *ἰρις*.] Arabicè, *Asmenium*, & *Aiers*.] Italicè, *Giglio celeste*, & *Giglio pannonico*.] Germanicè, *Blau gilgen*, *Wellwur*, vnd *Himmel Schwertel*.] Hispanicè, *Lirio Cardeno*.] Gallicè, *Gl'yeul*, & *Flambe*.] Boemicè, & Polonicè, *Kosatce*.

I R I S.



G E N E R A.

Alterum domesticum, alterum sylvestre. MATT.
Illius tres numerantur species, versicolor,
lutea, candida. Huius tantum duz, Maior, &
Minor.

F O R M A.

Folia gladios referunt, flores versicolores Idem.
Iridis celestis modo habentur, caules læues,
cubitales, radices albicantes, solidæ, genicu-
latæ, numerosis inferna sede agnatis.

L O C U S.

Nascitur in hortis, & Viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & siccit ordine secundo. Inci- Auicenn.
dit, abstergit, trahit, aperit, concoquit, deij-
cit, emollit. Sarcotica est, acris, amara, & o-
dorata.

V I R E S.

Radix ex aceto pora, Serpentium morfi- DIOSC.
bus aduersatur. Recens ex melle subdita par- Gal.
tus extrahit: cocta, & illita strumas, veteresq; Auicenn,
duritias emollit: cum rosaceo autem, & ace-
to capitis dolores mulcet. Ex melle illita cum
albo veratro, maculas in facie delet. Huius
succus potus aquas extrahit, quin etiam bi-
lem crassam, & pituitam, ex hydromelite se-
ptem drach. pondere potus. Eiusdem deco-
ctum tineas ventris pellit, menses, & vrinas
ciet, dentium dolores mulcet, & pectus ex-
purgat. - Arida farina, cum cinnamomi, & MATT.

Anethi pondere dimidio, & croci momento, restium tumores, doloresque
tollit, vbi coccineo panno, albo meraco infuso excipiantur, & calidum appona-
tur. Hæmorrhoidas fori eijscit. Radicis succus naribus infusus cerebrum à pi-
tuita mirifice purgat. Potum radicis decoctum obstructions aperit, præfer-
tim vbi crassa fuerit impacta materia. renum calculoseijscit. Datur potandum
commodissime Ictericis & aqua intercutem laborantibus. Eadem in passo de-
cocta & cum hordeacea farina illita, parotidas bellè discutiunt.

Iris Sylvestris maior, Græcis, *Ἴρις ἀγρία*, *μεγάλη*.] Italis, *Giglio a Turro seluatico*.]
Germanis, *Wildblau Gilgen*.] Gallis, *Flambe Sauvage*.

IRIS SYLVESTRIS
MAIOR.

F O R M A.

MATT. Folia, caules, flores, radix,
perinde ac in domestica ha-
bentur, verum minora, & ru-
diora.

L O C U S.


Idem. Nascitur in saxosis colli-
bus, & asperis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccat, valen-
tius tamen quam domestica.

V I R E S.

Idem. Easdem cum domestica vi-
res habet, sed acriores, ac et-
iam valentiores.



IRIS

Iris Sylvestris minor, Græcis *Ἴρις ἀγρία, μικρά*.] Italis, *Giglio a Zorro piccolo*.] Aë quidam falso Iridem Illiricam vocant.

IRIS SYLVESTRIS
MINOR.



FORMA.

Folia habet Gladioli pat. MATT.
lo longiora, radicem tenuem, subrufescentem, inodoram, & graminis fere modo repentem, caulem breuem, florem cæteris minorem; odore Armenici mali, purpureum, & aureis quibusdam lineis varium.

LOCVS.

Nascitur in montibus, col libus, & pratis. Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, & extenuat or- MATT.
dine primo, aut secundo inchoante.

VIRE'S.

Præstat eadem, quæ cætera Iridis genera, minori tamen efficacia. Fit è floribus Idem.

oleum, quo quidam vtiliter vtuntur, ad tumentes ex partu mammas, & ad testium inflammationes.

* CHAMÆIRIS vel Iris humilis, Græce χαμαίρις.

CHAMÆIRIS.

F O R M A.

Longiora & angustiora
Gladiolo fereq; graminea
habet folia, radicem nodo-
sam, tenuem, utq; reliquæ
Irides, repentem, flores par-
ues, pulcre variegatos, odo-
re pruni maturi, sine caule
ferè, inter folia eminentes.

L O C U S.

Passim in pratis Austria-
cis ad radices montium sitis
prouenit, & propter venu-
statem floris in hortis ali-
tur.

Q U A L I T A T E S.

Calore cæteris non ce-
dit & potissimum foliorum
vrendi vis insignis est.

V I R E S.

Et hæc cum præcedenti-
um viribus cōueniunt. Sed
caute est agendum, propter
vim nimium causticam.*




Aco-

ACORVM, Græcis ἀζορον.] Mauritanis, Vage, aut Vgi.] Italis, Acorò, vulgò *perperam calamo Aromatico.*] Germanis, Kalmus.] Boemis *Prust Vuorec.*] Polonis, *Tatarskie, Ziele.*

ACORVM.

FORMA.



Folia habet Iridis, angustiora tamen : radices non dissimiles complicatas, nō in rectum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas. gustu acres; amaræq; odore haud ingrato.

Numerosis infima sede capillamentis. MATT.

LOCVS.

Nascitur in Ponto, Colchide, & Galatia. DIOSC.

QUALITATES.

Radix excalfacit, & siccatur. Auicenna, ordine tertio, incidit, aperit, prouocat, & acris est, amara, atq; etiam odorata.

VIRE.

Pota radix urinam, menses, & secundas trahit: lateris dolores tollit: Iocinorosos, & lienosos iuuat: Pectori quoq; prodest: urinæ stillicidijs, & a serpente demorsis mirificè auxiliatur, hocq; præsertim nomine in Antidotis additur. Hali-MATT.

rum mirificè commendat: decoctæ radicis vapor hianti ore exceprus tussim sanat.

CENSURA.

Proculdubio aberrant, qui Acorum calamum odoratum esse existimant, MATT. quemadmodum & qui Galangam Acorum faciunt.

ACORVM falsum. Græcis *Pseudonoxon*.] Italis, *Giglio giallo*, & *Acoro bastardo*.] Germanis, *Geel Effen*.] Gallis, *Flambe de Ruyeres*.] Boemis, *Kosatec* & *luti falešni*.] Polonis, *Miec* & *Konne Korzenie*.

ACORVM FALSVM.**FORMA.**

MATT. Folijsest Iridis longioribus, quemadmodum & caulibus, & floribus, qui tamé haud varicicolores, sed lutei spectantur, differunt tamen facie, quippe quod minores sint, & angustioribus folijs. Radice nititur Iridis maiore durioréq; , subrubente, & inodora.

LOCVS.


MATT. Nascitur in palustribus, & aquosis.

QUALITATES.

Radix, cuius tantum est visus, exiccat, sed non nisi parum exalfacit. Nulla enim est acredine prædita: attenuat, roborat, resolvit.


VIRE.

Constat multorum experimento, valere pseudoacorum, propria sua ipsius vi, ad omnes nervorum, & cerebri affectus.



MEVM, Græcis Μήν. Arabicis, Mu. Italis, Imperatrice. Germanis, Beernurk.

MEVM.



FORMA.

Folijs & caule anetho simili DIOSC.
lis est, binum ferme cubito-
rum altitudine attollitur, spar-
sis in obliquum rectumq; ra-
dicibus, longis tenuibus, odo-
ratis linguamque exalfacien-
tibus.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & MATT.
collibus apricis. Optimum af-
fertur ex Gargano Apulix mō-
te. In Hispania & Macedonia
copiosum.

QUALITATES.

Exalfacit ordine tertio, & Gal. lib. 7.
siccat secundo, incidit, dige- simp. me-
rit, aperit.

VIRES.

Radix ventriculi flatus dis DIOSC.
cutit, ictis à serpentibus miri-
ficè subuenit. Feruefacta radix

ex aqua, vel trita citra coctionem præclusos renes, & farctam quoque pituito-
sis excrementis, vesicam, atque vrinæ difficultatem expedit: quin etiam ventri-
culi flatus discutit: Torminibus, vterinis affectibus, articulorumque cruciati-
bus medetur. Auxiliatur quoq; pectoris fluxionibus ex melle delincta: Menfes
pellit in defensionibus addita. Infantium pubi illita vrinam mouet: caput attra-
men dolore afficit, vbi copiosius sumatur.

• *MYTTELINA, Meum alpinum, vel Caros alpinus, alijs Sefeli Creticum. I. Heluetijs Nutty vel Mutteren.

MYTTELINA.

FORMA.


Folia profert non ita tenuia vt Meum, nec tam lata vt Caros, sed medio quodam modo se habentia, nata ex radice quandoque minimi digiti crassitiem æquante, vt plurimum tamen minore, superiore parte barbara odorata & cum acrimonia dulci, vt Mei vel Dauci cretici. umbellam gerit florum ex albo purpurascentium.

LOCVS.

Nascitur in alpi^b, in monte Glarona & alibi in Heluetia.

QUALITATES ET VIRES.


Facile coniectu fuerit ex calfacere huius plantæ radicem, aromatica cum sit. Condiunt ea lactarij Colostrea & recoctam suam Glaronenses & Valesij. Eius pabulo in montibus vaccæ plurimum & optimum lac reddunt.*



CYPE-

CYPERVS, Radix oblonga, Plinio Cyperis, Græcis *κύπερος*, *ἑπίτομον ἰσχυρ.*] Afris Saherade. [Italis, *Cipero*.] Germanis, *Wilder Galgan*.] Hispanis, *Iuncia auelanada*.] Gallis, *Souchet*.] Boemis *Galgan plancy*.

CYPERVS.



* GENERA.

Duo genera Cyperi habentur, quorum differentia potior in radice, Dioscorides tertium addit, quod curcuma putatur.

F O R M A

Cyperus planta est, quæ por- MATT.
raceis ferme provenit folijs, longioribus tamen & exilioribus, caulem edit cubitalem, & nonnunquam maiorem, angulosum, alba intus medulla, ut in iunco, in cuius cacumine folia sunt minora, stellarum modo radiantia, inter quæ semen prodit spicatum herbacei coloris. Radices illi sunt subnigræ, coherentes, oblongis oleis similes, aliquando etiam longæ galangæ modo, quo fit ut hoc cyperi genus à nonnullis appelletur sylvestris galanga.*

L O C V S.

Nascitur hoc cyperi genus prope Timaui fontes, in lapidæ finibus.

Q U A L I T A T E S.

Radix absque morfu exarscit, & exiccat, quin etiam roborat, & adstringit: ac simul incidit & aperit. Eupolitica est, & odorata. Galen. 7. simp. me.

V I R E S.

* Radices vlceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice prosunt, vlceribus item oris conueniunt, & calculo vexatis congruunt, & urinam mensesq; prouocant.*

* *Cyperus rotundus*, Græcis κύπερος σπινθός,] Germanis Runder wilder
Galgant.] Ethiopibus nostro tempore Arabico vocabulo Soed dicitur.

CYPERUS ROTUNDUS.

F O R M A.

DIOSC. Folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora, Caulem odorati iunci cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices contiguas inter se oleis oblongis rotundisq; similes, nigro colore, suavi odore, amaro gustu.

L O C U S.


In lacunosis & palustribus nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Et huic calida vis inest.

V I R E S.


Venarum spiracula laxat, urinam ciet, Ad calculos aquamq; subtercutem vtilissime bibitur. Aduersus Scorpionum ictus remedio est. Per frigerationibus vuluæ & præclusionibus fori prodest, Pellit menses, Contra vlcera oris etiam si depascant vorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus & ynguentorum spissamentis adijci solet.*



N O M I N A.

CARDAMOMVM, Græcis Καρδάμωμον.] Mauritanis, *Cordumoni*.] Italis, *Cardamomo*.] Germanis, *Cardamomelin*.] Hispanis, *Grana de paraiso*.] Officinis, *Melegeta*, & *grana paradisi*.

CARDAMOMVM.



G E N E R A.

Triad nos afferuntur genera: Maius, Medium, & Minus. MATT.

F O R M A M A I O R I S.

Maioris capitulum fici, seu pyri faciem refert: semine intus subrufescente, angulosoque: Medium folliculo conregitur oblongo, triquetro, striatoque, in quo semen est oblongum, colore minus rufescente. Minus minore constat capitulo, ipsoque triangulari: semine subrotundo, asperiusculoque: semen omnibus acre & odoratum: maioris tamen acrius, & odoratius. Minus, ut medium acredinis vehementia superat, ita, & odoris fragrantia.

Idem.

L O C V S.

Afferitur in Europam ex Alexandria Egypti, ac etiam a Lusitanis ex India Orientali.

Idem.

Q U A L I T A T E S.

Semen facultatis est admodum calidæ, non tamen usque adeo, ut nasturtium, sed quanto

Gal. 7. simp. me.

suauius, magisque fragrans est, tanto imbecillior ei calida facultas est: quin etiam quiddam amaritudinis respicit. Cæterum hæc Galenus de suo scribit Cardamomo. MATT.

V I R E S.

Datur ex aqua comitialibus, Ischiadicis, yulhis, resolutis, torminosisque, & contra latus ventris tineas: ex vino verò renum affectibus, urinæ difficultatibus, scorpionum ictibus, ac cæterorum venenosorum animalium, auxiliatur: Idem cum radicis lauri drachma potum, calculos comminuit.

DIOSC.

C E N S V R A.

Cum in vulgari Cardamomo, quo passim utimur, nihil sit amaroris, nec eius odor caput feriat, nec semen fractu contumax sit, affirmare quidam non ausim, hoc nostrum, esse illud, cuius antiquiores meminerunt.

NAR.

NARDVS Indica siue spica Nardi, Græcè *Nάρδος*, *Nάρδου σάκκος*.] Mauritanis, *Stumbel*, siue *Senbel*.] Germanis, *Spitzenarde*.] Italis, *Spico*, & *Spigonardo*.] Hispanis, *Azumbar*, aut *Espic de sil.*] Gallis, *aspic de vltre mer.*] Boëmis, *Nardus Indiansky*.

NARDVS INDICA.**F O R M A.**

DIOSC. Spica non est, quæ in cul-
 morum summitate oritur. Sed
 Gal. radix quæ spicæ figuram habet.
MATT. Complures enim ab vna basi
 oriuntur spicæ, perinde ac in
 lilij aut allij radice, verum ca-
 pillaceæ, & comosæ, colore
 ferrugineo, pluribus ima par-
 te capillamentis, odore haud
 iniucundo.

L O C V S.


DIOSC. Nascitur in India in monti-
 bus, & circa Gangem fluuium.

Q U A L I T A T E S.

Gal. s. Excalfacit ordine primo, &
 simp. mc. siccat secundo completo: Ad-
 stringit, extergit, & aperit.

V I R E S.

DIOSC. Potavrinæ elicit, & aluum
 sistit, cohibet subposita vteri
 quascunque fluxiones. Præstat
 ad ventriculi erosiones, & flatus. Medetur spleneticis, & iocinorosis, atque et-
 iam ictericos iuuat. Auxiliatur eiûs decoctum in desensionibus, vteri inflam-
 mationibus: præstat & ad glabras oculorum genas, siquidem densiore pilo eas
 cohonestat. Additur in antidotis: & vritur in fictili nouo ad ocularia medica-
 menta.

**CELTIC.**

CELTICA NARDVS, siue Spica Celtica, Græcis, *Νάρδος κελτική.*] Italis, *Spica Celtica.*] Germanis, *Celtischer Nardus.*] Gallicè, *Nardus Gaulou.*] Boemis, *Celtika Nardus.*

NARDVS CELTICA.

F O R M A.

Exigua planta est, folijs oblongis, colore flauo, sed languido, floribus luteis. Caule tenui, & imbecilli, radice squamosa, Spicæ faciem referente, è qua tenues, & numerosæ prodeunt fibræ.

L O C V S.

Nascitur in Luguriæ montibus, in Istria, & in Carinthiæ, & Styriæ alpihus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit magis quàm Indica, minus vero siccatur.

Gal. lib. 8.
Simp. me.

V I R E S.

Eadem omnia præstat quæ Indica, & Syriaca: sed vehementius vrinam cit, & stomacho vtilior est, auxiliatur Iocinoris inflammationibus, & felle suffusus. Bibitur ex ab-

DIOSC.
Gal.

sinthij decocto ad ventriculi inflammationes, & ex meraco aduersus lienis, renum, & vesicæ vitia, & venenatos ictus.

* SPICA




* *SPICA* Celtica fastigiato flosculorum ordine à præcedente differens. Appius etiam Hirculus est & alia quæpiam cognata planta.

F O R M A.

Differt à superiore, quod cauliculi nō vt illi glabri sint, nec flosculi in umbellam congesti, sed ramuli aliquot, & ad horum exortus foliola adnascuntur, ita vt cōtinua serie superiora longitudine superata ab inferioribus vna cum insidentibus flosculis frequentibus, tendant in fastigium. Radix non discrepat, sed squamosa quoq; est, transuersaq; vltima parte veluti abrupta aut præmorsa, ab eius infima parte tantum fibræ deorsum tendunt alias simplici ordine, alias duplici triplicique, quod rarius est, & tunc ordine perturbato.

DIOSC. * Hirculus huic vere similis est sed odore graui, herba candidior sine cauliculo. minoribus folijs, radice neque amara neq; odorata.

† Cognata est Planta *Spica Celtica* odore, sapore & foliorum figura. sed radix cōspicua in tantilla plantula ad minimi digiti crassitudinem accedit sine squamis, fibræ in ima tantum eius parte subsunt.



L O C U S.

Nascitur hæc Celticae Nardi species in montibus prope Sedunum & alibi. Hirculus cum Celtica Nardo quæ eo adulterari solet, apportatur. Plantula autem peculiaris illa à Calceolario quondam pro vero Folio missa est.*

NARDVS montana, Græcis Νάρδος ὀρεννή. Italis, Nardo Montana.

NARDVS MONTANA.



FORMA.

Folia habet maioris Phu, MATT. sed minora: caulem spithamæ longitudine, umbellam puniceo colore. Radices duas Antoræ, aut testiculi modo, * & interdum plures * subnigricantes, ac fibratas, odore Phu, aut Afari.

Locvs.

Nascitur in Dalmatiæ montibus, & Cilicia. DIOSC. MATT.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit, sed cæteris longe minus. Gal. lib. 8. simp. me.

VIREs.

Iisdem cum cæteris viribus DIOSC. pollet. Sed illis quoq; ad cætera est imbecillior. Gal.

*NARDVS

*NARDUS MONTANA longius radicata. Græcis Νάρδος ὀρενὴ μακρορρίζος.

Habetur differentia quædam huius montanæ Nardi in radicibus potissimum, quæ interdum oblongæ visuntur, ut ex hac icone ex ipsa veritate desumpta patet. *



PSEUDO-

PSEUDONARDVS, seu Nardus Italica. [Italica, Spigo.] Gallis, *Aspic.* [Boemis, *Spirkanard domaci.*

PSEUDONARDVS SIVE NARDVS ITALICA.



GENERA.

Alterum mas, alterum foemina, quæ propriè Lauendula vocatur.

FORMA.

Mas folio constar latiore, MATT. longiore, robustiore, albidiorque; quam foemina. Tota planta fruticosa est, ac lignosa rosmarini modo, folijs numerosis, longiusculis, cauliculis tenuibus, angulosis, dodrante longioribus, spicatos flores gerentibus, purpureos, & odore fragrantibus, verum adeo acuto, vt nares feriat.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & locis saxosis, à Sole illustratis, & feritur in hortis.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat ordine secundo completo: Aperit, attenuat, resoluit, concoquit.

VIREs.

Confert omnibus frigidis cerebri affectibus. vetriculum roborat, & lecur ab infarctu li-

berat. Lienosos iuuat, vterum calefacit, & menses ciet. Flores ex vino decocti, & illiti urinam pellunt, & flatu dissolunt. Eorundem decoctum ictericis auxiliatur, à iocinoris infarctu affectis, additis Marrubio, & Fœniculi radicibus. Stillaritia florum aqua pota, amissam reddit loquelam: Præstat eadem ad animi deliquia cum pota, tum naribus, & arterijs admota. Oleum quod è floribus distillat, illinitur vbi excalfacere sit opus.

CENSURA.

Qui hanc plantam, aut lauendulam, Cncoron album esse contendunt, omnino hallucinantur.

PSEUDONARDVS Fœmina siue Lauendula.] Italis, *Lauanda*.] Germanis, *Sauendel*.] Gallis, *Lauande*.] Boemis, *Lauendula*.

PSEUDONARDVS FOEMINA
SIVE LAVENDULA.

FORMA.

MATT. Planta est fruticosa, pseudonardo similis, sed folijs angustiorib⁹, breuioribus, tenuioribusq; Floribus pariter purpureis, atque spicatis, sed patentioribus, & mitiore satis odore, ac magis grato.

LOCVS.

Idem. Oritur sponte in collibus saxosis, & apricis, sed plerumque in hortis, & viridarijs colitur.

QUALITATES.


Idem. Excalfacit, & extenuat, mitius tamen quam pseudonardus.

VIRES.

Idem. Ea omnia potest, quæ mas Pseudonardus. Atqui peculiariter vestibus interposita, eas à tinearum rossione vendicat, & odoratas reddit.


CENSURA.

Ridendo tenentur errore, qui Lauendulam Cneoron album esse farentur.



ASARVM, Græcis, *Ἀσάρον*, ac etiam *Νάδος ἄγρια*.] Arabibus, *Asaron*.] Italis, *Asaro*, & *Baccara*.] Germanis, *Haselwurth*.] Hispanis, *Asarabaccara*.] Gallis, *Cubaret*.] Boemis, ac pariter Polonis, *Kopytnik*.

ASARVM



FORMA.

Folijs est hederaceis, re-MATT. tundioribus tamen, ac minoribus, prælongis nitentibus pediculis, floribus purpureis, cytini effigie, semine vinaceorum nucleis simili, cauliculis angulosis, radicibus numerosis, geniculatis, tenuibus, & odoratis.

LOCVS.

Prouenit in vmbrosis mon DIO SC. tibus. In syluis, alijsq; opacis MATT. locis.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo, Mef. & ficit tertio, aperit, attenuat, resoleit, incidit, acris est, subamara, & odorata.

VIRES.

Vrinam cit, hydropicos, & DIO SC. ischiadicis iuuat. Pota aluū, Mef. & vomitiones ciet: pituitam;

& bilem deijcit. Facit quoq; ad iocinoris, & lienis infarctus & ad scyrthosos tumores. Confert quoq; diuturnis febribus ab obstructionibus prouenientibus. Radices senis drachmis ex mulso potæ menses trahunt. Oleum in quo Asarum diu fuerit insolarum, vna cum Ladano spinæ dorsi illitum sudores prouocat.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Asarum, & Baccharem nihil inter se differre contendunt.

ASARINA, Græcis *A'saglyn*.] *Ital*is, *Asarina*.

ASARINA.

F O R M A.

MATT. Folijs provenit Afari, rotundioribus tamen; scabris, leuiter circumferratis, humi acubantibus; cauliculis hirsutis: Floribus melinis anthemidis modo. sed minoribus. Radices mittit tennes, longasq; summatellure vagantes, acuto gustu, quadam cum leuifcula amaritudine.

L O C U S.


Idem. Provenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccat, quin etiam attenuat, incidit, aperit, & modicè abstergit.

V I R E S.

Idem. Herba ipsa, cum radicibus pota drachmę pōdere ex mulla, siue oxymelite, aluum exoluit, ducirq; crassam pituitam, & acres humores: quare præfertur rei herbariæ peritis ad Gallicæ luis dolores, & articulares morbos: Datur quoq; commode hydropicis, & ictericis: Sunt etiam qui ad comitiales eam commendunt, & ad neruorum resolutiones. Circa urinam, & menses, & intestinorum animalia necat.



Phv,

Phv, Græcis ποῦ aut Αἴγλια Νάος.] Mauritanis, Fu.] Italis, *Valeriana*.] Hispanis, *Terna benedetta*.] Germanis, *Waldrian*.] Boemis, *Košlyk*.] Gallis, *Valerienne*.] Polonis, *Koslek*.

P H V.



G E N E R A.

Genera habentur tria, Ma- MATT.
ius, Minus, Minimum.

F O R M A.

Maius folia fert. olus atrī seu DIOSC.
Elaphobosci: caulem cubita- MATT.
lem, aut proceriorem, læuem,
cauum, & purpurascentem ge-
niculatumq; , vmbellā ex pur-
pura albicantem, radicem mi-
nimi digiti crassitudine, adna-
tis inferiori parte fibris, subfla-
uo colore, odore graui, simul
& iucundo, nardum æmulan-
tibus.

L O C V S.

Nascitur in montibus, ac et- MATT.
iam campis, vlginofo solo.

Q U A L I T A T E S.

Excalcacit excessu primo, & Gal. lib. 8.
siccat secundo completo. Apetit, attenuat, concoquit, & prouocat. simp. mc.

Auicenn.

V I R E S.

Phu maioris radix vrinam, & menses cit, hausta flatus pellit, auxiliatur late- DIOSC.
ris compunctionibus. Præstat quoque aduersus stranguriam, veterem tussim, MATT
& asthma, cum dulci radice, vuis passis, & Aniso decocta. Miscetur Antidotis,
quod venenatis bestiis, & pesti resistat: oculorum claritatem adiuuat, vbi vi-
num, in quo decocta fuerit, guttatim instilletur. Additur quoq; in potionibus
internorum vulnerum.

PHVminus, Græcè ποῦ μινος.] Italis, *Valeriana minore.*] Germanis, *Gemein Valerian.*] Hispanis, *Xerubenedetta.*] Gallis, *Valerienne des prez.*] Boemis, *Kopitnik.*

PHV MINVS.

FORMA.

MATT. Folij provenit Fraxino, aut Sorbo similibus, nigricantibus, humi stratis: caulibus maiori similibus, sed longioribus. Umbella etiam simili, aut paulo minore: radicibus numerosis albicantibus, odore cum quadam gravitate iucundo.

LOCVS.

MATT. Nascitur humecto solo.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccatur valentius, quàm maius.


V I R E S.

Idem. Radix viribus omnibus prædita est, quibus & maior, gustu tamen acrior est: quo fit, ut maiori aperiendi, attenuandi quæ sit facultate. Nam & venenis magis resistit. Peculiariter autem valent eius radices ad testium tumores à frigiditate, aut flatu genitos: si in vino decoquantur: & vapore fumi suffiantur testes.



Phv minimum, siue *Valeriana montana* aut *palustris*. [*Italis, Valeriana minima.*]
Germanis, *Hein Baldrian*.

PHV MINIMUM.



FORMA.

Folio est maioris effigie, sed *MATT.* admodum minore, cauliculis angulosis, dodrantalibus, folijs vtrinque per intervalla emergentibus. Umbella in cacumine exigua, colore subpurpureo. Radice tenui, prælonga tamen, & numerosis capillamentis fibrata, iucundi odoris.

LOCVS.

Nascitur in montibus & planicie vliginose solo. *Idem.*

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat, sed cæteris minus. *Idem.*

VIRES.

Vires sunt illi, quæ cæteris eadem, sed longe imbecilliores. *Idem.*

B 4

**PHV*

* *Phu peregrinum*. *Valeriana rubra*; alijs *Polemonij species*, nonnullis *Been rubrum*, vel *Ocymastrum Valerianthon*.] *Parisienfib. Phu latifolium*.] Germ. frembder Baldrian/Gespörelster Baldrian.

PHU PEREGRINVM.

FORMA.

Caulib. oritur ab eadem radice, quæ crassiuscula est, alba & odorata, pluribus, duorum dodrantum altitudine, aut maioribus, læuibus, geniculatis, subcandidis, folijs latis, oblongis, in acutum desinentibus, pulcre virentibus. Flosculi oblongi, tenues, rubêtes eleganti purpura, caudati in caulicem fastigijs racematim diggeruntur stipanturque dense admodum, è quibus semina fiunt plumosa vt in cæteris Valerianis.

Locvs.

Circa Pisam Italiæ in ædificijs antiquis oritur, nec non in mœnijijs. Apud nos non nisi in hortis visenda.

QUALITATES.

Radix odorata dulcis cum grata acrimonia aliqua ac minima ferè amaritudine calida est in secundo gradu, sicca in primi fine.

APPENDIX.

Non desunt, qui putent esse *Narcissum Virgilij* in *Georg.* & *Columellæ* in horrorum cultu, cui *Dioscorides Flores Phu* comparauit.*



CASSIA solutiva, sine *Aegyptia Siliqua*.] *Officinis, simpliciter Cassia*.] *Italica, Cassia*.] *Gallis, Cassia laxativa*.] *Boemis, Cassia*.

CASSIA SOLUTIVA.



F O R M A.

Arbor qui Cassiam profert, MATT.
procera est, folio siliquæ acutiore, solida, ac compacta materie, pullo intus colore, cortice cinericio, radicibus magnis. Siliquas profert, sesquicubitales, teretes, ligneo putamine, sed tenui, ac fragili; colore in rubrum nigricante, nigra, pingui, dulciq; intus medulla, semine siliquæ omnino simili.

L O C U S.

Prouenit in Aegypto, sed pri MATT.
mas tenet, quæ circa Cayrum
shabetur.

Q U A L I T A T E S.

Pulpa excalfacit, & hume- Mcf.
stat ordine primo, resoluit, &
edat dolores.

V I R E S.

Sanguinem mundat, bilisq;
feriorem extinguit, aluum item commodissimè citat, vrinæ difficultatibus mirificè auxiliatur. Bilem & pituitam excernit, pectus, & fauces mulcet. Renes expedit, addita præsertim dulci radice. Frequenter deuorata, calculos in renibus renasci prohibet. Auxiliatur biliosa febre affectis, foelicus tamen operatur addito Hieræ puluere. Exteriori illi Erysipelas extinguit, & cæteras, quæ cute tenus habentur inflammationes. Sumenda parum ante cibum. Nam si secus sumatur, facili in nutrimentum transit.

*CASIA poëtica Monspelienſium.] Hiſpanis *Guardalobo.*

CASSIA MONSPELIENSIVM.

F O R M A.

Paruus eſt frutex Sparti caule ſtriato, folijs Lini, ſucculentis, colore nigricante, qui ramen nonnunquam ad ſeſqui cubiti altitudinem attollitur. Fert floſculos multiplices herbaceos flauſcentes, olei floribus ſimiles, ad foliorum exortus prodeuntes, & fructum deinde aſparagi marini æmulum, initio oblongum, in tres floris appendices deſinētem, qui matureſcit autumnō, & rotundior fit, Auguſto menſe rubescens, pulpa glutinoſa, ſapore & odore ingrato. Radix cortice craſſo, fulco vel ſubruſſo prædita eſt.

L O C V S.

In Romano, Narbonenſi agro vbere prouentu oritur, & alibi paſſim in Galloprovincia iuxta ſepes & oliuetorum margines, Nec non in Hiſpania vulgaris eſt.

Q U A L I T A T E S.

Nihil fere aromatici habet, ſed radix valide aſtringit.


V I R E S.

Quidam vtuntur radicis cortice in obſtructione iccoris.*

*COSTI



*COSTI RADICES.



Varia radicū genera pro costo ad nos afferūtur, quorum quādam hic appingere libuit. A. Costus est amarus pharmacopolarum, levis, alb^o intus, medulla per medium magna, lineis in cortice trāsuerſis, ingrato admodum & vitioso sapore, medicato tamen. B. Costi radix dodrātalis ferè, dura, insipidia, subdulcis, inodora, grauis, solidissima, tortuosa, inæqualis, rugosa nonnihil, fuscaq; foris, serra si seces, intus læuis, plana politaq; est, similis ferè rhaponticæ vulgo dictæ, id est, centaurio maiori, cui cognatam plantam esse crediderim. In medio partem modice cauam & in ea materiam alienam & terreum aliquid inuenire est, nescio an secundum naturam, vel potius vitio quodam. Radix certe mihi inutilis & afferri indigna videtur. Ne vsta quidem olet, cum succum reddit, præ duritie cultro fragilis est, minime

autem tenax. Macerata in aqua breui mollis euadit, & colore pallida. D. Costi pharmacopolarum species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à centro radicis ad superficiem ductis apparentibus multis, species videtur centaurei maioris, etsi odorem eius nō habet, saporem vero subdulcem. E. Costus Lusitanicus qui iridem redolet, digiti crassitudine, aut paulo crassior, superficies è ruffo ad fuscum tendit, aliquando subalbicat, substantia intus alba, laxa raraq; est & friabilis. F. Costi caulis pars infima, canna striata foris, intus multa medulla alba infarcta. G. Costus Arabicus. Omnino Zinziberi cognata radix videtur substantia & figura, habet & filamenta intus, sed maior crassiorque est & minus acris ac subamara, & suum quendam peculiarem saporem inter mandandum ostendit, color foris fuscus ferè, intus albicat, & ad luteum inclinat. Teredines etiam vt Zinziber sentit. *

COSTUS vulgaris, Officinis, Costus, [sed perperam.] Italis, Costo bastardo, & Costo di Puglia.

PSEUDOCOSTUS.

FORMA

MATT. Folijs exit pastinacæ domesticæ maioribus, dē floribusq; crispis, & asperiusculis, humi procūbentibus, caule cubitali, rotundo, geniculato, ramo foq; Umbellas in summitate gerit, floribus melinis. Semine nudo, ac subrotundo. Radice nititur vegeta, cortice crasso, ac carnolo, colore subalbicante, nō sine splendore.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Apulia, monte Gargano.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit ordine secundo completo. Aperit, abstergit, incidit, attenuat. Amara est, & acris.

VIRES.

Idem. Præstant (vt referunt, qui ad nos comportant) Pseudocosti radices ad omnes cerebri, & neruorum frigidus affectus, ad pectoris vitia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & vteri morbos. Ideoq; auxiliantur diutino capitis dolore affectis, vertiginosis, comitialibus, stupidis, veteriosis, conuulsis, resolutis, asthmaticis, tussientibus, ictericis, & hydropicis. Eadem flatus pellunt, vermes necant, vrinam ducunt, calculos pellunt, menses, & partus ciunt. Infunduntur earundem decocta, ad coli cruciatus, & coxendicum affectus.



IVNCVS odoratus, Græcis, Συών & ἀσπυρίδος.] Arabibus, Adcher.] Italis, Squin-
anto.] Germanis, Camelschew.] Hispanis, Paya de mequa.] Gallis, Squinanthum,
& pascure de Camely.] Boemis, Sijj Vuonne.

IVNCVS ODO-RATVS



FORMA.

Folia proferit caricis vel zæ robustiora, tamen sursum spectantia, & sese stipantia. Cul- MATT.
mos edit zæ modo, geniculatos, & flores in summitate odoratos. Radicē habet ima parte villosam, odoratamq;.

LOCVS.

Nascitur cum in Arabia, & Theoph. Syria, tū in campestribus, & pascuis, tum etiā vbi stagnantes aquæ siccantur.

QUALITATES.

Modicè exalfacit, modicè Gal. 8.
ceq; adstringit, nec plane à re- simp. mc.
nuitatis natura alienus est. A- MATT.
perit, digerit, pellit, incidit, excoquit, modicè adstringit.

VIREs.

Cit vrinam, & menses, fla- DIOSC.
rus resoluit, & venarum spiracula laxat. Epori flores medentur cruenta expuentib⁹, quin etiam ventriculi, pulmonis, iecinoris, renum, & vteri doloribus. Radix adstringentior est. Datur eadem vtiliter aliquot diebus potanda cum

pipere, hydropicis, atque conuulsis. Decoquitur ex gallinaceo iure tota planta, sitq; hinc potus admodum vtilis fœminis, quæ vteri doloribus in puerperijs laborant. Miscetur antidotis. MATT.

CENSURA.

Manifesto tenentur errore, qui contendunt Schanianthum, quo vtimur, esse suppositum.

CALAMVS odoratus, Græcis κάλαμος ἀρωματικός. Italis, *Calamo aromatico.*

CALAMVS ODORATVS.

F O R M A

DIOSC. *Melior est fulvus, dense geniculatus & qui assulosè frangitur, lenrus in mandendo cum aliqua acrimonia.*

L O C V S.

Theoph. Nascitur in India, quin etiam in Iudæa,
DIOSC. trans Libanum montem.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Modicè excalfacit, modicèq; adstringit,
simp. mc. nec planè à tenuitatis natura alienus est. Aperit, incidit, ac pellit.

V I R E S.


DIOSC. Vrinam potu ciet, quare decoquitur ad potiones cum apij semine ad hydropes: renum vitia, & vrine stillicidium. Menfes tum potus: tum in defensionibus additus pellit: sufficit vtiliter tussientibus, cum per se, tum cum resina Terebinthina, hausto per arundinem, aut infundibulum fumo. Expetitur ab vnguentarijs ad eorum odoramenta, nam & suffitionibus odoratis, & vnguentis adijcitur.

C E N S V R A.

MATT. Acori radices sunt, quæ in Myropolijs calami odorati vicem præstant. Siquidem odoratus calamus iam diu periit: verùm eadem Acori radices rectè admodum eius loco supponi possunt.


* A P P E N D I X.

Hæc frustula Calami odorati, quæ appinxi, cum pulchrè conuenirent Dioscoridis descriptioni, à doctissimo viro Bernardo Paludano Frisio, ex Syria & Aegypto reduce mihi & domino C. Clusio liberaliter communicata sunt.*



MYSCVS, Græcis, Βέρος ἢ σπλέγχος.] Aphris, Axnech, aut Ysnee.] Italis, Mosco.] Germanis, Moos.] Boemis, & Polonis, Mech.

MYSCVS ARBOREVS



FORMA.

Capillacea est materia, ex MATT. annolis plerumq; arboribus dependens, colore subalbicante, ac incano.

L O C V S.

Nascitur in quercubus, po MATT. pulo, cedro, picea, pinu, abiete, larice, & alijs quandoq; arboribus.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerat, sed parum, & Galen. 6. propinquum est fere medijs. simp. me. Adstringit, digeritq;.

V I R E S.

Huius dilutum ex vino pluribus dieb⁹ paratum, & haustum somnum inducit, ventriculum roborat, vomitiones, & alium cohibet. Recens decerptus, & oleo rosaceo imbutus capitis dolores Gal. Serap. MATT.

à calore exortos mirifice mulcet. Sanguinem è vulneribus, manantem compescit impositus arctèque adalligatus. Experitur quernus, lariceus, ac etiam abiegnus vnguentarijs ad pulveres odoratos parandos, quos Cyprios vocant.

MVSCV S TERRESTRIS. [Italis, Mosco terreſtre.] Germanis Beerlap.

MVSCVS TERRESTRIS.

F O R M A.


MATT. Longas viticulas, funiculi inſtar gignit, oblongis numeroſiſſimisq; foliolis vndiq; ſtipatas, quæ ſæpe ad ſeptem, octoq; vlnarum longitudinem protenduntur, compluribus vtrinq; adnatis ramulis. Serpit humi, nititurq; radicibus capillaribus plurimis, ex iſtis viticulis prodeuntibus, hederæ modo. Gignit quoq; Iunio menſe in ramuſculorum cacumine Iulos, Corylaceiſferè ſimiles, ſubflauo colore.

L O C V S.

Idem. Naſcitur in ſyluis, ſabuloſis, & inuijs locis, interfaxa.

FACULTATES ET
VIREs.

MATT. Præſtat eius decoctum ex albo meraco paratum, ad frangendos, educendosq; renum calculos. Decoctus in aqua, & deinde contuſus, mulcer admotus, & inflammationes, & earum dolores: proinde non deſunt qui hoc auxilium uſurpent ad calidam podagram. Superioris ætatis Pharmacopœi diu hac planta uſi ſunt, manifeſto errore, Celticæ Nardivice.



Crocvm, siue **Crocus**, Græcis, *Κρόκος*.] Arabis, *Zaffarān*, siue *Zafaran*.] Italis *Zaffarano*.] Germanis, *Saffran*.] Hispanis, *Azaffran*.] Gallis, *Zaffran*.] Boemis *Sfran*.] Polonis, *Szafan*.

CROCVM.

FORMA.

Comosis prouenit folijs, **MATT.**
longis, angustis, capillaceis,
planis, non rotundis, Trago-
pogoni modo: Floribus pur-
pureis, Colchico similibus, ru-
bentibus intus staminibus, in-
ter aureas quasdam ligulas ex-
ortis: Radice nititur bulbosa.

LOCVS.

Seritur in campis, & hortis, **Idem.**
bulbis tantum transpositis.

QUALITATES.

Excalfacit excessu secundo, *Gal. 7.*
& exiccat primo, quin etiam simp. me.
frigidi, terreiq; nonnihil ob- **DIOSC.**
tinet. Aperit, pellit, digerit,
roborat, & emollit.


VIRES.

Elegantem colorem præ- **DIOSC.**
stat: ex passo potum crapulam
arcer. Ex humano lacte illi-

tum oculorum fluxiones cohiber. Additur in porionibus, quæ interaneorum
causa temperantur. ad vuluæ etiam, sedisq; cataplasmata vtiliter inditur. Vene-
rem stimulat, vtile & aurium collectionibus. Læritiam affert, ob id additur v- **MATT.**
tiliter medicamentis ad cor facientibus. Sunt qui scribant exitiosum esse cro-
cum tribus drachmis in aqua potum. Vrinam mouet radix ex passo pota.

Hæc est facies croci vbidifloruit. Folia enim ipsius confestim longiora fieri incipiunt, nec amplius erecta consistunt, sed circumcirca in humum funduntur, atque sic per totam hyemem delitescunt sub niuib, donec estate ingruente subinde contabescant.

Approximus hic quoque radicem hirsuto inuolucro exutam, ut gemini sibi inuicem insidentes bulbi appareant.*




HELENIVM, Græcis, *ἐλενιον*.] Arabibus, *Iasin, siue Rafen*.] Vulgò officinis, *Enula campana*.] Italis, *Iella Enoa, siue Enola*.] Germanis, *Alant*.] Hispanis, *Rai de Alla*.] Gallis, *Aulned*.] Boemis, *Vuoman*.] Polonis, *Oman*.

HELENIVM.

FORMA.

MATT.



Folia habet Verbasco maiora, latiora, longioraq; hirsuta, & in acutum desinentia: caulē profert magnum, hirsutū: flores aureos Chrysanthemi modo, sed maiores: semen verbasci simile, ractu pruritum faciens. Radice nititur magna, vegeta, crassaq; intus alba, & exterius nigricante, subacri, & amaro sapore.

LOCVS.

Idem.

Loca amat Vliginosa.

QUALITATES.

Excalfacit, non tamen primo gustatu: verum calida, & sicca est, cum recrementitia humiditate. Aperit, prouocat, concoquit, incidit.

Gal. lib. 6.
simp. mc.
MATT.

VIRE.

DIOSC.

Porum radicis decoctum menses, & vrinas ciet. Auxiliatur omnibus pectoris affectibus in eclegmate sumpta, ob idq; datur asthmaticis, & suspiriosis: Eadem flatus pellit, & demorsos à serpente iuuat. Stomacho quoq; vtilis est in passo condita. Præcordijs medetur, & ventris tineas necat, illinuntur tum radix, tum folia, ad coxendicos affectus. Aqua à radicibus destillata, maculas in facie delet, & cutis nitorem conciliat.

GELSIMINVM, vel Iasminum, Arabibus, *Zambach*, *sive Sambach aut Iesemin.* [Ital. *Gelsimino.*] Germ. *Beiselreben.*

GELSIMINVM.

F O R M A.

MATT. Viticulosa, sarmentosaq; est planta, & topiario operi, umbraculisque contextendis peridonea. A radice viticulæ oriuntur longæ, flexiles, lentæ, viridesq; , è quibus oblonga prodeunt folia, septena ex uno pediculo, mollia, & in acutum desinentia, flores mittit modo cædidos, modo cæruleos, modo flavos, lilij parvi effigie, odoris perquam iucundi acutiq;.

L O C U S.

Idem. Amat amœnos, & calidos tractus, habeturq; in viridarijs, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Flores exalfaciunt, & siccant ordine secundo.

V I R E S.

Serap. Præstat oleum, quod infolatis in eo floribus paratur, ad omnes frigidos dolores, exalfacit enim & laxat.
Mef. MATT. Illinitur quoq; vtiliter mulieribus, ad frigidos vtericruciatus, frigidosq; quoscunq; neruorum, & articulorum affectus.

C E N S U R A.


Aberant, qui putant Iasminum vnguentum antiquis parari solitum, ex nostrate Gelsimino.



* *GELSIMINUM* Catalanicum. Vel *Chamægelsiminum* grandiflorum peramœnum.] Germ. Fremde Beierlehen/oder Jasminen mit grossen Blumen.

GELSIMINUM CATALANICUM.

F O R M A.



Humilius est & nequaquam scandit, surculosis ramulis vix cubito vel sesquicubito longioribus, folijs lasini vulgaris minoribus, nigrioribus & rotundioribus, floresque fert grandiores vulgaris quadruplo maiores & rariores, superne candidos, inferne parum subrubentes, odore acriori & suaviori, florēt autumnō & ferē per totam hyemem. Inferi solet in vulgare, & sic commodē propagatur.

L O C U S.

Alitur studiose in vrceis pensilibus.

STYRAX, Græcis, *Στόραξ*.] Arabibus, *Mehn* sine *Asttarach*.] Officinis, *Storac calami*.] Italis, *Storace*.] Hispanis, *Esforaque*.

STYRAX.

F O R M A.

MATT. *Styracis* planta coronæ malo similis est, folijs tamen minoribus solidis, robustis, subrotundis, lentis ramorum surculis. Flores habet albicantes, Auratiæ mali haud longè dissimiles. Baccas longis pediculis nitentes, albicante lanugine obductas, prominente anteriore parte cacumine.

L O C U S.

DIOSC. Nascitur in Syria, Iudæaq;.


MATT. circa Gabalâ, & Marathunta, quin etiam Pisidiam, Ciliciam, & Cassium Seleuciæ montem. Nascitur quoq; in Romano agro circa Tybur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. Excalfacit *Styracis* lachry-

simp. me. ma ordine secundo, & defie-

DIOSC. cat primo. Emollit concoquit, resolvit.




V I R E S.

DIOSC. *Styracis* lachryma medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & veteri præclulsionibus, duritiebusq;. Menses cit, cum illita, tum pora, aluum quoque emollit, si exiguum cum Resina Terebinthina, catapotij modo deuoretur.

MATT. Cum autem sit odorata, sufficit odoris gratia, & vnguentarijs expetitur ad odoramenta. Oleum ex ea paratum, hæc omnia valentius præstat.

PINVS, Græcè Πῖνος.] Arabicè, *Sonabar.*] Italicè, *Pino.*] Germanicè, *Fichtenbaum.*] Hispanicè, *Pino.*] Gallis, *Pin.*] Boemis, *Barounee.*] Polonis, *Soszna.*

PINVS.



GENERA.

Domesticum, Montanum, MATT.
Maritimum.

FORMA.

Domestica pinus, numerosos fundit ramos, superiori caudicis parte, circumuagantes, comosis, ac robustis folijs, longis, angustis, numerosis, & in cacumine aculeatis. Nuces edit magnas, ponderosas, compactas, solidasq; oblongis intrus nucleis, duro crassoq; putamine obductis, gustu dulci, ac iucundo.

Idem.

LOCVS.

Copiosa habetur, in agro Rauennate, non longe ab Adriatici maris litore. Habetur etiam & in alijs Italiae locis, & præsertim in Cœnobiorum hortis, & viridarijs.

Idem.

QUALITATES.

Cortex exiccat: folia refrigerant, resina autem exalfacit, discutit, & purgat. emollit.

VIRES.

Tusa, & illita folia inflamm.

DIOSC.

mationes prohibent. Suffusus cortex partus, & secundas eijcit, potus verò aluum sistit, & urinā ciet. Foliorum ex acero decoctum, viliter colluitur in dentium dolore; præstat idem, & nucis cortex, quin etiam ligni ipsius rædæ. Virides aciculæ contritæ, & ex meraco potæ, cordis dolorem sedant. Nuclei boni, crassiq; succi sunt, & multum nutriunt, sed non facile concoquuntur. Impinguant, Venerem sollicitant, rabidos, resolutos, & stupidos iuuant, & renum, & vesicæ vlcera sanant.

Gal. 2. de facul. aliment.

PINVS sylvestris, Græcè, *ελτος ἀγρία*.] Italicè, *Pino saluatico*.] Germanis, *Wildfich-tenbaum*.] Gallicè, *Pin sauvage*.

PINVS SYLVESTRIS MONTANA.

G E N E R A.

MATT. Alterum montanum, alterum maritimum: Huius duæ habentur species: illius autem tres.

F O R M A P R I M Æ.


Idem. Primæ in montano genere eadem ferè, quæ domesticæ facies est, coma tamè breuiori, folijs rudioribus, & acutioribus. Nuces edit Cupressinis paulò crassiores, longiores, & in acutum desinentes, resinosas, autumnò dehiscentes.

L O C V S.

Idem. Nasçitur in montibus, & cliuosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Cortex, sicciore præstat facultate, vt resina, calidiore quam domesticæ.



V I R E S.


Idem. Folia, cortex, resina, nuces eadem præstare possunt, quæ in domestica diximus, ac etiam valentius. Nucum recentium succus, vuluam angustiore reddit infusus, & mammas, nimis in virginibus extuberantes, cohibet. Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non adeò valenter.

C E N S V R A.

Non defunt qui pinum montanum hanc, Dioscoridis piceam esse contendunt, sed proculdubio hallucinantur.

Hanc Ananienses in Tridentino agro appellant Mugo. Latinis, Pinus Sylvestris repens dicitur. at Græcis, quod stipite careat, rectè *αἰτῖνος ἀστὲρ* vocari poterit.

PINUS SYLVESTRIS ALTERA,
MUGO DICTA.



FORMA.

Caudicem nullum edit, sed MATT.
humo tenus ramos à radice
fundit, qui lōgo tractu repunt.
Fructum profert prædictæ si-
milem, vegetiorē tamen pau-
lō, resinofum, nec inodorum,
nullo intus nucleo, qui mandi
possit.

L O C U S.

Nascitur plurimum in sum-
mis montium cacuminibus.
nos eam primū vidimus in
Rauena, Ananiensium mon-
te;

Idem.

QUALITATES.

Huic eadem sunt qualita-
tes, quæ cæteris pini generi-
bus.

Idem.

V I R E S.

Iisdem quoq; viribus pol-
let, quibus & cætera pinorum genera. Incolæ ramis vtuntur ad vasa vinaria cin-
genda, circulis inde paratis.

Idem.

PLINIVS PINVM Tarentinam appellat, Ananienſium & Rheticonum ſylva-
ni homines Cembro, & Cermolo.

PINVS SYLVESTRIS
CEMBRO.

F O R M A.

MATT.

Specioſa adoleſcit proce-
ritate, facie alijs haud abſimi-
li, ſpiſſiori tamen, actenuio-
ri coma: Strobilis piceis craſ-
ſitudine ſimilibus, breuiori-
bus tamen: ſubpurpureſcen-
tibus, fragilibusque: Nuces
concludit triquetras, dome-
ſticis longè minores, fractu
faciles, utpotè quæ dentibus
facile rumpuntur. Ineſt his
nucleus puſillus, dulcis, albi-
cans, ſubrufa còrectus mem-
brana, non ingratus eſui. Re-
ſinam caudex fundit albam,
& odoratam.

L O C V S.

Idem.

Naiſcitur copioſa in Ty-
rolenſi Comitatu, ac alijs cir-
cumſtantibus montibus in
Vulturenæ alpibus.

Q U A L I T A T E S.


Idem.

Qualitate à cæteris Pini
generibus non variat.

V I R E S.


Idem.

Eædem proſecto quæ cæteris: Tabulis ex ea paratis ad hypocausta extruen-
da maximè utuntur Germani, odoris gratia: ac etiam ad alia ædium ornamenta.



PINVS Maritima, Græcis θαλάσσια πίνος. Italis, Pino marino.

PINVS MARITIMÆ PRIMVM GENVS.



FORMA.

Folia habet angusta, præ-MATT. longa, raraq; in capillamenti modum protensa, squamosis vbiq; ramis, Iulis sursum spectantibus. Cones edit cæteris sylvestribus longiores, crassioresq; præduros, nucamentis in acutum extuberantibus, in quibus inanes concluduntur nuces.

LOCVS.

Prouenit in Maritimis Italiæ, Agro cum Pisano, tum Senensi, & (vt audio) apud Calabros.

Idem.

QUALITATES.

Cortex eius mitius exiccat minusque resina excofacie quam cæterorum sylvestrium.

Idem.

VIRES.

Eadem quæ cæteris illi sunt facultates. materię ad nocturnas faces.

Vtuntur incolæ pinguiſſima eius

Idem.

Eadem

Eadem quæ alteri.

PINVS MARITIMÆ SECUN-
DVM GENVS.

FORMA.

MATT.

Comosior huic opaciorq;
quàm alterius, sed breviori-
bus capillamentis. Srotilos
profert maiores, lōgiores, du-
riores, ac pulchriores, promi-
nentibus vndiquaq; nucamen-
tis, vacuis intus nucibus, ac fu-
peruacuis.

LOCVS.


Idem. Nascitur haud longè à ma-
ri, ijdem ferè vtratera locis.

QUALITATES.

Idem. A cæteris qualitatè haud
differre videtur.

VIRIS.


Idem. Viribus ab alijs minime dif-
crepat.



LARIX,

LARIX, Græcis *Λάριξ*.] Italis, *Larice*.] Germanis, *Lärchenbaum*.] Gallis, *Meîze*, siue *Meîze*.

LARIX.



F O R M A.

Arbor est eximie procerita- MATT.
tis. materie æterna, cortice
perquam crasso, in rimas de-
hiscente, & intus rubente: Ra-
mos emittit circa caudicem
ferè totam: extremitatibus sa-
licis modo lentis, subluteo co-
lore: odore nō iniucundo: fo-
lijs gregatim circum ramulos
prodeuntibus, densis, oblon-
gis, mollibus, comosis: Conos
edit Cupressinis emulos, mol-
liores tamen, flores purpure-
os, & odoratos. Resinam fun-
dit liquidā, ac copiosā, quin
etiam Agaricum gignit.

L O C V S.

Prouenit in montibus, &
clinosis locis. Larice abūdant
Tridentinæ alpes: & circum-
stantia loca.

Idem.

Q U A L I T A T E S.

Cortex siccat pini modo: MATT.
Resina ex calfacit, atqui minus
quàm pinca, & abiegna.

V I R E S.

Resina aluum ducit, abster-
git, prouocat, aperit, glutinat, attrahit, Suppuratos, & tabidos iuuat; delincta
purulenta extrahit. Renes, & vesicam expurgat, calculos expellit: deuorata ar-
ticulorum dolores lenit. Gonorrhæam sistit addito succino, & corallio, aut ca-
phuræ momento, oleum ex ea distillatum cum ad plura vtile, tum maximè vul-
neribus glutinandis, & neruorum affectibus.


Idem.

C E N S V R A.

Qui Laricem nostratem non esse legitimam dicunt hallucinantur: & qui Vi- MATT.
truuius, & Cæsaris commentarijs addicti, Laricem igne haud quaque comburi
posse negant. cum tamen eius materies resinosis ceteris resiniferis plantis ha-
beat. antiquorum omnium testimonio qui de ea scripserunt.

LARI-

Vt accuratius indicarentur ramorum tubercula è quibus confertim enascuntur folia, non inutile putauimus fore, separatum ramulum hic appingere, cum depicta præcedens arbor, vt proportio non violaretur, necessario illud in spacium angustius contractum exhibeat obscurius.*



PICEA, Græcis πικύρα.] Italis, Pezzo.] Germanis, Nor Tannenbaum.] Hispanis, pino negro.] Gallis, l'esse, Pigner. siue Garipoolr.

P I C E A.



FORMA

Facie est Abieti adeo emul- MATT.
la, ut Sylvanos quandoq; fal-
lat. Est tamen nigrioribus fo-
lijs, latioribus, lenioribus,
mollioribusq; ac minus acu-
leatis. Hæc ramos circum-
quaq; vestit atq; operit. Co-
nos edit Spithamæ longitu-
dine: fragili nucamentorum
congerie, in quibus semen
concluditur, omnino inutile.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Idem.
sylvis.

QUALITATES.

Siccæ cortex, adstringit, DIOSC.
Pini modo, ita resina pari fa-
cultate excalfacit.

VIREs.

Ea omnia præstat, quæ pi- DIOSC.
nus, etsi Resina ignobilior MATT.

est, & minus efficax. Materies cum ad ædium, naviumq; fabricas, tum ad vasa
cuiuslibet Sæclis domestica utensilia aptissima habetur. Cortex coriarijs expetitur
ad faciendam coriæ.

ASIES

ABIES Græcis, *ἰάτρη*.] *Italica*, *Abiet*, *Abete*, & *Abero*, *AneXXo*, *Auedia*, *Crouat*.] Germanis, *Dannenbaum*, *weiß Dennen*.] Gallis, *Sapin*, *Sap*, *Vergno*. Hispanis, *Abeto*.

ABIES.

FORMA.


MATT. Piceam tota facie æmulatur, angustioribus tamen folijs, & aduersa parte candidantibus. Resinam fundit liquidam, Larigna similem, quam lachrymam abiegnam vocant: splendidiore tamen, & gustatu amariorem, ac odoratiorem multò. Gignitur lachryma intra corticem excitato tumore, quo resecto, collachrymat. Annosæ arbores incanæ spectantur, ob dependentes vndiq; musciomas.

LOCVS.

MATT. Nascitur in altis montibus, inter larices, & Piceas.

QUALITATES.

MATT. Cortex exiccat Piceæ, & Pinus modo. Lachryma verò magis quàm Larigna exalfacit, & eadem præstat valentius. glutinat mirificè recentia vulnera, & præsertim caluaria, vbi tamen cerebri membrana haud detecta appareat. Iuuat sumpta semuncie pondere Ischiadicos, podagricos, ac calculosos: quin & Asthmaticos, suspiriosos, ac purulentos.



*ABIETIS PARTICVLÆ.



Particulas hæcæ separatim exhibere volui ut abundè satisfaceret herbariæ rei studiosis. A. Ramulus est cum folijs veteribus & nouis, & squammulis quoq; circa initia surculorum nouorum. B. Flores crocei, bicolores, qui paulò ante solstitium emergût. C. Conus nouellus & imperfectus. D. Con^o perfectus, qui sursum versus crescit, minime pendulus, aperiturque vere, decidit verò rursus ex arbore quando folia incipiunt emergere. E. Coni scapus à laminis nudus. F. Laminæ coni, item lingu- læ, nucleus, & semen.*

LENTISCVS. Græcis *Ξύλον*.] Mauritanis, *Daru*.] Italis, *Lentisco*.] Hispanis, *Mallaut Arueira*.] Gallis, *Lentig*.] Germanis, *Mastixbaum*.

FORMA.

LENTISCVS.

MATT. Folij est Myrto proximis, octonis exvno processu, prodeuntibus, saturatè virentibus, ac perperuis: cortice subrufo. Fructum profert racemosum, rubentemque in vne modum, è quo oleum elicetur: corniculos quoque gignit, in quibus liquor est limpidus, pusillis refertus culicibus. Resinam quoque fundit, quam Mastichen vocant, grumofam, duramque, sed omnium præstantissimam.

LOCVS.

Nem. Nascitur plurima in Chio, Creta, Cipro, & alijs Aegemaris insulis: quin etiam in Italia, & præsertim in Hetruria, & Campania.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Planta exicat secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis autem & frigiditatis differentia, medium tenet, adstringit, roborat, resoluit. Resina hæc omnia potest, at præter hæc emollit, & excalfacit.

DIOSC. Plantae exicat secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis autem & frigiditatis differentia, medium tenet, adstringit, roborat, resoluit. Resina hæc omnia potest, at præter hæc emollit, & excalfacit.



VIRE.

DIOSC. Lentiscus auxiliatur sanguinem reiicientibus, dysentericis, mensium profluuijs sedisque & vteri procidentijs. Idem cana ulcera explet, ossa ferruminat, vrinam pellit, dentes commotos firmat. Oleum è baccis pressum adstringit, & præscripta omnia potest. Resina autem præter hæc peculiariter tussi veteri medetur, stomachichos iuuat, & durities emollit. Eadem commansa pituitam elicit, & halitum commendat. Articulorum frigidos dolores tollit atque mulcet, si cum cumino, salua, & Lauri baccis illinatur.

TEREBINTHVS, Græcis *τέρινδος*.] Arabibus, *Baton, Betin, aut Albetin.*] Italis, *Terebinto.*] Gallis, *Terbentin.*

TEREBINTHVS.



FORMA.

Folijs est Fraxini, crassio- MATT. ribus, pinguioribus, & rotundioribus, Cotino proximis: materie Lentisco haud absimili, perinde ac cortice. Floret olèe modo, & fructus rubentes, racemososque gerit: cornicula quoque edit rubentia, caprinis haud minora, liquore quodam, & culicibus referta: vt in Lentisco. Resinam fundit liquidam & odoratam, Larignæ aut Abiegnæ similem, cæterisque præstantiorem, Lentiscina excepta.

Locvs.

Prouenit in Syria, Cy- DIOSC. pro, Iapidia, & multis Italiae MATT. locis: habetur & Romæ, in antiquarum domorum ruinis. Nascitur & in Tridentinis montibus: saxosa enim & calida amat loca.

QUALITATES.

Folia, cortex, & fructus Galen. s. excalfaciunt, & siccant ordine secundo, adstringunt, roborant, repellunt, con- sim. med. trahunt. Resina verò excalfacit, extrahit, emollit, abstergit, deijcit. MATT.

VIRES.

Aridæ baccæ potæ vīnam cient, & lienosos iuuāt. Resina hausta vnciæ pon- Gal. dere renes expedit, & vesicam, & articulorum morbis auxiliatur. Medetur ea- DIOSC. dem delincta tussientibus, tabidis, suppuratisque, crassa, purulentaque expectorati: scabiem & lepram sanat, aluum emollit, vrinā cit, vūlnera & vlcera purgar, & carne replet. Additur in antidotis.

CYPRESSVS, Græcis *κυπάρισσος*.] Arabibus, *Saro, siue Sero*.] Italis, *Cipresso*.] Gal-
lis, *Cypres*.] Germanis, *Cipressen*.] Hispanis, *Cipres*.] Boëmis, *Cyprijs*.

GENERA.

Duum est generum. Mas
alterum, alterum Fœmina.
Hæc fastigiato est culmine.
Illa ramos in latum spargit.

FORMA.

MATT. Vtraq; procera rectaque,
caudice glabro, & ramos in
summitate tantum habens.
Folijs viret perpetuis, Sabinæ
baccifera proximis. Conos
gerit Lariceis æmulos,
solidiores tamē compactio-
resque, in quibus minutum
concluditur semē. Resinam
fundit liquidā sed modicam,
odore haud ingrato. Ligni
materies solida, spectabilis,
& suauiter odorata.

LOCVS.

Idem. Plurima in Creta sponte
nascitur, aquosos odit tra-
ctus, & colles, & mōres amat.

QUALITATES.


Galen. 7. Coni folia & germina ex-
siccant, absq; insigni acrimo-
nia, & per quā moderatē ex-
calfaciūt. Adstringit Cupres-
sus omnib. suis partibus, ro-
borat, glutinat, & resoluit.

Diosc.

Folia ex passlo & mirrhæ exiguo pota, vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficul-
tati auxiliantur: pilulæ autem ex vino tusa dantur commodissimè potandæ dif-
entericis, tussientibus & orthopnea affectis, sanguinemque reiicientibus. En-
terocellas tam potu, quam illitu reprimunt. Pilulæ, cum arboris coma suffite,
culices abigunt: folia trita & imposita vulnera conglutinant. Sanguinē suppri-
munt: trita ex aceto capillum tingunt. Illinuntur per se, aut cum hordeacea fa-
rina, ignibus sacris, vlceribus, quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflam-
mationibus: admota cum cerato stomachum corroborant. Pilularū decoctum
ex aceto paratum dentium rheumatismos cohibet. Earundem & mulorum
vnguium cinis oleo myrrino exceptus opitulatur illius capillorum defluuijs.

MATT.

CYPRESSVS.



VIRES.

IVNIPERVS, Græcis, *ἰκνέρις*.] Arabibus, *Arconas*, siue *Archenchas*.] Italis, *Ginepro*.] Germanis, *Beetholter*, siue *Krammerbaum*.] Hispanis, *Enebro*.] Gallis, *Genevre*.] Boëmis, *Isalaunec*.] Polonis, *Zolaunec*.

IVNIPERVS.

GENERA.

Duo eius genera: Alterum DIOSC. maius, alterum minus.

FORMA.

Folio vtraq; est aculeato, MATT. longiusculo, & angusto: ligni materies dura, compactaq; ac odorata: Baccas edit ceruleas, copiosas, erui magnitudine, odore haud ingrato: Resinam quoq; fundit mastiche haud absimilem, quam Arabes Sandaracem vocant.

Locvs.

Nascitur in collibus, ac et- Pli. lib. 16. iam montibus, arido præfer- cap. 18. tim tractu.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur ordine Galen. 6. tertio: Baccæ tamen siccant simp. mc. ordine tantum primo. At- MATT. tenuat, aperit, digerit, resolu- uit, adstringit, roborat.

VIRES.

Bibuntur folia, aut eorum MATT.

succus vtiliter contra Viperarum morsus. Earundem decoctum menses elicit, & vrinas: Baccæ stomacho viles: Præstant eadem contra pectoris vitia, tussim, inflationesque. Resina suffusa, aut aspersa destillationes sistit: hausta verò mensium abundantiam cohibet, tineas ventris necat, resolutis nervis medetur. & sanguinis excreationes supprimit, quin etiam fluentes hæmorrhoidas; In solutionibus dentium addita dolorem mulcet, quod & baccarum decoctum ex vino efficit. Carbones è Iuniperi ligno paratos, & suo ipsius cinere sepultos, integro anno ignem fouere Chymistæ promittunt.

**IVNIPERVS maior*, in Galloprovincia Cade vocata.

IVNIPERVS MAIOR.

FORMA.

Folio est alterius Iuniperi maiore, acuto, pungēte, bacca triplo maiore, resinosa. Lignum suavis est odoris, & liquorem exudar, Oleum de Cade dictum.

LOCVS.


Vulgatissima est in Galloprovincia, necnon in pluribus Italiz locis.

QUALITATES
ET VIRES.

Pollet iisdem quibus præcedens.

APPENDIX.

MATT. Pauci admodum sunt, qui non putent Oxycedrum esse Iuniperum maiorem, aded vt plerique vulgarium illam ab hac nesciāt distinguere.*



SABINA.

SABINA, Græcis, *ῥαβδύς*] Arabibus, *Abel, Abebel, siue Alhorar.*] Italis, *Sabina, & Sauina.*] Germanis, *Ebenbaum.*] Hispanis, *Sabina.*] Gallis, *Sauinier.*] Boëmis, *Klafterkachuogka.*] Polonis, *Szauina.*

SABINA.

GENERA.

Genera duo: Alterum frugiferum, alterum sterile. DIOSC. MATT.

FORMA.

Fructifera folijs exit Myricæ crassioribus, minimè aculeatis. Differètia in baccis. In altera enim, caruleæ, in altera rubentes spectantur. DIOSC. MATT.

LOCVS.

Seritur in apricis, & collibus, in hortis, & viridarijs, ac etiam sponte per se prouenit. MATT.

QUALITATES.


Tenuium maximè est partium: Excalfacit, & siccat ordine tertio: gustu acri & amaro, & adstringente. Digerit, resoluit, aperit, prouocat, abstergit, penetrat, sitim accendit. Gale. K. 6. sim, med. MATT.

VIRES.

Vrinam sanguinolentam ducit, menses elicit: fœtum interficit, ac etiam expellit, cum pota, tum suffita. Viriusque folia nomas cohibent, vlcera in capibus puerorum manantia sanant, foliorum puluere, & butyro bubulo illito: Suffita gallinarum piritam, & grauedinem excurit. Ex butyro & melle delincta, asthmaticis medetur. Nigra & sordida vlcera cum melle purgat. Additur quoque multis in antidotis. DIOSC. Galibid. MATT.

CENSURA.

Qui Sabinam bacciferam non concedunt, apertè delirant.



SABINA Sterilis, Græcis, *Βεάδης σεντινός*.] Italis, *Sauina sterile*.

FORMA.

SABINA STERILIS.


MATT. Vulgaris est notitiæ, folijs cupressi ferè similibus, sed acuto pungentiq̃ue cacumine, grauitèr olentibus, amariusculis, feruentibusq̃ue.

LOCVS.

Idem. Nascitur in apricis, & feritur quoque in hortis & viridarijs.

QUALITATES
ET VIRES.


Idem. Non adèd multum differt à baccifera, verùm tum acrior est, tum quoque graueolentior: Excalfacit, & siccat tamen valentius. Digerit, resoluit, aperit, abstergit, prouocat, & parumper adstringit.



CEDRVS,

CEDRVS, Græcis, Κέδρος,] Arabibus, Serbin.] Italis, Cedro.] Resina autem eius
Latinis, Cedria, Græcis, Κεδρία.] Arabibus, Kitrān, Sut, Alkitran.] Italis, Cedria.

CEDRVS.



GENERA.

Duum generum est: Maius MATT. videlicet & minus. Maioris generi duo, quemadmodum & minoris.

FORMA.

Procera arbor est, Abieti Idem. perquam similis. Quæ in maiori genere floret, fructum non fert. Altera verò contra, nunquam floret, sed conos tamen profert cupressi longè maiores. Resinam fundit laudatissimam. Ligni materies æterna.

LOCVS.

Maior in Syria, Iudæaque MATT. prouenit, & præsertim in Libano monte.

QUALITATES.

Vtraque est calidæ, siccæ Galen. 7. que temperaturæ, tertio quodammodo ordine secundum vtranque: At Cedria quartum ferè gradum attingere videtur, abundè calida simul, & tenuium partium. Eadem at- MATT.

tenuat, digerit, resoluit, expellit, putrefacit.

VIRES.

Cedria infusa defuncta corpora conseruat, & vina putrefacit: additur oculis DIOSC. laribus medicamentis, magno iuuamento. Vermes aurium necat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Conceprum impedit inuncto ex ea genitali ante coitum: pediculos illitu enecat: pulmonum vlcera purgat, & obesos extenuat.

CEDRVS PHOENICIA, Græcis, ἀγέροντες.] Italis, *Cedro minore.*

CEDRVS PHOENICIA.

FORMA.

Gale. li. 7. Arbor est Iunipero per-
 omp. mc. omnia similis. Sed maioribus
 folijs aculeatisq; baccis qua-
 druplo maioribus, colore au-
 reo rufescente, sapore dolci,
 cui haud ingrato.

Locvs.


MATT. Nascitur in Iapidiæ mon-
 tibz, non longè à Pefino op-
 pido.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Excalfacit, & fccat ordine
 omp. mc. ferè tertio. Aperit, prouo-
 cat, refoluit, digerit.

VIRES.


DIOSC. Baccæ stomacho aduersan-
 tur: auxiliantur tamen tuffien-
 tibus, conuulsis, & vrinæ stil-
 licidio laborantibus. Eadem
 cum pipere potæ menses du-
 cunt. Sumuntur quoque contra le-
 pore marinum, ex vino. Inunctæ toti cor-
 pori ex ceruina medulla, aut adipe: à serpentibus hominem tutum reddunt.
 Ideoque bellè adduntur in Antidota.



LYCIA

LYCIA Cedrus, Græcis, *Kédres auxia*.] Italis, Cedro Lycio.

LYCIA CEDRUS.



FORMA.

Folij cōstat Phœniciz Ion MATT.
gè minoribus, frequentiori-
busque longè minus aculea-
tis, ita vt Juniperum parvam
quadantenus referat. Eadè, si
digitis atterantur non insua-
uem spirant odorem, talis e-
nim habetur, qualis ferè in pi-
neorum strobilis percipitur.
Cortice caudex obducitur
subrufo: ramos emittit len-
tos, vitilium instar: baccas ge-
rit alterius, minores, ruben-
tesque, amaro sapore: odore
non ingrato.

Locvs.

Nascitur in quibusdā Mo- Idem,
rauiæ montibus.

QUALITATES.

Excalfacit & siccat, minus Idem,
tamen quàm Oxycedrus.

VIRES.

Eadem ferè omnia præstat quæ Oxycedrus, sed non adeo valenter.

Idem.

LAVRVS,

LAVRVS, Græcis, Δάφνη.] Arabibus, *Gaur*, *sive Gar*.] Italis, *Lauro*.] Germanis, *Egerberbaum*.] Hispanis, *Lauret*, *sive Laurerio*.] Gallis, *Laurier*.] Boëmis, *Bobeck*.

LAVRVS.

GENERA.

DIOSC. Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore.

FORMA.

MATT. Vtraq; folia habet oblonga, lata, in acutum desinètia, solida & odorata: flores vtri-
que tenues, muscosique: Bac-
cas oliuis haud dissimiles: è
quibus Laurinum fit oleum.

LOCVS.

Idem. Nascitur in apricis nõ lon-
gè à mari, & circa amœnos la-
cus, quòd frigoris & algoris
sit impatiens. In Italia copio-
sa in hortis, viridarijs, & col-
libus feritur, ac etiam per se
nascitur.

Gale. li. 6. QUALITATES.

Simp. me. Folia & baccæ excalfaci-
unt, & siccant vehementer, at-
que hæc quoque magis quàm
illa. Radicis autè cortex non
nihil adstringit, & minus a-

MATT. cris est, & minus calida. Lau-
rus attenuat, aperit, prouo-
cat, incidit, emollit, digerit,
flatus pellit.

VIREs.

DIOSC. Opitulantur foru omnes lauri partes vuluæ, & vesicæ vitijs. Baccæ trita, &
melle, aut passo exceptæ, delinctæque, auxiliantur omnibus thoracis rheuma-
tismis. Dantur contra Scorpionum ictus: Illitæ vitiligines emaculat. Earundem
succus vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & ro-

MATT. faceo. Radicis cortex pota, calculos rumpit, & partus necat. Septem lauri bac-
cæ à pregnantibus propediem parituris, cum se dormitum recipiunt deuora-
tæ, facilem, foelicemque partum præstant.



* T I N V S. Laurus Sylvestris, Catoni Laurus Syluatica. Græcè *Δάφνη ἀγρία*.] Italis, *Lauro saluatico*, *Lauro regia*, *Lentagine*.] Brutijs, *Moleſſo*.] Hispanis, *Vua de perre*, *Follado*, *Durillo*.

T I N V S.



F O R M A.

Est cærulea bacca. Vuarū granulīs simili in Corymbacea umbella copiosè disposita, sapore acerbo, tenui pericarpio, tenui quoq; crusta seminis, quam præcedit flos ex albo purpurascēs, ramulorum summitates obtinens. Ipsa stirps lauro humilior est, in alas diuisis ramis longiusculis articulatis, quibus adnascuntur folia ordine distincta eo, vt semper gemina sibi inuicem opponantur, Laurina fere, nitētia, inodora tamen & lata, lanugine tenuissima pubescentia.

Plin.

L O C V S.

Peregrina nobis hæc stirps est, in paucorum hortis conspicua. Italiæ ac Hispaniæ agri & alię forte regiones huius feraces sunt, in primis verò ea syluæ Hetruriæ abundant.

V I R E S.

Nemo veterum harum meminit, nec recentiorum quispiam.*

P L A T A -

PLATANVS, Græcis, *πλατανος*.] Arabibus, *Dulb*.] Italis, *Platano*.] Gallis, *Plan*, *fi*.
ue Plane.

FORMA.

MATT. Procera, ramosa&que arbor
 Platanus est, folio vitigineo,
 crassiore, inferna parte albi-
 cante: Cortice vestitur crasso,
 subcandicante. Flosculos edit
 tenues, pallidosq; baccis ro-
 tundis, scabris: longo à pedi-
 culo dependentibus.

LOCVS.

Plin. Amat flumina & fontes, et
 si vini irrigatione plurimum
 gaudeat.

QUALITATES.

Calc. li. &. Platanus humidioris, frigi-
 dioris&que essentia est, non ita
 multò quam symmetra: Ar-
 qui cortex, & pilulæ magis ex-
 iccant.

VIRES.

Tenera folia prohibet, re-
 soluunt, reprimunt, & phleg-
 monas nascentes adiuvant: in
 vino autem decocta & illita, oculorum fluxiones sistunt: corticis decocto ex-
 aceto parato vtiliter colluuntur in dolore dentes: Virides pilulæ in vino potz
 serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ autem adipæ igni ambusta sanant.

PLATANVS.



* *ACER* maior, nonnullis *Platanus Germanica*, alijs *Carpinus Plinij*, *Græcis*, *ελεβεαυρος*.] *Germanis*, *Ahorn*/ *Waldeichen*.] *Gallis*, *Plasne*.

ACER MAIOR.

GENERA.

Tria sunt *Aceris* genera: ma Theop:
ior *Sphendamnus* dicitur, mi-
nor *Glinos*, & tertium genus
est *κλειστότερον*.

FORMA.

Maior pulchra arbor est &
procera, cortice mediocriter
leui, materia interiore tenera
& tractabili, ramos expandit
plures, quibus folia lata, viri-
ginea, pediculo rubete anne-
ctuntur, flores confertim de-
pendent ex viridi flauescetes,
quibus succedunt fructus alati
gemelli vni pediculo ex aduer-
so adhærescentes.

LOCVS.

Montib. gaudet, sed & pla-
nis & campestribus assuescit.

FACULTATES & VIRES.

Aceris radix contusa ioci- Plin.

Sere, Sam,

oris doloribus efficacissime imponitur.

Si latus immeritam morbo tentatur acuto;

Aceris radicem tundis & vna

Cum vino capis, hoc præfens medicamen habetur.*

FRAXINVS, Græcis, *μελίς*.] Italis, *Frasino*.] Germanis, *Eſchenbaum*.] Hispanis, *Fraſno*.] Gallis, *Frefne*.] Boëmis, *Gelin*.] Polonis, *Zefion*.

G E N E R A.

Theophr. Genera cius duo: Excelsum
lib. 3. c. 11. alterum, ac procerum. Alte-
de hiſt. rû humilius, & minus auſtile.
plant.

F O R M A.

Idem. Excelsum lignû habet can-
didum, craſſiuenium, nerua-
tum, mollius, enodius, ac cri-
ſpius. Humile verò ſcabrius,
durius, & ſtãuius. Vtraque fo-
lijs eſt laurinis hæud aſſimilis,
angultioribus tamen, & ſen-
ſim per ambitum ſerratis, ſor-
bi modo prodeuntibus.

MATT. Fructum fert in ſiliquis linguæ a-
uicularum ſimilem, ſubru-
brum, & guſtu amariuſculo,
ac medicato.*Præter fructum
alia quædam fert, vt muſcos in
globum coactos ſpecie pillu-
larum.*

L O C V S.

MATT. Nascitur in môtibus & cli-
uoſiſſyluis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit & ſiccatur, adſtrin-
git, reſoluit, abſtergit, atte-
nuat.

V I R E S.

Dioſco. Folia, aut earum ſuccus ex vino pota, viperarum morſibus medentur. Sps-
MATT. ma è viridi ligno manans dum incenditur, addito cyclamini, & rutæ ſucco: o-
mnibus ſimul parumper calefactis ſurditati auxiliantur, ſi in aurem ſanam ir-
fundantur, dum ſe cubitum recipit æger. Corticis recentis decoctum porum
lienem abſumit. Fructus datur vtiliter potandus in lateris dolore, & ad vi-
nam ciendam. Idem venerem excitat, & in furno ſiccatus, potuſque calculoſis
auxiliatur.

FRAXINVS.



POPVLVS alba, Græcis, *Alon*. Arabibus, *Haur*. Italis, *Populo bianco*. Germanis, *Bessen Poppelbaum*. Hispanis, *Alamo blanco*. Gallis, *Peuplier*.

POPVLVS ALBA.**GENERA.**

Tria populi sunt genera: **MATT.**
Alba de qua nunc sermo est,
Nigra, & Lybica, siue Alpina.

FORMA.

Alba arbor est procera, cras Idem.
fo cortice, sed laui. Folia sunt
illi vitiginea, inferna parte
maximè albicantia, ac lanugi-
nosa. Infrugifera arbor est.

Locvs.

Nascitur circa flumina, & Idem.
vliginoso tractu.

QUALITATES.

Mistz quodammodo tem- Gale. li. 7.
peraturæ est, ex aqua tepida, & simp. me.
terrena extenuante essentia,
quin etiam abstergentis facul-
tatis est particeps.

VIREs.

Cortex vntiz pondere potus subuenit Ischiadicis, & vrinz stillicidio: cum **DIOSC.**
mulino rene haustus, sterilitatem inducit. Idem præstant etiam folia à purga-
tione ex vino pota: Instillatur vtiliter foliorum succus in aurium doloribus.
Gemmæ quæ primo foliorum partu extuberant, ex melle illitz hebetes oculo-
s iuuant. Tam albæ quàm nigræ cortex particulatim incisus, & sulcis stercor-
atis obrutus, quocunque anni tempore edules fungos profert. Idem præstat **MATT.**
alba populus humotenus secta, & aqua canda, quæ fermentum exceperit, per-
fusa: infra quatrimum enim fungos dabit, esui quàm gratissimos.

POPVLVS Nigra, Græcis, *αἰνεός*. Arabibus, *Haurromi*. Italis, *Poplo negro*. Germanis, *Aspen* / siue *Popel Weiden*. Hispanis, *Alamo*, *Nigriglio*. Gallis, *Tremble*.

POPVLVS NIGRA.

FORMA.

MATT. Nigra albâ proceritate superat: folio est hederaceo, nō tamen vt in alba dissecto, sensim per ambitum serrato, apice in acutum desinente. Fructum fert racemosum, baccis Erui magnitudine, in quibus copiosa, albaque lanugo concluditur. Cortex est illi cinereus, crassusque: Materie alba ac contumaci, ad ædium & ventisilium fabricas idonea.

Locvs.

MATT. Nasclitur in fluviorum ripis, & scrobium aggeribus.

QUALITATES.

Gale. li. 6. Flores exalfaciunt ordine sim, med.

Flores exalfaciunt ordine primo, in desiccando verò & humectando, parum temperatis, & medijs ad siccius deflexerunt. Verum subtiliū potius quàm crassarum sunt parrium. Folia autem quodammodo floribus similia sunt, verum imbecilliora: Flores & folia digerunt, resoluunt, & attenuant: quæ omnia efficacies præstare sine.


VIRES.

DIOSC. Folia recentia ex aceto illita podagricos iuuant. Baccæ ex aceto potæ comitalibus auxiliantur. Prima erumpentia germina odorata sunt, & glutinosa conciliant eadē capillorum nitorem, ijs contusis cum recenti butyro, in solatis, & illitis.



Populus Lybica, sine Alpina, Græcis, ~~ægyptis~~. Italis, *Popolo montana*.

POPULVS LYBICA.



FORMA.

Folio est cæteris tenuiore, MATT. rotundiore, angulosoq; punctim albis notis consperso, tenuiq; pediculo appenso, continuo ferè se mouente, etiam si nullus in aëre spiritus sentiatur. Caudice est cæteris breuiore, nigrioreq; cortice vestito, & materie imbecilliore, alba tamen & tenaci: Fructum nullum fert nec flores.

LOCVS.

Nascitur in montium syl. Idem, nis, & syluestribus locis.

QUALITATES.

Qualitates illi sunt quales MATT. & cæteris generibus.

VIREs.

Folia eadem præstant, quæ Idem. Nigræ, non tamen adeò sunt efficacia.

E A ALNVS.

ALNVS, Græcis, *αλθαία*. Italis, *Alno*, Onio Onizo, & Anno. Germanis, *Erlenbaum*. Gallis, *Auno*. Boemis, *Vuolfa*. Polonis, *Olsa*.

ALNVS.

FORMA.

MATT. Folio est coryli, crassiore cortice scabro, materie molli, rubente. Fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, squamosumq; maturescit autumno, minuto intus semine, fuluo colore.

LOCVS.

Theophr. Nascitur secus flumina, & vliginoso tractu.

• QUALITATES

MATT. Exiccat manifestè, sed in frigiditate & caliditate, parum à medijs abest.

VIRES.

MATT. Folia resoluunt, restringunt, delassatosque recreant. Cortex verò præter hæc corroborat. Folia recentia illita tumores absumunt. Eadem pedum plantis supposita fatigatos viatores iuuant. Pulices necant rore matutino aspersa, & in cubiculis sparsa. Cortex, quòd magis astringat, vsurpatur gallæ vice ad coria inficienda. Sunt etiam qui eo vnà cum fructu vtantur pro galla ad scriptorium atramentum parandum. Expetunt pali ex alno parati ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus & aquosis locis struuntur, quòd in aqua nunquam putrescant.



BETULA, Græcis, *Ξυλδα*. Italis, *Bettola*, *Betula*, & *Bidollo*. Germanis, *Bircken*. Boëmis, *Brika*.

BETULA.



FORMA.

Folijs exit, nigræ populi MATT. haud absimilibus, per ambitum serratis. Iulos edit, ut Corylus: sed fructū nullum. cortex illi albus, membranofusque, bituminofus, & pinguis. Materies candida, flexilis, ac tenax, caudice terebro perforato, aqua clarissima, copiosaque distillat, & potu non ingrato.

LOCVS.

Nascitur in sylvis Septentrionalibus, præsertim locis frigidis, ac niuosis.

QUALITATES.

Folia excalfaciunt, & sic Idem. cant, resoluunt, attenuant, abstergunt, aperiunt, & amara sunt. Cortex verò, quod bituminofus sit, excalfacit, & emollit.

VIRES.

Aqua quæ è perforato caudice distillat, cum renum, tum vesicæ calculos eij. Idem. cit. Illita faciei nitorem conciliat, & maculas delet. Eadem oris vlcera sanat. Foliolorum succus coagulo admistus, cascum à teredine & vermibus præseruat. Ligni materies ad cingenda vinaria vasa peridonea est. Alpini è corticibus conuolutis nocturnas faces parant: Bituminosi enim cum sint, nõ minus quàm ræda flagrant, & incenduntur: optimi quoque è Betula parantur carbones ad fundenda metalla peridonei.

VLMVS, Græcis, *πικρία*; Arabibus, *Didar*, *sive LuZach*; Italis, *Olmo*; Germanis, *Blumen/Rüstenholz*. Hispanis, *Plme*. Gallis, *Orme*.

V L M V S.

G E N E R A.

Theoph. Campestris, & Montana, quam Græci, *δρεπτεαία* vocant.

F O R M A.

Theoph. Montana rectior, auctior, ac procerior. Campestris fruticosior. Vtraque folium habet crispum, asperum, leuiter circum serratum oblongumq;

MATT. Folliculos profert magnos, numerosos, crispas, humani feroti ferè effigie, lento, clarioq; liquore repletos, culicibus quoq; numerosis conclusis. Ligni materies neruosa, tenax, robusta, non tamen speciosa. Montana siliquas & semen profert. Cortex exterior illis est asper crassusq;, interior verò qui lignum ambit, lori modò lentus.

L O C V S.

Theoph. Montana in montibus; Plin. campestris, in campestribus locis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. Folia, & cortex adstringunt,

MATT. inspissant, abstergunt, resoluunt, emolliunt, glutinant.

V I R E S.

DIOSC. Crassior cortex ex vino vnciatim potus pituitas, & aquas trahit. Fouentur

MATT. strata arboris; defluentem capillum reddit, & continet ne fluat illitus. Liqueor in folliculis contentus vitreo vase exceptus sepelitur in fimo equino calido, sale vasi substrato, viginti quinque diebus, quo postea vulnera celeriter sanantur, cum splenis illinantur. Quia etiam puerorum, adolescentiumque enterocolas sanat.



CARPINVS, Græcis, *Κύρια*. Italis, *Carpino*.

CARPINVS.

FORMA.



Arbor est folijsvlmo proxi- **MATT.**
mis, tenuioribus tamen; caudice
procero, cortice subalbican-
te, scabro: ramis copiosis,
robustis, foliosis parulisq;. Ex
his per Æstatē perfoli quidam
pendent, è quibus triquetra
quædam folia subpallida cir-
cumquaq; racematim exeunt,
quorum medius apex, cæteros
longitudine superat, & inter
hos parua quædam capitula
spectantur, ciceris magnitudi-
ne, aut paulo maiora, in quibus
semen. Radicibus nititur fir-
mis, crassisque. Ligni materies
alba, solida, tenaxq;, è quibus
iuga boum villici parant.

Locus.

Crescit passim in omnibus **Idem.**
fere syluis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Qualitates, atq; vires, nemo est (quod scierim viderimq;) qui describat.

Idem.

E 4

ARVN

ARVND. Græcis, *Κάλαμος*. Arabibus, *Casab*. Italis, *Canna*. Germanis, *Rhor*. Hispanis, *Canas*. Gallis, *Cannes siue Roseaux*.

ARVND.

GENERA.

MATT. Domestica, quæ seritur, & Aquatica sponte proueniens, quanquam Plinio Arundinū 29. describantur genera.

FORMA.

Idem. Satiua, quæ è radicum geniculis seritur, ad vitiū palos, ad decem cubitorum altitudinē adolefcit, robusta, ac firma, intus tamen inanis, compactis per interualla geniculis: corrice squamoso, aspero, subalbicante. Folia habet longa milij Indici similia, aspera vbiq; superficie: & acuta circumferentia. Radix illi est albicans, dura, tuberosa, contorta, informis, genicularaq;. Secantur quotannis humotenus: sectæque illico regerminant.

Locvs.

Idem. Domestica in imis vinearum locis seritur. Vliginoso præsertim solo: Aquatica autem sponte prouenit, cum stagnantibus aquis, tum quoque in fluminibus, & mari.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Cortex adustus excalfacit ordine tertio, ac etiam plus siccat. Viridia folia resimp. mc. frigerant. Folia & cortex adstringunt, abstergunt, & corroborant: radix verò attrahit.

VIREs.

DIOSC. Folia tusa & imposita, ignibus sacris medentur. Corticis cinere sanatur alopecie. Radix pota menses & vrinas ciēt. Eadē recens tusa, & illita scorpionum ictibus auxiliatur, quin etiam aculeos, & alia corporibus infixæ extrahit.

ARVND.



ARVND O palustris, Græcis, Κάλαμος ἐλεῖος. Italis, Cannella, & cannuccia aqua- MATT.
tica.

ARVND O PALVSTRIS.

FORMA.

Calamo est tenui, genicu- Idem.
lato, læuibus internodijs, in-
ani ac fragili, folijs longis, a-
speris, & per ambitum acu-
tis: paniculis in summitate co-
mosis tactu mollihus, læui-
busque.

LOCVS.

Prouenit sponte in palu- Idem.
dibus, lacubus, & cæteris sta-
gnantibus aquis.

FACULTATES,
ET VIRES.

Vires sunt illi eædem, quæ Idem.
& cæteris generibus.



MYRICA siue Tamarix, Græcis, *Mueiza*. Arabibus, *Tarfa*, seu *Carfa*. Italis, *Tamarigo*. Germanis, *Tamariscen*. Hispanis, *Tamargueira*, siue *Tamaris*. Gallis, *Tamarisc*.

MYRICA.

G E N E R A.

DIOSC. Duum est generum. Virbanum & sylvestre.

F O R M A.

DIOSC. Virbana, folijs est cupressi
MATT. viridioribus: Fructumq; gerit
gallæ similem, & in altum ar-
borescit. Sylvestris folia ha-
bet Sabinæ bacciferae similia,
tenuiora tamen, ac magis vi-
rentia, fructum quasi florem
ferens compage mucosum.

L O C U S.

DIOSC. Virbana, in Ægypto & Syria
provenit: Sylvestris in fluvi-
orum alveis fruticat.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 6. Abstergetis est, ac inciden-
simp. mc. tis facultatis, absq; perspicua
desiccatione: & adstrictionem
nonnullam habet.



V I R E S.

DIOSC. Domestica fructus datur utiliter cruenta expuentibus, cæliacis, & contra
fœminarum profluvia, regium morbum, & phalangiorum morsus. Illitus tu-
mores inhihet, Vtriusq; cortex in eisdem vsus adhibetur. Foliorum decoctum
potum ex vino lienem absmit, dentiumq; dolorem collatione sedat, & in de-
fessionibus muliebria cohibet. Sarmetorum cinis aspersus ambusta sanat. Ra-
mi concisi, & ex aceto illiti lienem attenuant. Cortex porus alui fluxiones si-
Serap. stitit. Alcazius. Radicum decoctum diutius cum passis vnus potum, lienosam elephantia-
sim curat.

ERICA, Græcis, ἑρίκη. Italis, Erica. Germanis, Heident. Hispanis, Queiro. Gal-
lis, Bruyere.

ERICA.



FORMA.

Frutex est non multū à My- Pli. lib. 24.
rica differens, colore rorisma- cap. 9.
tini, & penè folio, floret bis in
anno, Vere scilicet, & Auro-
no, floribus parvis, copiosis,
subrubentibus.

LOCVS.

Nascitur in aridis, in cam- MATT.
pestribus, collibus, & sylvis.

QUALITATES.

Digerendi per halitum fa- Gale. li. 6.
cultatem habet. simp. me.

VIREs.

Folia & flores serpentium DIOSC.
ictibus illis medentur. FO- MATT.
liorum & florum decoctum
quinque vnciarum pōdere die-
bus triginta potum, vesicæ cal-
culos frangit, idque facilius
succedit, si à trigesimo die in

balneo eiusdem decocti sederint affecti aliquot diebus continuis, & super ipsa
Erica decocta sederint: Florum decoctum potum lumbricorum, & ventris do-
loribus medetur: foliorum succus impositus oculorum imbecillitati succurrit.

ERICA

ERICA altera, Italis, Erica secunda.

ERICA ALTERA.

FORMA.

MATT. Ramos edit tenues, folijs alterius longioribus, acutioribusque, angustis, ac numerosioribus, quibus circumquaq; ramuli stipantur. Flores edit paruos rubentesque.

LOCVS.


Idem. Nascitur arido solo, & in collibus apricis, & montibus non valde excelsis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Si hæc planta Erica est: Ericæ facultatibus proculdubio insignitur.

CENSURA.

Idem. An hæc planta Erica legitima sit, aliorum indicio relinqu.



ERICA

ERICA BACCIFERA, Matthiolo.

ERICA BACCIFERA.

FORMA.


Procumbit hæc planta humi, & latus MATT. occupat areas, folijs penè vulgaris Ericæ: Baccas edit in purpura nigricantes, iuniperinis non absimiles, sed molliore pulpa, lenta, ut in prunis, quæ mense Augusto maturefcunt. Ramis est lignosis obsequiosisque.

Locvs.

Prouenit in montibus, qui Boemiam Idem, à Silesia difterminant, & à quorum fontibus Albis fluius originem ducit.

FACULTATES,
ET VIRES.

De qualitatibus & viribus, quid cerri Idem. dicam, non habeo.



RHAMNVS

RHAMNVS, Græcis, *Ράμος*. Arabibus, *Nausig*, siue *Nauségi*. Ital. *Ramno*, siue *Mar-ruca*. Hispanis, *Scambrones*. Gallis, *Burguesin*, siue *Neprun*.

G E N E R A.

DIOSC. Trium est generum: Can-
didum, Candidius, Nigrum.

F O R M A P R I M A.

DIOSC. Candidum ramos fert re-
MATT. ctos in acutæ spinæ modum,
folijs parvis, oblongis, sub-
pinguibus, tenuibus. Baccis
rubentibus, pisi magnitudi-
ne, cortice albo, & tenui.

L O C V S.

DIOSC. Fruticat in sepibus, & fru-
tetis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Desiccatur, & digeritur excessu
simp. mc. secundo, & refrigeratur primo
completo, aut secundo inci-
piente.

V I R E S.


DIOSC. Folia ignibus sacris, & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur.



RHAMNVS

RHAMNVS secundus, Italis, Marruca biansa.

RHAMNVS SECVNDVS.



FORMA.

Primo candidior est, folijs MATT.
salicis, auersa parte candidis,
virgis aculeatis albicantibus:
rubentibus inter folia baccis.

Locvs.

Nascitur in fruticetis, & se- Idem,
pibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus & qualitatibus ni- DIOSC.
hil prorsus à priori genere ab-
esse videtur.

RHAMNVS

RHAMNUS Tertius. Italis, *Marruca nera*.

RHAMNUS TERTIUS.

FORMA.

DIOSC. Nigrioribus est folijs qu-

MATT. ribus: Ramos mittit quinum
fere cubitorum, cæteris spino
siores, lævi cortice obductos,
fuluo colore. Fructum edit la-
tum candidum folliculari spe-
cie, verticillo similem, in cu-
ius medium ossiculum conclu-
ditur, in quo parvus inest nu-
cleus. Aculei aliqui illi longi,
rectique, nonnulli verò, ut ru-
bi incurui.

LOCVS.


MATT. Nascitur in maritimis, in
campestribus, & locis incol-
tis.

QUALITATES,
ET VIRES.

DIOSC. Folia ignibus sacris, ac ser-
pentibus vlceribus vtiliter il-
linuntur. Fama est ramo hu-
ius, valvis fenestrisve imposito veneficia depelli. Eadem omnia potest, qua
Rhamnus primus.

CENSURA.

Falluntur qui putant Rhamnum tertium, esse Dioscoridis Paliurum, sed ad-
huc magis cæcutiunt, qui idem esse Dioscoridi adulterinum contendunt.



* RHAMNI SPECIES. Oleaster Germanicus. Germ. Weibendorn/Rheindorn/
oder Sanddorn. Batavis, Sijt besien.

RHAMNI SPECIES.



F O R M A.

Multis cinericeis furculis
assurgit hæcarbuscula, sex cu
bitgrū aut paulo procerior,
frequentius humilior, in qui
bus folia oblonga angusta o
leæ similia, minora tamen,
candidioraq; tenuissima la
nugine subtus pubescentia,
superius vero in viri cineri
cia. Flores herbacei totis ra
mulis adnascūtur, quibus sin
gulis deinde succedunt bac
cæ rotundæ, Myrti aut Aspa
ragi baccis similes, sed mino
res, pulpa molli lutea, tenui
glabra & rufescente obdu
cta cute. intus parua semina
insunt, oblonga, pallenti tu
nicæ inuoluta. Tota stirps a
culeis albicantibus longisq;
vndiq; vallatur, Et multifida
diffusaq; radice nititur. Ma
teria eius à spino sola molli
tie differt.

L O C V S.

Nascitur in Hollandiæ ac
potissimum Flandriæ mariti
mis littoribus, & alibi in cō

uallibus ac iuxta profluentes amnes solo lapidoso arenosoq;. Nec deest Ger
maniæ copiosa ad Lycum Vindeliciæ amnem & ad Danubium ab eiusdem Ly
ci ostio vsq; ad Petræas fauces per quas Danubius fluit, tribus millibus passu
um supra Keilheymium oppidum sitas.

F A C U L T A T E S.

Acinos purgatricem habere facultatem affirmant, vnde Barauī quoq; ipsos
agnominarunt. Paratur & Rob de baccis illis, quod vehementer acidum est &
attenuans & incidens, vt berberis ferè, commendaturq; ad dysenteriam.*

SPINA infectoria. Italis *Spina merlo*, *Spina Cernino*, *sive Spinoguerzio*. Germanis, *Wegdorn*.

SPINA INFECTORIA.

F O R M A.

MATT. Arbuscula est non magna, folijs pyri brevioribus, & angustioribus: Ramos fundit numerosos, quorum fastigium in aculeum definit. Baccas edit copiosas lignistrinis æquales, quæ primum virides, & per maturitatem nigrae spectantur. Ligni materies exterius albicat, medullitus verò rufescit.

L O C U S.


MATT. Provenit in sepibus, & senticosis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Exoluit alium baccarum succus, aperit, & expellit, & caloris & siccitatis haud est expertus.

V I R E S.

Idem. Fit è baccarum succo medicamentum alium exolvens, hoc modo. Sumuntur succi earundem libræ duæ, & saccari sesquilibra, & coquantur ad lulpij spissitudinem: idemum linteolo percolantur ad alitis Zingiberis, cinamomi, & Caryophyllorum nonnihil, omnibus in puluerem contritis. Huius liquoris vncia epota crassam, lentamq; pituitam ducit: Idemq; podagricis, Ischiadicis, paralyticisque belle confert. Baccarum succo utuntur podagres viridem colorem inde patantes.



HALIMVS, Græcis *ἅλιμον*. Arabibus, *Malochia*. Italis, *Halimo*. Venetis *Bidone*.

HALIMVS.

FORMA.

Ramos plures à radice fundit, lentos, DIOSC.
& obsequiosos, folijs Oliuæ pinguiori- MATT.
bus, albicantibusq;, salso sapore. Semen
profert racemosum in caulium summi-
tatibus.

LOCVS.

Nascitur maritimis locis, & circa sali- DIOSC.
nas.

QUALITATES.

Excalfacit temperatè, & exiccat, & vt Gal. &
cætera salia corroborat, adstringit, & ab- simp. me,
stergit. MATT.

VIRES.

Cocta ex iure, aut aqua addito oleo, MATT.
aut butyro aluum subducit: Radix cocta, DIOSC.
denorataq; lactis vbertatem facit, & cõ-
uulsa, rupta, torminaq; mulcet. Idonea
planta est Halimus ad scpiendos horto-
rum toros, quippe obsequiosa cum sit,
facile quocunque distrahitur.

CENSURA.

An hæc planta legitima sit Dioscoridis Halimus non desunt rationes, quæ
in dubiam reddunt.

F 1

AQU-

AQVIFOLIUM. *Italis, Agrifolio. Germanis, Baldordisteln oder Stechpalmen.*

AQVIFOLIUM.

F O R M A.

MATT. Planta est arborescens, ad acutæ spinæ magnitudinem, folijs Laurinis, perpetuis, & in toto ambitu per interval- la sinuatis, aculeatisq; , car- nosis, ac læuibus. Virgas edit lentas, & obsequiosas, viridi libro vestitas : baccas rotun- das, rubentesq; , rusci modo.

L O C V S.

Idem. Arborescit in syluis, & syl- uestribus locis.

Q U A L I T A T E S.


Idem. Radices emolliunt, discuti- unt, & resoluunt.

V I R E S.

Idem. Fouentur radicum deco- cto vtiliter articuli, qui pri- us luxati duritiem contraxe- runt. Idem ossa fracta ferru- minat. Id quod valétius præ- stat radicum ipsarum cortex excoctus, & illitus. Folia suspenduntur circa funes è quibus falsæ carnes sub recto pendent, ad arcendos mures. Sunt qui è tuso ra- dicum cortice arte quadam viscum parant ad aucupia.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui hanc arborem Theophrasto Agriam, siue Ariam faciunt atq; in eodem errore versantur, qui eandem existimant eiisdem esse Cratægonon.



Acvta Spina, Græcis, ἰξυάκανθος & ἰξυάκανθα. Arabibus, Ambiberberis, siue Berberis. Italis, Herruscis, Bagaia: Ananiensibus Amperlo. Germanis, Hagdorn.

ACVTA SPINA.



F O R M A.

Arbor est Sylvestri pyro si- DIO SC.
milis, minor tamen, & valde MATT.
spinosa. Baccas profert myrti,
plenas, rubentes, fragiles, &
intus nucleos, radicem multi-
fidam altè descendente. Fo-
lia Apij hortensis modo diui-
sa, sed longiora: floribus race-
mosis, ac cædids, cortice sca-
bro, & materiè pyracea.

L O C V S.

Prouenit in Syluis, sepibus, MATT.
& fruticetis.

Q U A L I T A T E S.

Fructus est tenuium parti- Gal. s.
um, & paulum quiddam inci- simp. me.
suum obtinet. Adstringit, ro-
borat, & prohibet.

V I R E S.

Baccæ deuoratæ alui, & fœ- DIO SC.
minarum profluuiâ sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: Nuclei in
puluerem triti, ac poti calculos tum frangunt, tum eiiciunt.

C E N S V R A.

Deluduntur qui Berberum communis vsus oxyacantham faciunt.

BERBERVS Vulgaris, siue Crespinus. Italis *Crespino*. Germanis, *Bersich*.
Gallis, *Espine*, siue *Vinette*.

BERBERVS VULGARIS SI-
VE CRESPINVS.

F O R M A.

MATT. Complurib⁹ ab radice fructificat ramis, siue aculeatis stolonibus. Cortice vestitur candidanti, læui, tenuiq;. Ligni materies flaua sed fragilis. Totra planta acutissimis aculeis scatet, ternis simul prodeunribus, albis, planis, fragilibus. Folia habet puniceæ tenuissimis circundata spinis, flores aureos, odoratos, racematim dependentes. Fructus rubentes, baccis oblongis, racemosis, vinosisq;, adstringenti, & acido gustu. Radicibus haud altis, fuluo colore.

L O C V S.

Idem. Nascitur in sepibus, frutetis, ac fenticosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Baccæ refrigerant, & siccant, cohibent, roborant, & adstringunt.

V I R T U S.

Idem: Vinum quodè baccis exprimitur, datur vtiliter potandum cum sirupo violaceo, & oxalidis aqua, in ardentibus, ac perniciosis febribus: cum myrtino autem, & aqua plantaginis, cæliacis, & dysentericis, & in fæminarum profluijs. Idem sitim sedat ex pristinâ haustum. Columellam procidentem gargarizatu reprimat. Auxiliatur quoq; sanguinem reiicientibus. Vlcera serpentia cohibet, & humida exiccat, faucium, & gutturis inflationes reprimat. Intestinorum animalia necat, ac pellit.


C E N S V R A.

Decipiuntur, qui vulgare Berberim oxyacantham legitimam esse contendunt.



VVASPINA, siue Crispa, Italis. *Vua spina*, siue *vua marina*. Germanis, *Creuschbeer*.
Gallis, *Groislier*.

VVASPINA.



GENERA.

Altera Satiua, altera agre- MATT.
stis, ac sponte proueniens.

FORMA.

Vtraq; arbuscula est parua, MATT.
fruticosa, folio Apij, siue O-
xyacanthæ: ramulis, ac virgis
albicantibus, vbiq; aculeatis.
Baccas profert rotundas, suc-
cosas, & hirsutas: & præsertim
sylvestris, acido, ac austero sa-
pore. Atvbi maturitatem sen-
sere, flauescunt, & subdulces
euadunt.

Locvs.

Satiua in hortis, pomarijs, Idem.
& vineis seritur, Sylvestris in
sepibus, & senticosis locis
sponte prouenit.

QUALITATES.

Baccæ frigefaciunt: exiccant, Idem.
roborant, & adstringunt.

VIRES.

Baccæ veniunt in ciborum vsum vix acerbæ modò: nam in sculis incoctæ Idem.
appetum excitant. Sitim sedant, & grauidarum malaciæ succurrunt. Dantur
denorandæ cæliacis, dysentericis, & cruenta expuentibus.

RIBES vulgaris, Italis, *Ribes*. Germanis, *S. Johannis Treublein*. Gallis, *Ribes* seu *Raisins de oultremer*.

RIBES VVLGARIS.

GENERA.

MATT. Duum est generum, Domesticum, & Sylvestre.

FORMA.

MATT. Paruulavtraq; est arbor, folio paruo, vitigineo: Ramulos habet lentos, & quibus fructus rubescentes, & vuz modo racemosi dependent, baccis copiosis, rotundis, vinosis, piperis magnitudine, gustu acido, & adstringenti, cum aliqua dulcedinis specie.

LOCVS.

Idem. Domestica seritur ad sepelendos hortorum puluinos. Sylvestris, nascitur sponte in Boemia, in siluosis collibus, & in alijs Germaniæ locis.

QUALITATES.


Idem. Vuz refrigerant, exiccant, adstringunt, & roborant.

V I R E S.

Idem. Datur vtiliter in acutis febribus: Ventriculum æstuantem refrigerat, sitim restinguit, nauseam, & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, cæliacos & dysentericos iuuat, & biliosis fluxionibus obnoxios, sanguinis feruorem demulcet, bilis acrimoniam recundit, & impetum domat.

C E N S V R A.

Cæcutiunt, qui hanc plantam Mauritanorum Ribem faciunt, ac pariter qui Vrsi vnam esse contendunt apud Galenum.



LIGVSTRVM, Græcis, Κόμπος. Arabibus, *Kenne, & Henne*. Officinis, *Alcanna*. Italis, *Guifrico*, *Oliuella*: *Oliuetta*, & *Cambrossene*. Germanis, *Weinholz* / oder *Mundholz* / oder *Neinweiden*. Hispanis, *Alfena*, *sive Hallena*. Gallis, *Troesne*, *sive Trezillon*.

LIGVSTRVM.



FORMA.

Arbor est oleæ folijs latioribus tamen, mollioribus ac viridioribus: flore candido racemoso, sed qui decerptus statim flaccescat: Baccas proferit in cacumine racematim coherentes, hædæ minores, læuiiores, ac nigriores, sapore amaro, ac iniucundo, purpureo intus succo: materie robusta, ac dura.

DIOSC. MATT.

LOCVS.

Prouenit in sepibus ac nemoribus.

MATT.

QUALITATES.

Folia mistæ sunt temperaturæ, quin etiam & summa germina: Digerunt enim leuiter accedente aquea substantia modicè calida, quin etiam aliquid astrictoriæ possident facultatis: ex terrena frigida, & siccitatis non sunt expertes.

Gal. lib. 7. simp. mc.

VIREs.

Folia commanducata oris

DIOSC.

viceribus medentur: & illita feruidis inflammationibus, & carbunculis. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Eadem trita, & illita capillum rufant: flores ex aceto fronti illiti, capitis dolores mulcent. Oleum in quo ligustri flores insolati fuerint, præstat illirum ad vulnerum inflammationes. Item ad capitis dolorem à bile prouenientem. Aqua à floribus distillata præscripta omnia potest.

CENSURA.

Non minus hallucinantur, qui Cyprum, & ligustrum duas faciunt plantas, quam qui ligustrum nostrum phillyream esse contendunt.

PHILLYREA, Græcis, *φιλύρεα*. Italis, *Phillirea*. Arabibus, *Mahaleb*.

PHILLYREA.

FORMA.

DIOSC. Arbor est Ligustri magnitudine folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentici, nigro, subdulci, racematim coherente.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in asperis.

QUALITATES.

DIOSC. Folia adstringunt.

VIRES.

DIOSC. Ad ea omnia præstât Phillyrea folia, ad quæ Oleaster, cum adstrictione est opus, maximè ad oris vlcera commanducata, aut si cornu decocto os colluatur. Urinam quoque ac mentes cient, Epoto decocto.

CENSURA.

Aberrant qui *φιλύρεαν* Tiliam faciunt.

* APPENDIX.

Habetur foliorum differentia triplex, ut lata quædam, quædam angusta esse obsecuentur, quædam etiam medio modo se habentia, ut nihil obstat Dioscoridis descriptioni, folia oleæ latiora Phillyreae tribuentis.*

MAHALEB.



MAHALEB. Mauritanis sic dicta vnguentarijs. Italis, *Machalep*.

MAHALEB.



FORMA.

Arbor est non admodum **MATT.**
procera, folijs Tiliæ haud lon-
gè abſimilibus: Flores edit al-
bos, è quib. bacca ſubnaſcun-
tur nigræ, oſſiculo intus cera-
forum paulo minore, in quo
nucleus reconditur, quo ad o-
doramenta, & ſmegmata vtun-
tur vnguentarij.

LOCVS.

Nascitur in montibus. Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, emollit, abſter- Serap.
git, attenuat, reſoluit, & dolo- Auicenn.
res ſedat.

VIREs.

Nuclei contuſi iliorum, & **MATT,**
dorti doloribus vtiliter illinun-
tur. Id quod magis præſtat o-
leum ex ijs expreſſum. Ex mel-
licrato hauſti, animi deliquijs

ſubueniunt: dantur quoque ad coli cruciatus, & renum calculos: ventris quo-
que fluxus, necat, & vinum prænt.

TILIA

TILIAMAS, Græcis, *φιλύρα ἐρέσγος*. Italis, *Tilia maschio*, & *Carpino nero*. Germanis, *Steinlinden*.

TILIAMAS.

FORMA.

MATT. Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaq; ac etiam sterilis: folia fert lata. oblonga tamen, in quibus ferè omnibus numerosæ extuberant bullæ, in quibus muscæ gignuntur, quæ tandem arefcentibus receptaculis, inde gregarim euolant.

LOCVS.

Idem. Prouenit in syluis, & montibus, saxosis locis.

QUALITATES.
ET VIRES.

Idem. Quid de huiusce arboris facultatibus scribam, hætenus non habeo.



TILIA,

TILIA, Græcis; *φιλύρα*. Italis, *Tilia* siue *Teio*. Germanis, *Ëndett*. Gallis, *Til*, siue *Tilet*.

TILIA FOEMINA.



GENERA.

Quædam mas est, quædam Theoph. lib. 3. c. de hist. plant. foemina.

FORMA.

Fœmina folia fert hedera- Idem
cea, nisi quod in angulum acu ibidem.
torem rotundantur. & quan-
quam iuxta pediculum curua-
tiora, de mediotamen in acu-
tius coacta prætenduntur: Flos
calycula intectus præter folij
pediculum, amentumq; futu-
rum, pediculo alteri adnexus,
viridis dum in calycula est, de-
tectus autem leuiter flauus.
Baccas fert orbicularas, oblon-
gas, magnitudine fabæ, quinis
eminentibus angulis: Cortex
foeminæ flexilis, & materies al-
ba, tenaxq; : cui exigua est me-
dulla.

LOCVS.

Non solum in montibus: MATT.
sed in planitie quoq; proue-
nit, ac in cæmeterijs, & ædium
areis.

QUALITATES.

Adstringit: glutinat, discutit: inspissat, abstergit.

VIRES.

Cortex commansus, ac deinde illitus, vulnera recentia glutinat. Folia trita, & aqua conspersa pedum tumores discutunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens, capite illitus non solum capillos replicat, sed fluentes continet. Aqua è floribus distillata sua peculiari dote datur vtiliter Epilepticis. Ligni carbonēs in puluerem tusi, auxiliantur his qui ab alto deuoluuntur fractis, ac cõ-
tusis.

CISTVS.

CISTVS, Græcis *Κίσκος* & *κίσθαρον*, & *κισσαρον*. Arabibus, *Romjet*, *Alcheis*, *sue lbaie*, *Alihu*. Italis, *Cisto*. Hispanis, *Cerguacos*.

CISTVS.**GENERA.**

DIOSC. Mas vnum. Alterum verò
fœmina.

FORMA.

DIOSC. Mas ramosus frutex est, sed
improcerus, & folijs rotundis;
acerbis, hirsutis. Flos illi mali
punicæ haud absimilis.

LOCVS.

MATT. Nascitur in Apennino Ira-
DIOSC. liæ saxosis locis, & asperis.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Foliâ, & paruagermina ad-
simp. me. stringunt, & exiccant non in-
strenuè: Frutex aded frigidus
est vt repidi calidi sit particeps:
Flores præter prædicta non in-
strenuè desiccant.

VIREs.

DIOSC. Flores in vino austero bis in
die poti, Dysentericis, ventris
imbecillitatibus, defluxioni-

MATT. busq; & humiditatibus opem ferunt, & nomas per se illiri cohibent. Meden-
tur quoq; vetustis vlceribus, & igni ambustis cum cerato. Folia, & flores in de-
fessionibus cohibent fœminarum fluxiones. In summa non parum præstant, v-
bi adstringere, & roborare sit opus.



CISTVS fœmina: Græcis, Κίσθηλας. Italis, Cistofœmina. Patauinis, Salvia
Saluæ.

CISTVS FOEMINA.

F O R M A.

Folia gerit oblonga Salvia DIOSC.
æmula, albicantia, ac hirsuta. MATT.
Floribus albis cisti maris lon-
gè minoribus.

L O C U S.

Prouenit in collibus ar- DIOSC.
dis, & saxosis. copiosa in agro MATT.
Patauino.

Q U A L I T A T E S.
E T V I R E S.

Ezdem illi sunt quæ mari
qualitates & vires. Adstringit
enim; & desiccat.



H y p o-

HYPOCISTIS, Græcis, Τρωξίς. Italis, Hipocisto. Offic. *Hipoquistidos*.

HYPOCISTIS.

FORMA.

DIOSC. Forma est mali punicæ cy-
MATT. tino similis, aut orobanches
fastigijs colore vario. Nā quæ-
dam rufa: quædam herbacea:
& quædam candida visitur. Li-
quatur Acaciæ modo. Cate-
rūm tunditur recens, & elici-
tur succus, qui insolatus asser-
uatur ad vsum.

LOCVS.

DIOSC. Nascentur iuxta cisti vtriusq;
radices.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Magis adstringit quam cisti
simp. mc. folia. Vires habet Acaciæ pa-
DIOSC. res: verum aliquanto magis
siccatur.


VIRE S.

DIOSC. Efficax est auxilium ad om-
nium fluxionū affectus, nem-
pe sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, Cæliacos, dysentericosq; affe-
ctus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo hu-
more exoluta fuerit, robur, & firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè
Stomachicis, epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto
antidoto inditur.



LEDUM, Græcis, *Λάδευ*. Arabibus, *Cafus*: Pingue autem quod ex eo colligitur, Latinis, *Ladanum*. Græcis, *Λάδανον*. Arabibus, *Iaden*, *sive Laden*. Italis, *Laudano*, *sive Odano*. Hispanis, *Xata*.

LEDUM.



VIRES.

Capillum fluentem continet addito vino, myrrha, & myrteo oleo. Cicatri- **DIOSC.**
bus decorem reddit ex vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydro-
melite, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eijcit. Pessis immistum vulvæ du-
ritiem sanat. Inseritur in medicamenta, quæ aurium dolorem, tussimq; finiunt:
ex vino vetere potum aluum sistit, & vrinam ciet. Fiunt ex eo orbiculati globi:
odorandi pestilentia tempore additis cinnamomo, Caryophyllis, Santalis,
Agallocho, Mosco, & Ambaro.

GENERA.

Inter Cisti genera, & Lada- **DIOSC.**
num est. Duum est generum. *Matt.*
Alterum folijs grandioribus,
alterum verò minoribus.

FORMA.

Frutex est Cisti modo na- **DIOSC.**
scens, longioribus tamen fo-
lijs, & nigrioribus, quæ Verno
tempore quiddam cōtrahunt
pingue. * Nascitur etiam sub
hachypocistis quædam. *

LOCVS.

Prouenit in saxosis, & apri- **Matt.**
cis collibus in calidioribus re-
gionibus.

QUALITATES.

Ladanum excalfacit exces- **Gal. 7.**
su primo completè, vel in prin *simp. me.*
cipio secundi. habet etiam ad- **Matt.**
strictionis paululum. Emollit,
digerit, concoquit, venarum
ora patefacit, & spissat.

ROSA, Græcis, Ροσὴν. Arabibus, *Nard, Vard, seu Naron*. Italis, *Rosa*. Germanis, *Rosen*. Hispanis, *Rosas*. Gallis, *Roses*.

ROSA.

GENERA.

Matt. Domestica & Sylvestris. Domestica & si plura Plinio sint genera, nostro tamen quo tria tantum in usum venerunt, videlicet puniceum, album, & quod carnis colorem refert. In albo genere ea est admodum odorata, quam Moscheram, & Damascenam Itali vocant.

FORMA.

Matt. Rosarum, & rosacearum plantarum forma cum omnibus notissima, explorataque sit, superfluum est hic eam describere.

LOCVS.

Urbana in hortis, Viridarijs, pomarijs, & vineis florēt. Sylvestris in sepibus, senticosis, memoribus, & campestribus prouenit.

QUALITATES.

Mesue. Constant Rose diuersis sanè partibus, nempe terrestribus, & aqueis, quibus substantiam, & adstrictoriam facultatem acceptam referunt. Aëreis à quibus cum subdulcem, tum odoratum saporem accipiunt. Igneis à quibus amorem sibi vendicant. In vniuersum autem refrigerant, & adstringunt.


VIREs.

Diosc. Folia, cor, ventriculus, iecur, & retentricem insuper facultatem, corroborant, dolores calidos, & inflammationes auferunt. Aridis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvæ penna illitus, & infusus. Eadem sine expressione rusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest. Flosculi medij cum suis capillis gingivarum defluxiones cohibent, & feminarum profluvia. capitula pota etiam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. Succus & corroborat, & aluum exoluit. Verum id longè magis præstat dilutum pluribus repetitis macerationibus.



**Rosa sylvestris*, Canina-Rosa, Græcis *ῥόδον ἄγριον*, *κυνόρῳδον*. Germanis, *Wilde rosen*, *Hedrosen*.

ROSE SYLVESTRES.



GENERA.

Sylvestrium Rosarum plures observantur varietates, vt sequitur.

FORMA.

Alia vulgo provenit, aculeatis virgis, prælongis rubo similibus, rosa pusilla, ut plurimum quinis foliolis constar, alba subrubensve, quarum hæc altior spinosiorq; illa humilior est. haram ramis spongiolæ villosæ vermiculis prægnantes adnascuntur. Alia odoratior sed minor etiam flores pallide rubêres fert, cuius virgæ rubente quoq; cortice vestiuntur. Est & parva fruticosa spinosissima Rosæ exiguis candidis odoratis. Minima omnium saxatilis colore florj ruberrimo. Maxima sylvestrium est quæ tota olet, & frequenter albicantes, raro purpurascens flores profert & spongiolis hirsutis non caret.

LOCVS.

Omnes sponte exeunt, prima quidem & quinta in aggeribus, & pratorum marginibus, altera in calidioribus regionibus, nam apud nos colitur, tertia in maritimis & arenosis locis, quarta in perosis.

VIREs.

Radix sylvestris rosæ valet ad morsum canis rabidi, Spongiolæ cinere cum *Plin.* melle Alopeciz capitis explentur. Spongiolarum quoque in pulverem tritatum magna vis contra calculum & dysuriam, & capillum nutriendum inunctione. Sed & fructus cum semine pulueratus idem præstat quotidiana apud nos experientia.*

LYCIUM Italicum. Italis, *Licio nostrano*.

LYCIUM ITALICUM.

FORMA.


Matt. Planta est aculeata pruni sylvestris faciem referens, minoribus tamen folijs. Flores mitit candidos, è quibus baccæ gignuntur, ligustri ferè similes, sapore acerbo, atq; adstringenti, è quibus succus exprimitur.

LOCVS.

Matt. Nascitur copiosum in agro Tridentino circa Arcem de Gresta, saxosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Matt. Adstringit, cohibet, roborat, siccatur, & reprimunt: & ubi legitimum lycium non sit ad manus, nihil prohibet, quin hoc eius vicè succedere valeat. Succus è baccis à me extractus, hæc omnia belle præstat.



Bvxvs,

Buxus, Græcis, Πύξος. Italis, Bosso.

Buxus.



Non desunt quoque qui asserant sanari alui defluuia ligni scobe deuorata, aut pota: Sunt & qui asserant buxi decoctum idem præstare, quod Guaiacis Venerereum morbum.

C E N S U R A.

Delirant, qui Buxum & Guaiacum Indicum vnam, & eandem faciunt arborem.

F O R M A.

Buxus prouenit folio myrtiminore, densiore, carnosiore, viridiorèque. Fronde est perpetua, ob idque topiario operi peridonea, flore herbaceo, fructu rutæ simili: Materie spississima, flaua, densissima, atque ponderosissima, adeò, vt nec caricem sentiat, nec in aquis fluitet. *Matth.*

L O C U S.

Locis gaudet cum frigidis, *Idem.* tum apricis. In Corsica frequens, crassissima, prouenit.

Q U A L I T A T E S.

Exiccat manifestè, sed in calore non longè à medijs abest, adstringit quoque & roborat.

V I R E S.

Capillum rufant tum folia tum rami in lixiuio decocti.

EVONYMVS, Græcis, *Evonymos*. Hetruscis, *Silio*. Italis *cateris*, *Fusano*, *sive Fusaro*, quod ex eo fusi à tornitoribus fiunt.

EVONYMVS.

FORMA.

Theoph. Arbor est mali punicæ magnitudine, atque etiam folio *rimo de* eiusdem, maiori quàm *chameplāt. bist.* daphne, molli, vt punica. Germinare incipit mense septembri, & floret deinde vere. Flos illi albæ violæ simili odore infestus, veluti cruorem inferens. Fructus cum putamine filiquæ Sefamæ proximus, præter quàm quòd in versus diuiditur quaternos. Materiæ est buxi modo pallida, ac solida, verum non adeò grauis.

LOCVS.

Matth. Nascitur frequens in Italia in sepibus, dumeris, & syluis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Theoph. Fructus deuoratus pecus enecat, quin etiam folium

ibidem. idem facit, & potissimum capras nisi purgentur Anochio.

Matth. Lixinium in quo baccæ decoctæ fuerint (vt nostræ affirmant mulieres) capillos splendidos facit, furfures extergit, & pediculos necat. Ligni materies expetitur à tornitoribus ad fusos parandos.



ACA-

Acacia, Græcè *ἀργία*. Arabibus, *Achachie*. Italis, *Acacia*.

ACACIA.

GENERA.

Duum est genus: maius
& minus:

FORMA.

Nascitur Spinæ instar fructuosa, non se in rectum attollens. Florem habet cæcidum, & semen Lupino similem in folliculis, è quo exprimitur succus & siccatur in umbra.

LOCVS.

Primum in Ægypto nascitur.

QUALITATES.

Succus maioris condensatus medicamentum est frigidum, & terrosus, immixta etiam quadam essentia aquea; & sanè coniectura est non esse simile, verum quasdam habere in se dispersas partes tenues, & calidas, quæ in ipsa ablutione segregantur. Estq; etiam hoc tertij ordinis excitantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, illorum verò primi.

VIREs.

Succus utilis oculorum medicamenti, valet ad ignem sacrum, & vlcera, quæ serpunt. Perniones, pterygia, & oris vlcera: mensium abundantiam sistit: prociuum vuluâ cohibet, citam aluum supprimit, aut potus, aut suppositus, capillos denigrat. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Gummi cutis spiracula obstruit, ambustis ex ovo illitum pustulas erumpere non patitur.

APPENDIX.

Vbi Acacia defuerit, licet eius vice, tum Rhois arbusculæ folia, tum lentisci foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamenti immiscere.

ACACIA altera, Græcis, Ἀκακία ἐρέσα. Italis, *Acacia secunda*.

ACACIA ALTERA.

FORMA.


- Diosc.** Prouenit ad Ægyptiæ spinę similitudinem. longę tamen minor, tenerior, humiliorq; munitur etiam aculeorũ vallo, folium habens rutę. Fert Autumno semen, lenticula minus in siliquis cõnexis ternum, quaternũve, gustu etiam adstringente. Color siliquis inest aureus, & fulgore quodam respersus, aded vt in sole auri modo splendeat.
- Matth.**

Locvs.

- Diosc.** Prouenit in Cappadocia,
Matth. & Ponto, quinetiam & in Italia.

QUALITATES, ET
VIRES.

- Diosc.** Adstringit, cohibet, roborat, & replet, atqui viribus alteri inferior est, & ocularibus medicamentis inutilis.



VITEX,

VITEX, siue Salix Amerina, Græcis, *ἄγρος καὶ λύγος*. Arabibus, *Famancheft*, *Samancheft*, siue *Bengecheft*. Italis, *Vitice*, siue *agno casto*. Germanis, *Schafsmulle*, siue *Neuschlamb*. Hispanis, *Garriglio casto*. Gallis, *Casto*. Officinis, *Agnus castus*.

VITEX.

GENERA.

Duo habetur genera: *ma-* *plin.lib.*
ius, & *minus.* *24.ca.9.*

FORMA.

Maior in arborem salicis *plin.ibid.*
modo affurgit. Florem mit-
tit album cum pupureo: quæ
& candida vocatur. Minor
quam nigram appellant, ra-
mosa affurgit, folijs cædidi-
oribus, & lanuginosis, flore est
tantum purpureo: Nō mul- *Diosc.*
tū à salice vitilium vsu distat,
& foliorum quoq; aspectu,
nisi odore gravior esset. Ra-
mos gerit lōgos, fractu per-
uicaces, & semen racemo-
sum vt piper.

LOCVS.


Nascitur in fluminum ri- *Diosc.*
pis, maritimisq; locis, aspe-
ris, & torrentium ripis.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit ordi- *Gal.1.6.*
ne tercio, tenuisq; substan- *simp.me.*
tia habetur, tum gustu acris *Diosc.*
simul & adstringens, aperit,
resoluit, saporem inducit,
atque emollit.

VIRES.

Semen potū venenatis ictibus, hydropicis, lienosisq; auxiliatur, lac euocat,
mentes ciet, drachmæ pondere in vino potum. Genituram exoluit, caput ten-
tat, & soporem affert. Foliorum decoctum, & seminis, mulieribus vuluæ malo
oportunis opitulatur. Semen cum Pulegio potum purgationes mouet. Instil-
latur capiti cum aceto, & oleo in lethargo, & phrenitide. Folia suffra, aut sub-
strata venenata fugant: Illita quoq; serpentium moribus auxiliantur, restium
duritias cum butyro, & folijs vitium emolliunt: Semen cum aqua illitum facit
ad sedis rimas, & cum folijs, medetur luxatis, vulneribusque.



ELÆAGNOS, Græcis, ἐλαίανθος.

ELÆAGNOS.

FORMA.

Theoph. Elæagnos natura fruticosa,
lib. 4. cap. cæteris amerinis non abfi-
ii. de pla. milis, figura quidem cæteris
bist. proxima. sed molli, lanugi-
 nesoque folio. flore populi
 albæ, sed minore, fructu
 nullo.

LOCVS.

Matth. Nascitur in insulis fluitan-
 tibus.

FACULTATES, ET
VIRES.

Matth. Cùm sit hæc planta vitici
 admodum similis, credide-
 rim ego similes quoq; habere
 facultates.

APPENDIX.

Nascitur in Boemia plan-
 ra, cuius hic imago spectatur,
 quæ quidem notis omnibus
 Elæagno astipulari videtur.

verùm cùm baccas oliuæ similes proferat, non ausim ego affirmare stirpem
 hanc legitimam esse Theophrasti Elæagnum, cùm illi sterilis habeatur, nisi for-
 tasse idem deceptus sit, vel eius codex deprauatus, vt multis alijs in locis obser-
 uauimus.

* Doctissimis viris alijs & imprimis Carolo Clusio est Ziziphus alba, Bello-
 nio Cappadocica.*



SALIX, Græcis, ἰρίδα. Arabibus, Bulsf, Bhulles, Saffaf, siue Calif. Italis, Salice, siue Salcio. Germanis, Weiden / siue Felbinger. Hispanis, Salce, siue Salgueiro. Gallis, Saulx.

SALIX.



GENERA.

Plura traduntur genera. *Theoph.*

FORMA. *lib. 3. c. 13.*

Quædam in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis fiant perticæ, & pali ad vitium pedamenta, aliæ non tam procerè crescunt, colore rufescentes, sequacis admodum lentitiæ, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè fiunt. Has salices Græcas vocât. Rursus aliæ firmiores corbibus, & rusticanæ suppellectili expetitiæ, aliæ namq; sunt minuscule spectabili tenuitate texendis canistris, cistellis, ac calathis aptissimæ. Omnium folia oleagina, oblongaque sunt. Supernè virentia, & infernè candicantia. *Plin. lib. 16. ca. 27. Matth.*

Locvs.

Nascuntur humecto solo, *Idem.* in fluuiorum & in fossiarum aggeribus.

QUALITATES.

Flores exiccant absque morfu: Folia vim spissandi habent. Item Salix quando habet adstrictionem. *Gal. l. 6. simp. me.*

VIREs.

Tota folia cum exiguo pipere, & vino pota ileosis subueniunt, sumpta per se, *Diosc.* & cum aqua conceptum impediunt. Semen vtiliter cruenta expuentibus datur. Cortex eisdem præstat effectus. Eiusdem cinis aceto subactus, & illitus callos, & clauos tollit. Succus foliorum, & corticis in malicorio cum rosaceo calefactus aurium doloribus auxiliatur. Eorum decocto fouentur vtiliter podagrici. Recentia folia adduntur in soporiferis lotionibus. Sparguntur eadem *Matth.* vtiliter circa febricitantium lectulos.

* SALIX

* *SALIX pusilla*, *humilis*, *Salicula repens*. Græcis *χαμῆνις*. Germanis, *Erdweiden*/ *Steinweidlin*/ *Kriechweidlin*/ *Bergweidlin*.

SALIX PUSILLA.

FORMA.

Humi repit tota nec in rectum attollitur, sed vndique adnatis caudici radiculis sese propagat. Folia non oblonga nec tam acuminata sunt vt vulgarium *Salicum* & modice splendent. Lignosis, tenacibus, nodosisque ramulis color subruffus est, nouellis tamen furculis subuiridis. Florem & fructum nullum in ea obseruare potui.

LOCVS.


Nascitur in alpibus circa lapides copiose repens. *



OLEA-

OLEASTER, aut Sylvestris Olea, Græcis, ἀγριέλαια. Italis, *Oliuo Saluatico*. Germanis, *Wilder Ölbaum*. Hispanis, *Zebuche*. Gallis, *Chiuer Sauvage*.

OLEA SYLVESTRIS.



FORMA.

Domestica, longè minor *Matt.* provenit: Folijs breviorib. & aculeatis ramis. Baccæ & si numerosa fecunditate vinctant, magnitudine tamen satius cedunt, quin & gustatu adstringentiore sentiuntur.

LOCVS.

Nascuntur in Hetruria co- *Matt.* piose. Quin etiam in Dalmatia, & fere in omnibus Adriatici, & Ægei maris Insulis.

QUALITATES.

Adstringunt magis, ma- *Matt.* gisq; refrigerant rami, ac fo- *Diosc.* lia, quàm domestica. Oleum vehementer adstringit.

VIRE.

Folia trita, & imposita igne *Diosc.* sacrum, vlceraq; serpentina, Epynictidas, carbunculos, & nomas cohibent: quin etiam sordida vlcera repurgât, cutem à capite vullam conglutinant, oris vlceribus comanducata medentur. Succus & decoctum eorundem, eundem præstat effectum:

Siue peculiariter facit ad sanguinis eruptiones, muliebreq; profluvium, prodest vna, & pustulis oculorum: Vlcerâ, & veteres defluxiones sistit, quapropter in collyria additur, & ad palpebrarum erosiones per quam utilis est. auribus subuenit, cum exulceratis, tum purulêtis. folia illinuntur cœliaci vtiliter cum hordeacea farina. Sudor emanans ex cōflagrantibus lignis, scabiem, lichenas & furfures, sanat. Baccæ tritæ, & illitæ medentur furfuribus, & depascentibus vlceribus. Ossium verò nucleî, ex adipe, & farina scabros vngues eximût. Oleum sylvestris oliuæ inungitur, colluiturq; vtiliter gingiuis putrilagine laborantibus, dentes mobiles firmat, & gingivarum fluxiones sistit. Idem in doloribus capitis, vtiliter pro rosaceo substituitur, defluentes capillos retinet, tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

OLEA fatiua, Græcis, Ελιά ἡμερος. Arabibus, Zaiton, siue Caiton. Italis, Olio domestico. Germanis, Delbaum. Hispanis, Oliuo, siue Azeitimo. Gallis, Olivier.

OLEA DOMESTICA.

GENERA.

Matt.

Antiqui genera decem fecere, nostro autem æuo tria tantum habentur.

FORMA.

Idem.

Folia habent oblonga in acutum desinentia, crassa, pinguiaq; supernè virentia, & infernè albicantia, sapore amaro, & acrisculo; flores mittunt albos, racematim dependentes, è quibus bacca prodeunt primùm virides, deinde pallescentes, & postremò purpureæ prius factæ, saturatè nigrescunt.

LOCVS.

Idem.

Seritur in collibus & in campis.

QUALITATES.

Gal. 6.

simp. me.

Oliuæ rami quantum habet adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt: fructus verò, vbi rectè maturuerit, moderatè calidus est: immaturus autè magis tum restringit, tum refrigerat.

VIREs.

DIOSC.

Colymbades tritæ, & ambustis illitæ pustulas gigni prohibent, & sordida vlcera purgant. Oliua flaua, & recès stomacho vtilior est, & ventri difficilis: nigra autem & matura stomacho auersatur, & oculis, & dolorem capitis mouet. Arefactæ autem illitu depascencia vlcera fistit, & carbūculos emarginat. Amurca in cupreo vase ad mellis crassitudinē decocta adstringit, & cæteros præbet Lycij affectus. Illinitur dentium dolorib⁹, & vulneribus cū aceto, vino, aut mulso. Additur in medicamēta ocularia: infunditur vtiliter, sedis, vuluæ, & genitalium exulcerationibus. Iumétorum scabiem sanat, cum lupinorum, & Chamæleontis herbæ decocto. Cruda, recensque podagricis, & articulorum doloribus auxiliatur, peruncta in villosa pelle, & imposita hydropicorum tumores reprimat.



QUERCUS, Græcis, *Αἶσος*. Arabibus, *Chullot*, *Hullet*, *sive Belut*. Italis, *Quercia*. Germanis, *Eychbaum*. Hispanis, *Robre*. Gallis, *Chesne*.

QUERCUS.

FORMA.

Folijs est oblongis, firmis, *Matth.* robustis, per ambitum vtrinque sinuatis, caudice crasso, cortice rudi, scabroq; in ramis vero læuiori. Materie robusta, dura, graui, compacta, firmaq;. Gladifera est arbor, & præter glâdes gallas quoq; producit cùm maiores, tum etiam minores, quas omphacitides vocant. Alios quoque fert fructus, de quibus Theophrasto lib. 3. capit. 8. & 9. de plantarum historia abundè scriptum est.

Locvs.

Nascitur vbiq; ferè in syluis. *Idem.*

QUALITATES.

Quæcunq; sunt in hac ar- *Gal. 6.* bore partes adstringētis quæ- *sim. me.* litatis sunt participes. Sed cæteris adstringentior est, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyce, ea videlicet, quæ fructus carnem conueffit: folia etiam non instrenuè desiccant.

VIREs.

Corticis decoctum, qui libro crassiori subest; quin etiam illius, qui glandium *DIOSC.* putamini succedit, datur vtiliter potandum dysentericis, cæliacis, & sanguinem reiicientibus. Eadem in pessa supposita vteri fluxiones cohibet. Aqua à tenerimis folijs distillata, sistit pota Iecorarias fluxiones, renū calculos comminuit: & alba mulierum profluuia cohibet. Datur quoq; dysentericis, & sanguinem reiicientibus. Datur & in pestilentialibus febribus, quod aduersus venena non parum valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lin- *Matth.* gua teneantur. Aqua, quæ in marcescentium quercuum cavitatibus reperitur scabiem omnem vlcerosam sanat: Glandes urinam cient, & resistunt deuoratz venenatorum morfibz. Intritz crudæ inflammationes leniunt.

FAGVS,

FAGVS, Græcis, *ἑλγυς*. Arabibus, *Chinars*, *sive Chiacas*. Italis, *Faggio*. Germanis, *Duchbaum*. Hispanis, *Haia*. Gallis, *Fau*.

FAGVS.

FORMA.

Matt.

Folij est Carpini vulgaris non absimilibus, grandioribus tamen, læuioribus, minusque rugosis: Fructus calyculo includitur rotundo, quadantenus echinato, hispido, ac scabro, nucleo intus triangulari, tunica castaneæ simili circumtecto: Nucleus albicat, Sapore castanearum subdulci, & adstringente: Materies dura, sed non admodum firma: Arbor in magnam assurgit proceritatem, ramis grandioribus ac patulis.

Locvs.

Matt.

Prouenit in syluis, tam in planitie quàm in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Gale. 6.

Valentius adstringit, quàm *simp. me.* quercus, folia autem tenella non instrenuè desiccant.



VIREs.

Diosc.

Folia trita, & illita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant. Folia esitata labiorum, gingiuarumque vitij mirificè auxiliantur. Glandis fagineæ cinis renum calculis vtiliter illinitur. Harum pabulo maxime delectantur glires, & aues quæ rostro sunt validiore.

Matt.

ILEX, Græcis, Πεύθε. Arabibus, *Carmas*, *sive Barbes*. Hispanis, *Anzina*, *sive Azimbeira*. Italis, *Elice*, *sive Leccio*. Germanis, *Steineichen*. Gallis, *Yeuſe*.

ILEX.



G E N E R A.

Duum est generum, *Alte-Columel-rum* folio spinoso: Alterum *la.* sine spinis.

* Differt etiam latitudine & angustia foliorum.*

F O R M A.

Arbor est spectata proce-*Matth.* ritatis, cortice in rufum nigricante, materia admodum densa, graui, ac robusta, sub-rufescentiq;. Folijs est laurin- nis, perpetuò virescentibus, sensimq; in toto ambitu, ser- ratis, aut spinosis, & auersa parte albicantibus, robustis, ac duris. Glandes fert querns longè minores.

L O C V S.

Spinosa in Hispania fre-*Matth.* quentissima: Quæ verò spi- nis caret, in quam plurimis Hetruriæ syluis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Non differt qualitatibus, *Gal. 6.* à quercu, nisi quòd valentius *simp. me.* adstringit.

V I R E S.

Glandes, quernas viribus antecellunt. Radicis cortex cum aqua coctus do-*Diosc.* nec mollitus intabescat, & tota nocte illitus capillos denigrat, prius Cimolia terra purgatos. Cætera, cum quercu, & fago communia sunt. Rubentes pi-*Matth.* lula, quas præter glandes fert, trita, cum aceto vulneribus recentibus, & cru- entis oculis vtiliter imponuntur.

G E N S V R A.

Non rectè sentiunt, Columellæ testimonio, qui Plinij, & Theophrasti au- toritate freti putant, haud legitimam esse Ilicem, quæ folijs spinosis non pro- genit.

* ILEX latifolia, Græcis, πρίνος πλατίφυλλος.

ILEX LATIFOLIA.

F O R M A.

Conuenit cum priore magnitudine, altitudine, materia lignifirma ac solida. Folio differt latiore ambitu sinuoso & aculeato. Glans interdum maior, interdum minor quam sit quercus, locorum ratione varians spinoso innititur calyculo, per maturitatē alicubi nigricans, nucleum habēs intus album, grati saporis, flosculi pusilli flauescētes racemulū cōficiunt oblongum, qui Maio mense inuenitur.

L O C U S.

Copiosa est in quibusdam nemoribus, collibus, campetribus aut conuallibus, & nō infrequens in Hispania, In Narbonensi Gallia ac Prouincia quoq; reperitur, nec non in Italia.

Q U A L I T A T E S.

Folia ipsius refrigerant & reprimūt vt reliquarum glandiferarum.



V I R E S.


Tam huius quam præcedentis folia tusa oedematosis tumoribus imponuntur, & imbecillis partibus roborandis vtiliter adhibentur.

A P P E N D I X.

Observantur nonnunquam in eadem Illice diuersa folia, vt humilis ac tenellæ per margines spinosa horreant, adultæ verò aculeis careant.*

SYBER, Græcis *σαλῶς*. Italis, *Sugaro*. Germanis, *Pantoffelholz*.

S Y B E R.



G E N E R A.

Alterū folijs est: prolixioribus, acuminatioribusque, alterum verò latioribus, brevioribus, & per ambitum ferratis. *Matth.*

F O R M A.

Arbor est perpetua viriditatis, fructu, & folio Ilicis, sed crassissimo cortice vestitur, atque Ilici magnitudine cedit. Glandes quoque proferre iligneis pares, paulo tamen minores, deterioresq;.

L O C V S.

Latifolium in Romano agro frequentissima nascitur. Quod verò prolixioribus folijs est, in agro Pisano provenit in Italia.

Q U A L I T A T E S.

Idem præstat quod Ilex, & eodem ferè modo adstringit. *Idem.*

V I R E S.

Suberis cortex tritus, ex aqua calida porus sanguinem ex vtralibet parte fluentem sistit. Eiusdem cinis ex vino calido haustus sanguinem excreantibus mirificè medetur. Eius glandes quemadmodum cæterarum glandiferarum arbores, in pulverem tritæ, potèq; drachmæ vnius pondere ex succo plantaginis auxiliantur omnibus alui, & vteri fluxionibus. Decoctum earundem haustum datur aduersus venena. Illinuntur eadem cum axungia maleficis vlceribus. Calyx quo glandes in arbore sustinentur, easdem possident facultates, sed magis adstringunt. *Idem.*

SVBER Angustifolium, Græcis, φελλὸς στεφύλλου.

FORMA.

Matth. Folijs est angustioribus, longioribus, acutioribusque. Cætera verò cum priori communia sunt.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Romano agro.

QUALITATES.

Idem. Qualitatibus, ac temperamento nihil ab altero distat.

VIRES.

Idem. Iisdem quoque viribus poller, quibus & alterum genus.



SVBER ALIVD.

PHELLO-

PHILODRYS, Græcis pariter φελόδρυς. Arcadibus, Φήλος πρίν, Theophrasto teste. Italis, præsertimq; Hetrusci, Cerrosugaro.

PHILODRYS.

F O R M A.

Caudicem habet suberinō Matth.
abfimilem, & folia & glandes quercui siue cerro similia.

L O C V S.

Nascitur in agro Senensi Idem.
in montanis sylvis.

Q U A L I T A T E S.
E T V I R E S.

Non differt suis in facultatibus ab alijs glandiferis. Idem.



H 3 CASTA-

CASTANEA, Γένος Κάστανος ἢ καστανίου Κάστανος ἢ δίδος Κάστανος ἢ κάστανος. Arabibus, *Sadanalack Castan*, & *Stebulot*. Italis, *Castagne*. Germanis, *Kestän*. Hisp. *Marones*. Gallis, *Castaignes*. Boemis, *Kastany*.

GENERA.

CASTANEA.

Matth. Domestica, & sylvestres. In domesticarum genere habentur maiores, quæ marones vocantur, & minores, quæ peculiariter Castaneæ vocantur.

FORMA.

Matth. Arbor est procera, amplaq; folijs oblongis, iugladis similibus, venosioribus tamen, & per ambitum fimbriatis, fructu echinato: nuce intus solida, altera parte plana, altera gibbosa, triplici tegminis ambitu septa, membrana primû tenui, crispâq; & amara, mox lento ac coriaceo cortice, demum echinato calyce, alba intus pulpa, ac dulci. Ligni materies solida, ac diuturna.

LOCVS.

Idem. Montibus, & opacis gaudet magis, quam apricis, & campestribus.

QUALITATES.

Diosc. Adstringunt, cum ipsæ nucs, tum quoq; membrana subrufescens quæ carnem ambit.

VIRES.


Diosc. Dantur contra venena, &

Auic. præsertim contra Ephemerum. Item ad tussim antiquam: prunis inassata, & cum saccharo deuorata. Flatus gignunt, & concoctu difficiles sunt, sed vbi rectè concoquuntur, memorabile alimentum præbent, crudæ tamen magis nocent. Sistunt tum alui, tum ventriculi fluxiones. Dantur cruenta expuentibus. Tritæ cum sale, melleq; subactæ, imponunt vtiliter rabidorum canum moribus, & cum polenta, & aceto illitæ mammarum duritias excutiant. Venerem excitant, & caput grauant. Tenuis earum membrana ex vino austeropota duarum drach. pondere, sistit valenter immodicos alui fluores, & sanguinis reiectiones, quin etiam cum parimentorum eboris pondere, alba vteri profusio, ex Nymphaeæ aqua potæ.



CASTANÆ EQVINÆ.

FORMA.



Arbor est spectata proce- *Matth.*
 ritatis, folio pentaphylli, senis
 tamen diuisuris: & ricini fo-
 lio lōgè grandiore, longo, te-
 nuīq; pediculo nitente. Echi-
 nos fert in cacumine magni-
 tudine nostratibus æquales,
 subrufo colore, verū duriorē
 ac crassiore, aculeis raris
 sed robustis, ac firmis. Singuli
 singulā includunt castaneam,
 nostratibus haud dissimilem,
 crassiorem tamen, rotundio-
 remq;: Cortice subnigrican-
 te, præterquā anteriori par-
 te, ea enim albicat, macula
 cordis figuram præseferente.
 torus idem robustus est, nulla
 alia intus tunica, quæ carnem
 ambiat: Sapor pulpæ nostra-
 tibus ferè similis habetur, sed
 dulciior paulò, nec adeo man-
 dentibus gratus.

LOCVS.

Constantinopoli primum. *Idem.*
 ad me allatæ sunt.

QUALITATES.

Adstringunt: & flatus deuoratæ pariunt.

Idem.

VIRES.

Equinæ vocatæ sunt, quod anhelosis, & rufficantibus equis deuoratæ sint sa- *Idem.*
 lutares. Dantur quoque sanguinem reiicientibus.

GALLA, Græcis *κνύς*. Arabibus, *Hafes*, siue *Hafus*. Italis, *Galla*. Germanis, *Gallspffel* / siue *Eychspffel*. Hispanis, *Galla & Bugbala*. Gallis, *Noix de galle*. Boemis, *Galles aneb bublinki*.

GALLA.

G E N E R A.

DIOSC. Altera omphacitis, altera plana.


F O R M A.

DIOSC. Omphacitis, parua est, rugosa, solida, nullo foramine peruia, vuzq; acino magnitudine æqualis. Plana nucis iuglandis magnitudinem explet, cortice leui fungosa medulla, perforataque, & anteriore parte coronata.

L O C V S.

Plin. Nascuntur Gallæ, in omnibus glandiferis arboribus. Verum in quercu copiosiores habentur, ac vtiliores.

Q U A L I T A T E S.

Gal.  simp. me. Omphacitis exicat ordine tertio, & refrigerat secundo, acerbum admodum est medicamentum, frigidum, terrenumq; repercutit fluxiones, & partes laxas contrahit, ac constringit. Altera, quæ maior est & flaua, desiccatur ipsa quidem, sed tãtò minus, quantò minus acerbæ qualitatibus est particeps.

V I R E S.

DIOSC. Gallæ omphacitides tritæ excrescentias in carne, fluxionesq; gingivarum atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ vino, aut aceto extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum eorum ad vuluæ procidentia, fluxionesq; in defectionibus vtile, capillos denigrant aceto, aut aqua maceratæ. Illinuntur vtiliter dysentericis, cæliacisque cum vino, aut aqua, ac etiam potui dantur. Integrarum decoctum, potum iisdem auxiliatur affectibus. In summa, vbi adstringere, siccare, ac sistere sit opus, præstantissima sunt auxilia, sedis inflammationes sanant, & procidentia cohibent.



RHVS, Græcis *ρῶς*. Arabibus, *Sumach*, Rosbar *Sardisticos*, seu *Rosaidicos*. Italis *Rhus* sive *Somacho*. Germanis, *Serberbaum*. Hispanis, *Sumach*, & *Sumagrie*. Callis, & Officinis, *Sumac*.

RHVS.

FORMA.

Arbuseula est binum ferè *DIOSC.* cubitorum altitudine, folijs oblongis, subrubentibus in ambitu serratis ilicis modo. Botros profert acino quadā-tenus lato vuarum gracilium, densos, magnitudine terebinthi.

LOCVS.

Nascitur in montibus in *DIOSC.* terfaxa.

QUALITATES.

Adstringit, & desiccatur *Gal. 3.* dine tertio, & refrigerat *sc. simp. me.* cundo.

VIRE S.

Foliorum decoctum capil- *DIOSC.* los denigrat, atq; etiam vtiliter dysentericis infunditur, & potandum propinatur. Instil-

latur auribus purulentis, folia ex aceto, aut melle illita gangrænas, & pterygia cohibent. Semen eisdem præbet effectus: celiacorum dysentericorumq; cibis inspergitur. Fracta, desquamataq; ac sugillata, illitum ex aqua ab inflammatione tuetur. Linguae asperitates cum melle abstergit, candida foeminarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat addito querno carbone. Gummi quod è trunco profilit, caulis dentium inditum dolores finit. Recentium vuarum succus, & seminis cortex, eadem omnia possunt.



VIBURNUM, *Italica, quibusdam Viburno, quibusdam verò Lantanna. Gallis, Vierge & Mauffane.*

VIBURNUM.

F O R M A.

Math.

Ramis exit digitali crassitudine, bicubitalibus, folijs ferè vimeis, crassioribus & incanis, sensim per ambitum ferratis. Flores edit albos, umbellatim coherentes, à quibus acini prodeunt; lentium modo pressi, qui primò rubescentes, ultimò nigricantes fiunt: Virgæ adeo lentæ flexilèsq; sunt, ut ad fascies colligandos, peridoneæ habeantur.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in sepibus, fruticis, & incultis collibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Folia aspera sunt, & gustu adstringentia, fructus, ubi ad ultimam peruenit maturitatem, alium exoluit.

V I R E S.


Idem.

Foliorum decoctum, ex vino austero paratum, vacillantes dentes confirmat, & gingivarum rheumatismos cohibet, atqui longè magis valebit, si cum oliuæ folijs decoquantur in posca: Gargarissatur idem ad Columellæ procidentiam, & ad faucium fluxiones. Acini immaturi in puluerem triti dantur ad alui fluxiones. Paraturè radicum corticibus sub terra maceratis, & diu tuis viscum ad aucupia haud inutile.

C E N S U R A.


Non desunt, qui plantam hanc Viburnum minimè esse contendunt, sed decipiuntur.

COTINUS.



COTINVS, Italis, Scotano, & Roso. Germanis, Selbst Presilgholz.

C O T I N V S.



F O R M A.

Planta est fruticosa, folio *Matth.* saq; ramis tenuibus, numerosisq; cortice rufescente: folijs densis, Terebinthi rotundioribus, ac latioribus, graueolentibusque, materie adeò flava, vt ad lanificia coloranda maximè insectoribus expetatur. Gerit in ramusculorum cacumine papposam quandam congeriem, colore ex candido rufescente, in qua filique oblongæ hyperici ferè modo proueniunt.

L O C V S.

Prouenit copiosa in Tri- *Matth.* dentino agro, Veronensi, & in alijs non paucis Italiæ locis. & præsertim in Apennino monte.

Q U A L I T A T E S.

Vis illi adstringentia inf- *Matth.* gnis, exiccans, cohibensque.

V I R E S.

Foliorum decoctum in collutionibus adhibitur auxiliatur, oris, & linguæ *Matth.* vlceribus, quinetiam columellæ, & faucium fluxionibus. Valet idem ad genitalium quoq; vicerà, si eo sæpe abluantur. Adduntur folia in descensionibus, quæ ad menses cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum pulvis, ventri prius aceto rosaceo illito admotus, alui fluxiones quascunque compescit. Expetitur tota planta coriarijs admodum ad suas spissandas pel-

PALMA Græcis, *colivz*. Arabibus, *Machla*, *sive* *Nachal*. Italis, *Palma*. Germanis, *Dattelbaum*. Hispanis, *Palmera*. Gallis, *Palmiers*, *sive* *Dattiers*.

P A L M A.

G E N E R A.


Theoph. Mas est & Fœmina: Vtrâq; fructifera: quin etiam, & humilis palma habetur.

F O R M A.

Matth. Arbor Palma est procera, caudice squamoso ramos in cacumine tantum fundit in orbem actos cacuminibus ad terram pectantibus: folijs longissimis, duplicatis gladij figura: Flores profert numerosos, tenuibus quibusdam villis appensos, in magni racemi modum, Crocinis facie similes, sed multo minoribus. Ii antequam emergant magno quodam cœcluduntur inuolucro, quod palman elatem vocant; quo tandem dehiscente emergunt, & panduntur. Hinc subinde Dactyli prodeunt, qui per Autumnum vna cum ficibus murescunt, rufo colore, nucleo intus durissimo, oblongo, canaliculatoq;.

L O C V S.

Matth. Nascuntur præstantiores in Iudæa, & Aegypto: Cypro, Lybiaq;, & in alijs quoq; Europæ regionibus. Sed ibi raro fructus ad maturitatem perducunt.



Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Est adstrictoriæ facultatis omnibus suis partibus, at fructus eius, & maximè dulcis, non *simp. mè.* paucam obtinet caliditatem.


V I R E S.

DIOSC. Contra alui fœminarumq; profluvia in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit, vulnera illitu glutinat. Dactyli dolorem capitis inferunt, copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis, vtilis in cibo: Medentur esu faucium asperitati. Nuclei in crudo fistili ad albedinem vsq; cremati, Spodij vicem supplent. Vim adstringendi habent: Valentq; contra oculorum vnam, & pustulas: corporis excrecentias cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatrices perducunt. Auxiliantur deuorati fœminis albo vteri profluvio laborantibus, & præsertim si exempto osse infarciantur Eloris Scobe, Margaritis, carollio rubeo, & deinde lumantur à ieiuniis quotidie tres aut quatuor,

Matth.

PALMA Humilis, Græcis, χαμαιπρόλες. Italis, *Palmaminore*. Siculis, & Neapolitanis, *Cefagliani*.

PALMA MINOR.



FORMA.

Crescit sesquicubitali longitudo, folijs cæteris absimilibus, sed breuioribus longè, & angustioribus. Flores edit ex obliquo capillacea quadam coma emergentes, e quibus baccae racematim prodeunt. Pars radici propinquior in globum extuberans internū, germen quoddam quod cerebrum vocant numerosis inuolucris circumseptum habet, tenerimum, sapidum, & ori gratissimum.

LOCVS.

Nascitur in Sicilia, & Creta, & alijs quoq; regionibus.

QUALITATES.

Adstringendi pollent facultate. Itaque roborant, & cohibent.

VIRE.

Germen quod cerebrum vocant estur secundis mens-

is pro bellarijs cum pipere, & salis modico, perinde, ac carduus, & cinara: Est enim sapidum, & ori gratissimum. Id (vt aliqui aiunt) ad venerem excitandam præstare haud parum creditur: folia præstant, ad sportulas, regetes, & capitis umbracula: Rami verò vna cum folijs ad scopas parandas, pro verrendis domibus, sunt enim non solum ad hoc peridoneæ, sed etiam viles, quod non conterantur nisi tempore longo. Cætera cum maiori palma communia habet. Baccae suæ adstringenti, dantur contra omnes corporis fluxiones.

* THAMARINDI, vulgo, Indis Puli & Ambili. Græcis *ἰνδολίππος*.

THAMARINDI.

F O R M A.

Fructus est pulpa nigra cum ossibus durissimis in massas coacta, sapore acido non ingrato. Eius arbor à varijs autoribus varie describitur. Nempe folio salicis à Serapione, qui fructum rubrum copiosiore carne, quam siliquæ & firmiore, coloreq; ex-luteo in nigrum languescente & pingui succo scatente ipsi tribuit. Garzias inquit arborem esse magnitudine Fraxini aut Nucis, aut Castaneæ, ligno denso non fungoso: ramosam & multis folijs ornata tenuiter incis magnitudine palmarum: fructum noctu folijs inuolutum, interdiu panis ostendi arcuatum, digito inflexo similem, cute viridi, ante maturitatem, postea cinereo, vbi siccat, qui facile auelli possit, pulpa viscida & lenta, cuius est vsus abiectis nucleis, qui intrus continentur sat uorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotundi, sed plani, colore furui, sed leues, Fructus viridis acidus est non sine suauitate. Mihi planta è semine nata est folio coluteæ fere, sed longiore, cuius imaginem hic exhibemus.



L O C V S.

Nascuntur multis Indiæ locis, sed qui locis montosis & ad septentrionem obuersis proueniunt, præferuntur & diutius incorrupti manent.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerant & exiccant tertio ordine, aut saltem ipsius initio.

V I R E S.

Thamarindi infundi solent pondere & 4. in aqua frigida aut stillatitio in-tybi liquore per tres horas, vt facta expressione exempti inspersiq; modico Saccharo propinentur ad purgandos biliosos humores & pituitosos incidendos & attenuandos. Indi sine molestia se purgant Thamarindis cum oleo nucis Indicæ sumptis. Folia vero Thamarindorum trita partibus corporis eryipelate infectis imponunt.*

Arabibus

Arabibus; Italis, Siculis, Ciprijs, Musa.

M. V. S. A.



F O R M A.

Planta est vnicaulis quinū *Marth.*
 senūmve cubitorum longitu-
 dine, folio arundineo, quod
 ramen per quam longo lato-
 que ambitu se diffundit, adeo
 ut tricubitali longitudine: la-
 titudine verò sesquicubitali
 ac etiam quandoq; grandio-
 re, * per medium folium co-
 sta perpetua & crassa discor-
 rit, aliquando aculeis quibus-
 dam à tergo armata *, caulis
 squamoso vestitur cortice a-
 rundinum ferè modo. Ever-
 tice germen emergit molle
 cubitali longitudine à quo
 alia ab origine ad summum
 prodeunt germina, è quibus
 fructus quidam oriuntur, cu-
 cumeris mediocris magnitu-
 dine, cortice fici: Substantia
 pulpæ consistit Melopepo-
 num modo, nullo inrus nu-
 cleo, aut semine, sapore cum
 quadam insipiditate dulci.

L O C V S.

Nascitur in Syria, Egypto, *Idem.*
 Cypro, & Sicilia.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit in medio primi, & in fine eius humectat.

Serap.


V I R E S.

Fructus estur in cibis, sed parum alit. Priuatim prodest thoracis, pulmo-
 nis, & vesicæ ardoribus, aluum emollit, verum liberior eius vsus stomacho ad-
 uersatur, quin etiam lecur obstruit: Fœtum in utero alit, affectis renibus opi-
 tularur, urinam ciet, & Venerem stimulat.

Serap.

Musa.


Musa imaginem cum fructu iam maturo, hic etiam excudi curamus, ut rei plantariae studiosis cumulatissime satisfiat.



CYCIOPHERA, Græcis, Κουμβόερον. Italis, *Cuciofera*.

CYCIOPHERA.

F O R M A.



Palmam tum caudice, tum *Theoph.*
folijs, hæc planta refert: ve- lib. 4. cap.
rùm à Palma differt, quod 4. de pla.
hæc simplex indiuiduaq; af- hist.

furgat, illa verò cum aliqua-
tenus adoleuit, scindatur, &
bifida fiat: iterumque horum
vtrinq; pari modo diuidatur,
& subinde virgas breues &
multas proferat. Nos tan- *Matth.*
tum fructum vidimus, quo fit
vt plâtæ imaginem hic osten-
dere nequeamus. Fructum *Theoph.*

itaq; profert, magnitudine,
figura, & succo singularem.
Quippe magnitudine, ferè
qua manum impleat, figura
rotundum, colore flauican-
rem, succo dulcem, & ori gra-
tissimū, non racematim con-
gestum, vt in Palma, sed per
singula discretum: nucleo ma-
gno vehemèter duro, ex quo
anulos detornant, quibus in
versicolorib; stragularijs vin-
culis vruntur. Materies à Pal-

ma plurimum distat. Altera enim rara corpore, neruosa, & viridis, altera spissa,
grauis, carnosaq;, & cæsa crispa admodum atq; dura.

L O C V S.

Prouenit copiosa apud Persas, & Indos.

Plin.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Fructus non differt admodum à dactylorum facultatibus.

Idem.

MALVS PUNICA, Græcè *ῥοία*. Arabicè, *Cuman*, *Ruman*, *sive Roman*. Italicè, *Mela-grano*: *sive Pomo granato*. Germanicè, *Granatobffelbaum*. Hispanis, *Granada*, *sive Romanas*. Gallis, *Pomies de Grenades*, aut *Mygraines*.

G E N E R A.

MALVS PUNICA.

Matth. Domesticiū alterum, alterū Sylvestre: Domesticorum tria genera, alia. n. dulcia sunt, alia acida: vinosa verò nonnulla.

F O R M A.

Idem.

Arbor quæ Punica poma profert. minimè procera est, folijs ferè myrti, sed maiori- bus, rubro inhiærente pedicu- lō. Rami illi sunt flexiles, acu- leatiq;. Flōres punicei, cala- thi modō patuli, ore stella- tim circumsepto, è quo folia prominent tenuia coccineo colore: agrestis papaueris æ- mula, granulīs quibusdam ca- pillamēris appensis, vt in Ro- iā: Poma cariaceo vestiuntur: calyce, exterius rufō, interius flauo: innumeris granis refer- ta, succosis vinosisq;, ossiculo intus latente, quæ intercur- santibus flauis, tenuibusque membranīs, miro quodā na- turæ ordine distinguuntur. Ligni materies flaua, cinereo libro vestita.



L O C V S.

Idem.

Seruntur in hortis, Vitis, & viridarijs. Sylvestres sponte nascuntur in collibus, & mari- mis locis & aridis.

Q U A L I T A T E S.

Diosc.

Malum Granatum omne adstringentem facultatem obtinet. Acida tamen plus adstringunt, quam vinosa. Et hæc magis quam dulcia. Acini longè magis adstringunt, ac exsiccant, quam vi- num. Et his valentius quoq; putamen, & cytini. Vinum autè præter adstrictionem refrigerat, & exiccat.

V I R E S.

Gal. lib. 8.


simp. me.

Dulcia stomacho utiliora, sed febricentibus obsunt. Acida æstuantem stomachum iuuant, & vrinam cient. Vinosa mediam sortiuntur naturā. Acidorum nucleici acidi punici, insolati, & ob- sonijs in puluerem sparsi fluentem aluum & stomachū sistunt. Dantur vtiliter sanguinem ex- puentibus ex cælesti aqua. Acidorum succus coquitur cum melle, ad oris, & pudendorū vici- ra, Cytini & Balauſti sanguinolenta glutinant: & humida gingiuarū vitia curant, & eorum de- cōcto dētes cōmoti firmanant. Enterocellis quoq; vtiliter illinuntur. Malicorium hæc omnia præstare poreſt. Radicis decoctum potu laras ventris tinea peluit. Exprimatur è sylvestribus cytini succus, qui insolatus, hypocistidis vicem explet, Malicorium ex vino decoctum, ac illi- tum perniones sanat.

MALA Punica, vulgo Mala Granata. Germanis Granatöpfel / vel Maria Magdalenenöpfel.

MALA PUNICA.

F O R M A.



Exhibemus hic differenti-
am Malorum Punicorum tri-
plicem, non tamen negamus
inueniri plures posse. Dulces
continebat acinos & corticis
colorem magis fuscum quam
cetera habebat, quod superio-
rem locū hic obtinet, & quo
grana possint aspici, dissectū
quoque pingitur. Postea ma-
lum Punicum minus adieci-
mus quod flauo & eleganti ru-
bore distincto cortice grana
intus acida tegit. Vltimum lo-
cum tenet, quod vulgo Mu-
zum vocatur, & mediū quasi
consistit inter acida & dulcia,
quanquam interdum vtraq;
magnitudine superat. Corti-
cis flauedo minus hilaris est,
saturatius tamen rubet.*

MYRTVS Græcis, *μύρτιν*. Arabibus, *Aes*, *Alas* siue *As*. Germ. *Welscheideibee* baum. Italis, *Myrto Mortina* & *Mortella*. Hispanis, *Murta*, siue *Raiam*. Galis, *Meurte*.

G E N E R A .

MYRTVS.

Matth.

Duo Satiuum, & Sylvestre: Satiui duplex est genus, candidum, & nigrum: Extant quoq; alia duo genera nempe Exoticum, & Tarentinum.

F O R M A .

Idem.

Satiua facile in arborē adolefcit, at sylvestris magis fruticat. Folijs utrāq; sunt oblongis, crassiusculis, firmis, odoratis, in acurum desinentibus: ramis obsequiiosis; floribus candidis, numeroſis, intus capillamentis, eximio odore. Satiuarū utrūq; genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadantenus referentes: & multo sylvestribus maiores, paruis numerosisque intus nucleis.

L O C V S .

Idem.

Satiua in hortis, viridarijs, Vineis, & aucupijs feritur, sponte vero nascens Maritimis plurimum prouenit locis, & circa amānorum lacuum ripas: sed in Hetruria in syluosis quoque collibus virescit.

Q U A L I T A T E S .

Gal. 7.

simp. me.

Constat ex contrarijs substantijs, vincit tamen in ea frigidum terreum, habet verò & tenue quiddam calidum, vnde valenter desiccatur.

V I R E S .

Diosc.

Semen datur sanguinem expuentibus: & in vesicæ erosionibus. Baccharum vnum Stomacho vtile vrinam cit, & prodest potū ad phalangiorum, & scorpionum ictus ex mero. Idem præsumptum crapulam arcet. Præstat idem etiam semen, quo illito fluentes capilli continentur. Foliorum decoctum ad infestationes vbi adstrictione opus sit, plurimum præstat. Foliorum farina ex vino illita lutos artus iuuat, inflammatos ictus, quin & testium inflammationes. Myrreum condimentum languidos ventriculos roborat, idcirco & cæliacis, & dysentericis vtile. Frondes, itemq; baccharum semen tritum contra fungorum strangulationē mirifice præstant. Baccæ quoquo modo haustæ, aut deuoratæ cor corroborant, & eius tremori mirifice conferunt.

Matth.

MYR.



MYRTVS Tarentina. Italis, *Mortina Tarentina.*

MYRTVS TARENTINA.



FORMA.

Folio est nostrate longè mi *Matth.*
nore robustioreq;: fructu co-
piofiore, sed minuscule: & in
summitate pluribus apicibus
coronato. colore ex nigro
purpurascete, minutis, cre-
bris, albicantibusq;: intus of-
ficulis: floribus nostratis simi-
libus.

LOCVS.

Prouenit copiosa in Apu- *Idem.*
lia circa Tarentum. vnde illi
nomen.

QUALITATES ET
VIRES.

Non differt viribus, quali- *Matth.*
tatibusq; à nostrate.

F O R M A.

Matth. Folio est nostrati haud abfimi-
 mili, dilutior tamen, acuminatior
 copiofioreque. & adeo denfo, ut eo
 rami ubiq; ftipentur. Fructum fert
 oblongum, è longoq; pediculo dependen-
 tem, feminibus refertum, flores albi-
 cant, ut in cæteris generibus.

L O C U S.

Matth. Seritur in Italia in hortis, &
 viridarijs, tanquam peregrina ad
 topiaria opera contexenda.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Matth. Nō differunt viribus, & qua-
 litatibus à cæteris generibus. Folijs
 ficcis vivuntur. Coriarij non solum
 huius fed omnium Myrti generum ad
 fpiffanda, crispandaq; coria.



MYRTILLVS, Vitis Idæa. Græcis *χαμαίμυρτιν*. Italis, *Myrtillo*. Ananienſibus,
Calane &c. Germanis, *Heidelbeer*.

MYRTILLVS.

FORMA.

Frutex eſt cubitalis, caudi- *Matth.*
 ceduro, ramis tenuibus, vi-
 reſcentibusq; folijs myrti mi-
 noribus, robuſtis, ſenſimque
 perambitū ferratis: flores edit
 tintinnabuli effigie, inter fo-
 lia è petiolis dependentes, co-
 lore ſub puniceo, ruſo intus
 ſtamine: è quibus baccæ ſub-
 naſcuntur, Myrti non abſimi-
 les, ſed paulò minores, vinoſæ
 & auſteriuſculæ: & ſumma par-
 te umbilicatæ, cæruleo colo-
 re ad nigrum inclinante.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Matth.*
ſyluis.

QUALITATES.

Fructus refrigerat, exſiccatur, *Idem.*
 roborat, reprimat, & cohibet.

VIRES.

Dantur baccæ cū recen- *Idem.*
 tes, tum quoq; ſiccæ deuorandæ dyſentericis, & cæliacis. Eduntur quoq; æſta-
 re fragorum vice à paſtoribus. Nam auſteriuſculæ cū ſint, & vinoſæ, ſitum ex-
 tingunt, & non ingratus ſunt cibus. Vſurpantur ab infectoribus ad colorandā
 ſtamina, cæruleo colore; ac etiam à pictoribus: Germani autem Pharmacopæi
 ijs paſſim vtuntur. Myrti baccarum vice, cū ijs deſtituantur.

*VITIS IDÆA rubra. nonnullis Rhus minimus Plinij. Germ. Rot-Heidelbeer/
Steinbeerlin/Kronsbeer. Gallis Aurelles rouges.

VITIS IDÆA RUBRA.

F O R M A.

Suffrutex est exiguus, folijs buxi, interdum leuissime ceu serratis marginibus, flosculis arbuti candidis, confertis, ex quibus bacce rubetes in summitate ceu corona quadam denticulatæ nascuntur, sapore acidæ & astringentes, radix tenuis serpit.

L O C V S.

Amat loca syluosa saxosaq; & copiose crescit circa abietes atq; piceas.

Q U A L I T A T E S.

Frigidam & siccam habent facultatem & simul adstringendi vim maiorem quam nigri myrtilli.

V I R E S.

Pulueres efficiuntur ex acinis aridis, & exhibentur calculosis. Horum quoque in dysenteria vsus est non contemnendus.*



CERA.

CERASA, siue Cerasia, Græcis, *κεράσια*. Arabibus, *Sarasie*. Italis, *Cirege*. Germanis, *Rirschen*. Hispanis, *Cerefas*. Gallis, *Cerises*.

CERASIA.



GENSURA.

Diversa cerasorū sunt ge- *Matth.*
nera: nā alia dulcia, alia suba-
mara, alia austera, alia acida,
alia insipida habentur: quin
etiam alia domestica, alia syl-
vestria.

FORMA.

Arbor folia fert, mespilo *Idem.*
latiora, per ambitum serrata:
flores albos, racematim pro-
deuntes, è quibus rubentes
oriuntur bacca, è longis pe-
diculis dependentes, & pro-
na parte diuisa, duro intus
officulo, pisi magnitudine, in
quo nucleus includitur. Li-
gni materies fibrosa, compa-
cta quæ, cortice læui, & inuo-
lucris pluribus referro.

LOCVS.

Domestica Cerasus in hor- *Matth.*
tis, vineis, & viridarijs feri-
tur. Sylvestris in sylvis proue-
nit, ac etiam in vallibus.

QUALITATES.

Quæ dulcia sunt, magis *Gal. lib. 7.*
quæ in intestinis sunt, subdu- *simp. me.*
cunt, sed stomacho minus v-

tilia habentur. Contra verò austera: Quæcunq; verò acida sunt, pituitosis ex-
crementosisque stomachis conueniunt: siquidem austeris magis desiccant, &
non nihil etiam incidunt. Sylvestria autem cæteris adstringentiora sunt.

VIRES.

Viridia aluum leniunt, sicca verò cohibent. Gummi quod è trunco emanat, *DIOSC.*
communem cum omnibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis *Gal. loco*
facultatem obtinet, quæ ad arterias exasperatas accommodata est. Propriè autem *citato.*
calculis vexatos ex vino potum adiuuat. Idem cum vino potum veteri tussi me- *DIOSC.*
detur, colorem commendat, visum exacuit, & appetentiam incitat.

CHAMÆCERASVS, Græcis, χαμαίρεας. Italis, Ciregio nano.

CHAMÆCERASVS.

FORMA.

Matth. Arbuscula est Spitamapaulo maior. Baccæ, quæ cum austeris magnitudine certant, brevi petiolo innituntur, sapore austero, ac adstringenti.

LOCVS.

Matth. Prouenit spontè cum in valle Anania in agro Tridentino, tum in Boëmia, & Austria secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth. Baccæ cum cæteris austeriora habeantur, etiam cæteris sicciora iure fuerint, magisque adstringentia.




SILIQUA

SILIQVA, Græcis, *Κεράτριά*. Arabibus, *Charumb*. Italis, *Carobe*, & *Carobole*. Germanis, *S. Johannis Brodt*. Hispanis, *Alfarbas Carrouges*. Officinis, *Carobe*. Gallis, *Caronge*.

SILIQVA.

FORMA.



Arbor, quæ Siliquas pro- *Matth.*
fert, folio viret fraxino latio-
re, duriore, ac magis circinna-
ro. Fleret discedente hyeme;
aut vere iam appetente, fru-
ctificat verò Æstate & Autu-
mno, dependentibus siliquis,
primum viridibus, & deinde
cùm siccantur, ex rufo nigri-
cantibus, mansu lignosis, sed
dulci pulpa, succoque prædi-
tis: Semine Ægyptiæ Siliquæ
haud dissimili.

L O C V S.

Nascuntur copiosæ in Apu *Idem.*
lia, Campania, Creta, Syria,
Cypro, ac alijs calidioribus
regionibus.

QUALITATES.

Adstringunt, & exiccant. *Gal. li. 7.
simp. me.*

V I R E S.

Récentes stomacho aduersantur, & aluum soluunt. Eadem siccata sistunt, *Diosc.*
stomachoque vtiliores fiunt. Vrinam quoq; cient. Eadem etsi omnium con- *Matth.*
sensu adstringunt: compertum est tamen earum decoctum potum mirificè iu-
uare ruiſſentes, ob dulcem melleamque substantiam, quæ ijs inest.

*SILIQVÆ SYLVESTRIS, vel Arbor Iudæ, alijs Cercis, nonnullis Fabago vel Siliquastrum, item, Cucuuaia. Germanis, Wild Johannes brodt/ Judas Baum. Gallis, Gaynera. Italis, Carobaria. Hispanis, Algorono loco, vel Arbol d'amor.


F O R M A.

SILIQVÆ SYLVESTRIS.

Speciosa admodum est arbor, & interdum satis magna fit, nullo germinandi ordine: caudex plerunq; non recta attollitur, sed incuruatur & declinat. Folia repræsentant asari figuram, sed multo ampliora sunt, & singula longis petiõlis dependent. Flores promit primo vere purpurascens, ex quibus Siliquæ gignuntur latæ, rubræ, siue potius purpureæ, in quibus semen, vt in Cetrarijs, sed longè minus.


L O C V S.

Amar loca vmbrosa & aspera. Circa Bononiam copiosè nascitur. In Germania ex semine prouenit, & in hortis colitur.*



MALA, Græcis, *Μᾶλα*. Arabibus, *Tufa*, seu *Tufalta*. Italis, *Mele*, seu *Pomi*. Germanis, *Äpfel*. Hispanis, *Mansanas*. Gallis, *Pomes*.

MALA.



GENERA.

Numerosum sanè est malorum genus, ac magis quam explicari possit sapore, forma ac mole diuersum. Alia enim austerū, alia acidū, alia dulcē simul, & austerū, quædam dulcē, & manifestè acidum, & nonnulla cum acore acerbum saporem habent.

FORMA.

Malorum arbor vnico tantum exit caudice, ramos inde statim in longū, latumq; mittens, crasso satis libro, colore exterius cinereo, & intus flavo: folijs virescit oblongis & tenuiter per ambitum serratis. Flores mittit albos, foliatos, aut ex cādido sensim purascentes, è quibus poma oriuntur, forma, colore, magnitudine, & sapore varia.

LOCVS.

Domestica in hortis, vineis, & pomarijs habentur. Syluestria verò locis campestribus, tum etiā in syluis, & collibus spontè nascuntur.

QUALITATES.

Adstringētia mala, succum frigidum, terreumq; habent. Acida autem frigidum quidem, sed tenuium partium. Mediæ autē temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius vergunt, quemadmodum omnis qualitatē expertia, insipidave, ad frigidius inclinant. Syluestria cæteris adstringentiora habentur.

VIREs.

Cruda in cibis omnia ferè refrigerant ventriculum: quamuis dulcia quæ adioscopia vocantur minus lædant, & quæ in hyemem & ver afferuntur: vbi prius maturauerint. Præstant dulcia ad Melancholicos affectus: quin etiam, ad pleuriticos. Ea enim si cineribus incocta, & Glycyrrhizæ succo, amylo, & Saccharo albißimo conspersa propinentur, tam mane, quam vesperi, illos quidem mirificè iuuant.

COTONEA Mala, Græcè, *Κυδωνία μύλα*. Arabicè, *Saffargel*. Italicè, *Mele Cotigne*. Germanicè, *Rüthen*/sive *Quitten*. Hispan. *Membrillos*. Gall. *Pomes de Coing*.

GENERA.

DIOSC. *Tria* Cotonæorum numeratur genera. Palma illis quæ propriè Mala Cõtonea nominantur. Secundo loco Struthia vocata, & tertio quæ media inter hæc habentur, Miluiana seu notha appellata.

FORMA.

Matth. Præstantiora, & quæ primas tenent, pressa sunt, & in toros ferè diuisa Melopeponum modo colore ad aurum inclinato. Lanuginosa, & ceteris odore præstâtiora, Struthia maiore admodû corporis mole spectantur, & forma magis pyra, quàm mala referunt. Miluiana autem inter hæc media, cum facie, eum sapore, odoreque esse videntur. Arbor cõmuni malo ferè similis est: atqui folia angustiora sunt, læuiora, carnosiora, robustioraque, & à tergo albicantia, florem fert album sylvestris rosæ figura.

LOCVS.

Matth. Preuenit fata in hortis, vineis, & viridarijs.

QUALITATES.


Idem. Valenter adstringunt, cohibent, roborantque: quin etiam refrigerant ordine primo, & siccant secundo.

VIRES.

DIOSC. Cocta, tostave Stomachum inuuant, & vrinam cient. Præsumpta aluum cohibent, contra verò citant. Profunt celiacis, dysentericis, & purulenta excrementibus, præsertim cruda. Succus crudorum datur vtiliter orthopnoicis. Decocta fonentur vtiliter sedis, & vuluæ præcidentia: Illinuntur cruda ad cohibendam aluum, & vomitiones. Vinum ex his expressum hæc omnia quoque præstare potest, quin etiam oleum quod ex ipsis conficitur, inunctum. Seminum mucago illinitur vtiliter omnibus inflammationibus, & linguæ scabritiem læuigat.



*COTONEA Maiora, siue Struthia. Græce *στροβιλήνα*, vel *σπείδια* Galeno. Germanicè, Grosse Quitten.



Huc refer quæ de alijs sunt dicta.*

PERSI-

PERSICA, Græcis, *περσικὴ μῆλα*, & *πεδάρινα*. Arab. *Sauchsen*, *Chauch*. Ital. *Pesche*, & *Persiche*. Germ. *Pfersich*. Hispan. *Pexegos*. Gallis, *Pesches*. Polon. *Broskuini*.

- G E N E R A.

P E R S I C A.

Matth.

Perficorum perplura reperiuntur genera: Quædã enim rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia albicant, alia sanguineo succo madent, alia duracina vocantur, & duriores sint pulpa: & q̃ ab osse non diducantur. Et alia Coronea, alia nucipersica, & nucũ Iuglandiũ faciẽ representent, appellatur. Sunt etiã q̃ pro nucleo amygdalã dulcẽ habeant *Persica amygdala* appellata.

F O R M A.

Idem.

Persica malus arbor est folijs Amygdalẽ per omnia similibus, quemadmodum & floribus, quamvis in *persica* magis purpurascens spectetur. Ligni materies fragilis, radicesq; imbecilles, nec altẽ descendentes, vnde fit, q̃ hæc arbor cito cõsenescat, & cadat.

L O C V S.

Idem.

Habetur vbique copiosa in Italia, sed in Apulia copiosissima provenit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.
simp. me.

Germina, & folia vincetrem habent amaram qualitatẽ. Alioqui sanẽ etiã digerens medicamentũ est. Fructus verò eius, nempe esculentũ hoc persicum, humidior est, & frigidior temperie.

V I R E S.

DIOSC.

Gal. li. de

alim. fac.

Marth.


Acerba Persica aluũ cohibent, sed sicca vehementius. Decoctũ è siccis aluisto machiq; fluxiones sistit. Pravi succi sunt, & quẽ faciliẽ corrumpuntur. Flores recentes deuorati non solum aluũ deijciunt, sed vomitiones quoq; faciunt. Hydropicorũ aquam pellunt: sed non absq; egrotantium incommodo. Lachryma arboris datur ex plãtuginis aut portulacæ succo ad sanguinis reiectiones: iussientib. verò & anhelosis ex Tussilaginis aqua, & Croci momẽto: facit quoq; ad raucedinẽ & arteriæ impedimẽta. Datur calculosis cũ succo raphani, aut limonũ, durũ drachmarũ pòdere. Recetia folia illinũtur vtiliter ventri ad interaneorũ vermes, ex aceto. Eorundẽ succ⁹ vermiculosis, ac purulẽtis aurib. vtiliter infundit.

* P E R S I C A



**PERSICA rubra* siue *sanguinea*. Germ. *Rote Pfirsich*.

PERSICA RUBRA.



F O R M A.

A reliquis parum discrepant nisi maiora essent & intus saturate rubente & quasi sanguineo succo turgent. Caro etiam à nucleo non facile abscedit sed firmitus adhærescit.*

K

MALA

MALA Armeniaca, siue Præcocia. Græcis, *Μῆλα ἀρμενιανὰ ἢ πρæκoccία*, & *Πρæκoccία*. Arabibus, *Mermex mex*, *Mesmex*, siue *Mismis*. Italis, *Armeniache*, *Bacochæ*, *Moniache*, & *Grifomele*. Germanis, *S. Johannis Pfirsich*. Hispanis, *Albincoques*, *Albarbigas*, *Aluarisques*. Gallis, *Abrico*, *Carmaignoles*, & *Chicandels*.

ARMENIACA MALA MAIORA.

GENERA.

Matth. Plures eorum visuntur species, magnitudine, & sapore quoq; differentes.

FORMA.


Idem. Arbor rarò procera admodum visitur. Folia ferrPiri haud absimilia, subrotunda, & per ambitum serrata. Flores albos, cerasi modò, è quibus fructus prodeunt persicorum forma ac ferè magnitudine, aureo colore, sæpe cum purpura misto, os omnia infra se concludunt, vtraq; parte turgens, in quo nucleus concluditur, in quibusdam amarus, in quibusdam verò dulcis.

LOCVS.

Idem. Habentur in hortis, vineis, & Viridarijs.

QUALITATES.

Gal.lib.7. Fructus humidior, frigidi-
simp. me. orque est, vtrunque secundo quodammodo excessu.



VIRE'S.

Matth. Oleum è nucleis expressum, mirificè valet ad inflammatas hæmorrhoidas inunctum. Valet quoq; ad vlcera tumores, & ad linguæ impedimenta: & priter ad aurium dolores. Idem potus vnciarum quinq; pondere, cum vini Cre-
tici vncia, calculos pellit, & colicos inuat.

ARMENTACA minor, Græcis, Μήλα ἀρμενιακά μικρά. Italis, præsertimq; Heruleis Armoniache, Bacoche, & Moniache minori: Insubribus autem, & Veneris Arneellini.

ARMENTACA MINORA.

FORMA.


Arbor est, mali proceritate, *Matth.* folijs albæ populi, floribus cerâ admodum similibus, ac pariter racematim prodeuntibus. Fructus edit mali Persici effigie, minores tamen, colore aureo subrutilante, & odore incundo.

LOCVS.

Habentur passim in hortis, *Idem.* viridarijs, & vineis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differunt suis in facultatibus à maioribus, verum tamen austeriori sunt sapore. *Idem.*



CITRIA MALA, siue medica mala, Græcis, Μελιζάνη ὄψιλον, ἢ κεδρόμυλλα. Italis, Cedri, & Citroni. Germ. Citron Deyffel/ siue Züden Deyffel. Hiip. Cidras. Gal. Citron.

CITRIA MALA, SIVE MALA MEDICA.

G E N E R A.

Matth. Maiora, & minora.

F O R M A.

Idem.

Proueniunt maiora melopeponū magnitudine. Minora verò paulò limonibus grandiora: & gustu suauiora. Planta quæ perpetuo pomifera est, aurantium ac limonum: arbores magnitudine æquat: Folijs virescit perpetuis, aurantium similibus, vbiq; veluti acu tenuissima perforatis, foraminibus, visum effugientibus. Flores edit ex albo purpurascetes: solidos, calathi figura è quibus poma proueniunt, oblonga, rugoso cortice, flauo, ac suauē odorem spirante. Acidam includunt medullam, succo plenam, in qua semen reconditur hordei figura, sed quadantenus crassius: duro obductum cortice, amaro sapore. Arbor nunquam sine fructu visitur.

L O C U S.

Idem.

Natale solum ijs est calidis in Regionibus, maritimo presertim tractu, & circa amœnos lacus, & si etiam ferantur in hortis, & vindarijs.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 7. simp. me.

Succus vincentem habet qualitatē acidam, & siccam, vti ipse, tertij sit ordinis exiccantium, refrigerantiumq;. Cortex autem exiccat, & non parum habet acrimonię, & proinde desiccet secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra. Porro caro pariter crassi succi est, & puirosa frigidaq;. Semen amarum est, & digerendi videlicet, siccandi; facultatem obtrinet secundo quodammodò ordine à temperatis recedens. Folia verò & digerunt & exiccant.

V I R E S.

Matth.

Semen in vino potum venenis resistit, peculiariter autem Scorpionum i&ibus aduersatur, alium mouet: oris suauitatem commendat. Succus grauidarum malacię succurrit. Pomum vestrarijs imposturum, tunc abigit. Idem totum venenis aduersatur, & succurrit pestilentialibus febribus affectis. Cortex saccharo, aut melle conditus, ventriculū, & cor corroborat. Succus flauam reprimat bilem, & pellicis contagia arceat, & sitim sedat.



MALA Limonia, Italis, Limoni. Gallis, Limons. Germ. Limonett.

LIMONIA MALA.



GENERA.

Maiora: & minora; quæ et. *Matth.*
iam succi bonitate differunt,
& corticis crassitudine. Nam
quæ grandiora sunt, & succo,
& cortice, carneq; longè sunt
præstantiora.

FORMA.

Planta perperua frondevi- *Idem.*
ret, quemadmodum & Citrus,
folijs etiam similibus, sed pau-
lò angustioribus. Flores fert
albos, & odoratos, à quibus
poma oriuntur oblòga, citri
faciem referentia, atq; etiam
colore magis diluto. Eadè o-
mnib; ferè gētibus nota sunt,
magis quàm describi debeant.

LOCVS.

Seruntur tanquam pereгри- *Idem.*
na in hortis, & viridarijs, &
quanquam mangonio cultor-
um in frigidis regionibus vi-
uant, quod hyeme in concu-
mesatis cellarijs recòdantur,
earum tamè prouentus non
est nisi in locis calidis, & præ-
sertim maritimis, & circa la-
cus amantissimos. Ideoq; in Apulia, Calabria, & alijs Regni Neapolitani regio-
nibus copiosa limonia proueniunt.

QUALITATES.

Idem qualitatibus prædita sunt, quibus & Citria mala.

Idem.

VIRES.

Sirupus qui è limonũ succo paratur, extinguit non solum bilis feruorem; sed *Idem.*
quoq; ad sitim extinguendam, & ad pestilentes febres conducit. Aqua distilla-
ta è limonum acida pulpa: expetitur mulieribus ad faciei pitore conciliandum,
quin etiam ad vitiligines, & corporis, cutisq; infectiones delendas, nam & va-
ros delet, & acaros quoq; interimit. Sirupis admista, datur vtiliter acutè, aut cò-
tagiosè febrientibus. Eadem lumbicos necat. Immaturi limonis succus, sefcun-
ci pondere cum vino potus calculos renum pellit.

AVRANTIA mala. Italis, *Aranci*. Germ. *Pomeranz*. Gallis, *Pomme d'Oranger*.

AVRANTIA MALA.

GENERA.

Matth.

Sunt quæ dulcia: quæ acida: & quæ inter hæc media habentur, ut de punicis quoque diximus.

FORMA.

Idem.

Arbor est citro similis, & perinde ac illa perpetua comaviret, folijs lauro latifoliae proximis ac suaviter odoratis, crassis, lævibusq; , & in acutum desinentibus. Ramos habet flexiles, ac obsequiosos; topiarijs operibus haud inidoneos, aculeis firmis, acutisq; refertos. Cortice ex viridi subalbicante: flores albos. odore per quam præstanti, è quibus suavis admodum distillatur aqua. Pomia fert rotunda, aureo colore, odorataq; . Cortice crassiore, pulpa, & succo referta, in qua semen citri simile.

LOCVS.

Idem.

Seritur in viridarijs, & hortis: Maritimis præsertim tractibus: Abundant ijs Campania, Apulia, Calabria, & alia Regni Neapolitani regiones, quin etiam Liguria & Benaci Lacus viridaria.

QUALITATES.

Idem.

Refrigerant & exsiccant, quæ scilicet acida, & vinosa sunt: dulcia verò caloris non sunt expertia. Cortex omnium calidus est.

VIRES.

Idem.

Aqua è floribus distillata, præter quam quod præstâtissima habetur ad odora: præstat quoq; pota sexvnciarum pondere ad sudorem ciendum: quare datur vtiliter cõtra febres pestilenciales, in quibus exanthemata spectantur in cure. Cor corroborat, & spiritus viuificat. Cortex saccharo conditus ventriculum roborat, & flatu pellit. Omnium succus sitim exstinguit & febrientes inuat, præter dulcium aurantiorum. Nam is febrientibus non adeò salubris est, nec sitim sedat.

POMA



POMA Adami. Italis, *Lemie* & *Pomi d' Adamo*. Germ. *Adams Deyffel*.

POMA ADAMI.



FORMA.

Arbor quę hæc edit poma, *Math.* folio est Limonię Arboris maiore, patentioreq; : ramis etiam similibus: floribus Citrei mali æmulis, fructu Aurantijs duplo, triplove maiore rotundo: Cortice haud crasso, pallido, crispo, & inæquali fixuris quibusdam apparentibus, perinde ac dētib; demorso, succosa, acidaq; : mader pulpa, sapore limonum haud lōgē absimili, insipidiore tamen, in qua semina latent citrei mali, aut limonij æmula. Hęc poma, quidam putant limonia esse fœmini generis.

LOCVS.

Seruntur cum Citrijs, li- *Idem.* monijs, aurantijsq; malis, & ijsdem, vr illa proueniunt locis.

QUALITATES.

Refrigerant, exiccant, & adstringunt.

Idem.

VIREs.

Præstat eorum succus ad ea omnia ad quę limonia præstare diximus: minore *Idem.* tamen efficacia: Peculiariter autem valent poma ad scabiem, si per medium secta: & tenuissimo sulfuris pulvere aspersa, & deinde feruentibus cineribus calefacta, scabiosis corporis partibus infricentur.

PYRA, Græcis, *ῥάια*, Arabibus, *Humechte Cirmette*, siue *Kemetry*. Italis, *Pere*. Germanis, *Wyren*. Hispanis, *Peras*. Gallis, *Poyres*.

PYRA.

GENERA.

Matth. Multa ac varia pyrorū numerantur genera, odore, sapore, colore, forma: ac pronuntio differentia. Quin etiam & Sylvestria quoq; copiosa visuntur.

FORMA.

Matth. Varia est quoq; pyrorum facies: quod cū omnibus notum sit quemadmodum & plāta: nec huius nec illorum formam describere libuit.

LOCVS.


Proueniunt ubiq; in collibus, agris, Vineis, horris, & viridarijs. Sylvestria verò locis incultis, & in syluis.

QUALITATES.

Gal. lib. 5. Vini habent exiccandi: ac
simp. me. etiam adstringendi: Atqui
6. 2. de a. Sylvestria longè magis ad-
lim. fac. stringunt. Huc quoq; referri possunt quæ de malis & punicis dicta sunt: namq; sapor vires palam facit.

VIRES.

Diosc. Pyra adduntur vtiliter in repellentibus cataplasmatibus. Decoctum siccorum, & cruda ipsa aluum adstringunt, ieiunos esitales dunt. Recentia cocta esu stomacho grata sunt: Sylvestria præstant dysentericis, caliacis, & sanguinem excreantibus. Ligni arboris cinis datur vtiliter potandus contra fungorum strangulationem: ad quod etiam valet pyrorum sylvestrium succus pomi datus: Quin etiam si ipsa cū fungis coquantur, eos innoxios reddunt.



MESPILVS prima, Græcis, *μέσπιλον*, ἢ *μεσπίλον*, *Ἀρβόριον*. Arabibus, *Zarar*, *Zarur*, & *Alzarur*. Italis, *Azarolo*. Hispanis, *pariter* *Azarolo*.

MESPILVS PRIMA.



crisat, & adstringit, quæ etiam qualitas in germinibus & folijs viget.

VIRES.

Ventris fluxiones cohibent fructus, & multò fortius quàm sorba. Siftunt fau- Gal.
cium gutturisque fluxiones, ubi eorum decocto os collatur. Dantur vtiliter in DIOSC.
mulierum grauidarum malacia. Condiuntur cum saccharo, & asseruantur ad Matth.
omnia supradicta.

GENERA.

Duum Mespilus est generum DIOSC.
folijs, & fructu diuersum.

FORMA.

Primum genus arbor est Matth.
spinosa, mediocris procerita-
tis, & materia Pyro haud absi-
mili, folijs laciniatis Apij æ-
mulis, aut Oxianthæ, flori-
bus albicantibus, racematim
cohærentibus. Fructus illi sunt
Sorborum crassitudine, ruben-
tes, vulgaribus mespilis equa-
les, sed arctiorem umbilico, tri-
bus intus ossiculis.

LOCVS.

Copiosa Neapoli, ubiq; in Idem.
viridarijs, & vineis.

QUALITATES.

Fructus acerbus est ante- Gal. li. 7.
quam maturescar, refrigerat, simp. me.

MESPILVS vulgaris, Græcis, *μέσπιλον*, *ή μεμεχίλιν*. Arabibus, *Zaror zarur*, & *Al-zarur*. Italis, *Nespolo*. Germanis, *Nesfel*. Hispanis, *Nesper*. Gallis, *Nesplier*.

MESPILVS VULGARIS.

F O R M A.

Matth. Folijs est mali, sed minoribus: flores fert albicantes, Cotonæ mali æmulus: fructū rotundū latiore vmbilico, quinque acutis processibus coronato.

L O C V S.

Habetur in vineis, hortis, & sepibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Fruct⁹ acerbi admodū sunt, *simp. me.* & strenuè coercentes, multò & 2. de a. fortius quàm sorba. *lim. fac.*

V I R E S.

Diosc. Adstringunt vehementer, aluum fluentem cohibent.

Matth. Sicca folia in puluerem aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluvium sistunt. Dantur vtiliter sanguinem reijcientibus. Mespilorum officula in puluerem contrita, renum calculos valenter pellunt, vbi cochlearis mensura ex vino, in quo vulgaris Petrosilini radices decoctæ fuerint, ebibantur.



L O C V S.

LOTUS, Græcis, *Λοτῖς*. Arabibus, *Sedar*, siue *Alfadar*. Italis, *Bagolaro*, siue *Perlato*. Germanis, *Zirgelbaum*. Hispanis, *Almez*. Gallis, *Alysier*.

LOTUS, SIVE CELTIS.

FORMA.



Lotus arbor est vastæ magnitudinis, incisuras foliorum habet, perinde ac *Hicis*. Baccas fert Cerasi minores, p maturitatem nigrescentes, & longo pediculo nirentes cerasorum modo: nulli cortex iucundior, aut oculos excipiēs blandius: nulli rami longiores, validioresque, aut plures, vt dixisse totidem arbores liceat.

Diosc.
Theoph.
Plin.

LOCVS.

Montes & valles amat, & plin. expetitur domibus, ramorum petulantia.

QUALITATES.

Non ita multo adstrictioræ Gal. li. 7. facultatis est particeps, sed & simp. me. tenuium est partium, & exicatoria.

VIRES.

Baccæ aluum sistunt, ramentorum ligni decoctum, siue potum, siue Clysmat. Diosc. infusum dysentericis, ac fœminis vterinis fluxibus laborantibus auxiliatur. Rufar capillos, & defluentes cohibet, & citam aluum cohibet.

CENSURA.

Sunt qui contendunt Athenæo *Zyzyphum* nostratæm lotum designare, sed decipiuntur, & hallucinantur.

PSEUDO-

PSEUDOLOTVS, Italis, Loto *bastardo*.

F O R M A.

Matth. Arbor est proœra, folijs latis, oblongisque, firmis, ac nervosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè minore, colore per maturitatē cæruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato.

L O C V S.

Idem. Italix peregrina hæc arbor est, & raris in viridarijs habetur.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Eædem ferè illi qualitates sunt, quæ legitimæ loto tribuntur.

V I R E S.

Idem. Vires quoque eædem illi sunt, si rerum experimentatoribus credimus.

PSEUDOLOTVS.




C E N S U R A.

Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant.

Lotys Africana altera, Italis, Legno santo, sed falso.

LOTYS AFRICANA ALTERA, SIVE
LOTI AFRICANÆ SPECIES.



F O R M A.

Arbor est procera, folijs alterius loti latioribus, baccis rotundis, acuminato tamen acumine, colore cæruleo subnigricante. Hæ pediculis carent, calyculis tamen ima parte obductis, perinde ac glandes, & Mixæ, arboris ramis, & furculis seriarim cohærent.

L O C U S.

Habentur arbores multis in *Idem.* locis in Italia, è longinquis tamen regionibus allata.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Sunt qui velint arborem *Idem.* hanc eisdem cum loto pollere viribus. Id quod nos quoque putamus.

C E N S U R A.

Aberrant, qui hanc loti speciem, Guaiaci esse Plantam contendunt.

C O R N U S,

CORNVS, Græcis, *Κεραία*. Italis, *Corniolo*: Fructus *Cornole*, & *Cornie*. Germani
Arbor, *Cornelbaum*, *Kirberbaum*, siue *Dierlen*/ Fructus, *Welsch Kirschen*. Hi-
spanis, *fructus Cornizolos*. Gallis, *Cornier*, *Fructus* verò *Cornoille*.

G E N E R A.

Theoph. Duum est generum. Quæ-
dam enim mascula est, quæ-
dam verò fœmina.

F O R M A.

Theoph. Masculæ folia habet Amyg-
Matth. dalæ (re autem vera virgæ san-
guineæ vocatæ, haud dissimi-
lia) Corticem neruosum, &
tenuem, caudicem nō nimis
crassum. Cæterū fœmina vir-
gas paruas amerinæ salicis
modo è latere profert, & fru-
ticosior est. Nodos ambæ per
inde ac Amerina, tum gemi-
natos, tum inuicem cōgruos
habet. Mari materies excors,
totaque solida. Fœmina verò
medullam continet, & mol-
lior est. Flos oleæ, baccæ oli-
vis similes, oblōgæ, rufo colo-
re, & singulari pediculo, plu-
res, officulū intus habet oblō-
gū oliuæ modo, in quo nucle-
lapore dulci, odoratuq; gra-
t. Ambæ fructū ferūt, sed fœ-
minæ vix gustabilē esse dicūt.

L O C V S.

Matth. Nasцитur in syluis, in colli-
bus, & dumetis.


Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Fructus admodum acerbus est, ideo valenter adstringit, folia quoque & ger-
simp. me. mina acerbæ sunt, valenterque deficcant.

V I R E S.

Diosc. Baccæ in cibo adstringunt, ideoq; albe profluuii fœminarum atque dysen-
terici salutare, sanies quæ virentia folia torrendo resudarunt, imperigini con-
uenienter illiniuntur: folia maxima vulnera glutinant in duris hominum cor-
Matth. poribus. Ligni materies, quod durissima sit, & admodum robusta, expetitur,
pistrinarijs fabris, ad parandum rotarum dentes: aduersatur lignum à cane ra-
bido demorsis, nam huius tantum contactu in rabiem aguntur.

VIRGA



VIRGA sanguinea; Italis, Sanguineo, & Sanguinello. Germanis, Harttegel.

VIRGA SANGVINEA.

F O R M A.

Arbor est fruticosa, virgis *Matth.* corno tenuioribus, robustis, ac geniculatis, cortice sanguinis modo rufescente, folijs firmis, nervosis, cornoque proximis, brevioribus tamen, ac latioribus: Floret vere, umbellis subalbicantibus, è quibus bacce oriuntur orobi magnitudinis, primū virides, & per maturitatem nigricantes, racemosaque, è quibus oleum exprimitur rusticis, ad lucernarum usum.

L O C U S.

Nascitur in sepibus & frutetis. *Idem.*

**Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.**

Baccæ, amaro, acerbo, adstringenti que gustu sunt, itaque abstergunt, roborant, co-

libent, ac repellunt. Idem quoque præstat oleum, quod ex eis elicitur.

S O R B A.



SORBA, *Græcis* *ῥύβα*. *Italis*, *Sorba*. *Germanis*, *Speyerling*, *Sporöpfel*, *huc* *Speyer*. *Hispanis*, *Sorbas*. *Gallis*, *Sorbes*, & *Cormes*. *Boëmis*, *Kzerbiny*.

SORBA.

G E N E R A.


Matth.

Duo Sorbi domesticæ arboris genera, alterū quidem mas, alterū fœmina: quæ pomorum diuersitate noscuntur. Duo item quoque syluestrium, quorum alterum *Torminale* vocatur.

F O R M A D O M E S T I C Æ.

Matth.

Vtraque caudice exit recto ac longo, ramis in altum assurgentibus: folijs fraxini, sed angustioribus, auersa parte albicantibus, & per ambitum serratis: flores profert albos racematim prodeuntes, è quibus fructus pariter racemosi, in altera quidem orbiculari, & succo odoratiore, ac mitiore, in altera verò ouati pyri faciem referentes, & gustui asperiores, insuauioresq; & minus olentes, colore pallido, in latere rufescente. Hic maris, ille fœminæ esse creditur. Ligni materies durissima & compacta. Fructus straminibus impositi aut suspensi, maturantur.



L O C U S.

Idem, Habentur ferè vbique locorum in Campis, Vineis, & Viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Adstringunt vt *Mespila*, sed imbecilliore effectu.

simp. me.

V I R E S.

DIOSC.

Sorba deuorata aluum sistunt, & præsertim sicca anteaquam maturescant. Id quod præstat earum farina, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat. Datur vuliter farina delingenda dyntericis, cœliaci, & sanguinem reiicientibus, ac etiam fœminis vterinis fluxibus opportunis.

Matth.

SORBUS Sylvestris, vel Aucupalis, Italis, *Sorbo saluatico*. Ananiensibus, *Temelo*. Germanis *Eberaschen*/Bogelbeer.

SORBUS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Folia, & ferè vniuersa planta *Matth.* huiusce facies, à domestica parum differunt. Fructus verò aliter se habet. Ex muscarijs enim, sambuci modo dependet, sed baccis quadruplo maioribus, colore aureo subrufescente, sapore acerbo adstringentiq;

L O C V S.

Prouenit syluosis, ac frigidis locis inter cæteras agrestes plantas.

Q U A L I T A T E S
E T V I R E S.

Baccæ adstringunt, siccant, *Idem.* & repellunt. Asseruantur hyeme ad aucupia, quod turdis gratissimæ sint. Arboris virgæ quod solida, robustæque sint materie, experuntur à rusticis pro stimulis bouum parandis.



SORBUS Terminalis, Italis, Sorbo Terminale, & Sorbo Salustico. Germanis, Wilder Sperwerbaum. Boemis, Vuoskerusse. Fructus, Elsbeer.

SORBUS TERMINALIS.

F O R M A.

Plin.
Matth.

Folio exit-virigineo, Platani modo, lzui, haud infirmo, baccis racematim coherentibus, asperiusculis, & oblongis, coronato umbilico, colore ferrugineo: Sapore ante maturitatē perfectam acido, & austero, postea non iniucundo.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in sylvis, cum cæteris sylvestribus.

Q U A L I T A T E S.

Matth.

Baccæ adstringunt, non tamen adeo valenter, vt domestica.

V I R E S.

Matth.
Plin.

Possunt eadem omnia quæ domestica: sed inefficaciora habentur: Adstringunt enim alnum, & dysentericorū torminibus vtilia sunt, vnde illi nomen.




C E N S V R A.

Matth.

Decipiuntur profectò, qui hanc Terminalis Sorbi plantam Cratægonum esse censent, seipsosq; accusant, negligenter legisse Plinium.

PRUNVS, Græcè, Κοκκυμυλά, & Κοκκυμυλέα. Prunaverò Κοκκυμυλά. Arabibus Anas, Avas, siue Agias. Italis, Pruno susino, Fructus Suecine, & Susine. Germanis Pfäumen / & Kriechen. Hispanis, Prunas, Andrinas, Ciruelas, Ame-
xas. Gallis, Arbor Prunice, fructus Prunes.

P R V N V S.



G E N E R A.

Prunorum genera, varia, Matth. & multiplicia sunt facie, magnitudine, colore, & sapore differentia.

F O R M A.

Arbor est procera, radici. Idem. bus haud altè descendenti- bus, paucisq; , caudice sub- recto, cortice scabro, multis ramis brachiato, folijs latis oblongisq; per ambitum ser- ratis: floribus candidis, folia- tis, racematim prodeuntib⁹. Fructu carnoso, tenui vesti- tus cuticula, ossiculo intus oblongo, in quo nucleolus.

L O C V S.

In vineis, hortis, & virida- Idem. rijs habetur.

Q U A L I T A T E S.

Folia refrigerant, exiccant, diosc. adstringunt, prohibent. Fru- Gal.

Aut verò aluum subducunt, idq; recentes magisque sicci.

V I R E S.

Folia Pruni in vino decocta, collutione, & gargarizatu, Columellam, gin- diosc. givas, tonsillâsque fluxione laborantes reprimunt. Arboris gummi aggluti- nar, & ex vino potum, calculos rumpit. Idem ex aceto illitum infantium li- chenas sanat. Reccentia pruna deuorata stomacho inutilia sunt.

* Prunæ cerea præcocia, Germanis, *Spilling* / & Serotina, *Sipparten*.

P R U N A C E R E A.

F O R M A.

Præcocia parum differunt à reliquis prunis sed tamen toto habitu inelegantiora videntur, cortex stipitis scabrior, folijs acuminatioribus vestitirami, oblongioribusque, Fructus verò cerei plerumque; copiosiore sætu arbores onerât, præcociores sunt reliquis prunis & pulpa minus lapida constant. Serotina minora sunt, colore quoque cereola, sub finem octobris colliguntur, subdulcia, modice astringunt, plura, quinque; ferè, ceu à botro dependent.


L O C U S.

Hortis vinetisque hæ quoque arbores familiarissime sunt.

F A C U L T A T E S.


Præcocia aluum subducunt ut alia pruna dulcia, sed cauendum à nimio ipsorum usu, nam ventriculum grauant & putredini obnoxia sibi similes humorescunt, ideoque multis alui profluvium nec non dysenteriam conciliant.

Serotina vero saluberrima vulgo putantur & visceribus, imprimis pulmonum vitia. Siccata & cocta addito saccharo placent.*



PRUNVS Sylvestris, Græcis, Κοκκύνη & ἀγγία. Fructus, Italis, Prugnole Sal-
natice. Germanis, Schlehendorn / arbor, Fructus, Schleen. Boemis, Trntfi.

PRUNVS SYLVESTRIS.



F O R M A.

Humilis est arbuscula, fru- *Matth.*
tiosa, & ubiq; aculeata, folio
latius Pruni longè angustio-
re, duriore, asperiorèque, flo-
ribus albis, ac numerosis. Bac-
cis vix Acinis æqualibus co-
lore in purpura nigricante.
Viridi intrus pulpa, austero,
adstringente admodum gu-
stu. In quibus os includitur
ceraforum simile.

L O C V S.

Nascitur in dumetis, sepi- *idem.*
bus, & Sylvis.

Q U A L I T A T E S.

Tota planta exiccantis, ad- *idem.*
stringentisq; est facultatis,
quemadmodum & bacca.

V I R E S.

Baccæ Cæliacis, & dysen- *idem.*
tericis vtiliter deuorantur.
Eadem cum arbusculæ radi-

cibus, ex aqua vel austero vino decoctæ, sanant oris, linguæ, gingivarum, Co-
lumellæ, & faucium vlcera, & fluxiones tum collutione, tum gargarizatu,
quare non parum recreantur hoc medicamento, qui hydrargyro peruncti
oris vlceribus, & fluxione laborant, & præsertim addito Lycio, alumine, &
Rhodomelle. Idem decoctum in deflectionibus auxiliatur fœminis vteri pro-
fluvio obnoxijis. Aqua è floribus distillata, interficit hausta intestinorum ver-
mes, oculorumq; fluxiones cohibet.

SEBESTENA, Græcis, Μύζαι, μύζα, & μυζάρια. Arabibus, *Sebesten Motheica*, *Makeita*, & *Mokaita*. Italis, *Sebesteni*. Gallis, *Sebeste*.

SEBESTENA.

FORMA.

Marth.

Arbor est Sebestenus Pruno non admodum dissimilis, folijs comatur pruni rotundioribus, æ firmioribus. Floribus albicantibus, racematim prodeuntibus, è quibus Baccæ oriuntur, prunis parvis similes, calyculo quodam ut glandes ima parte colligatæ, esse intrus triquetro, in quo nucleus. Si maturitatem adepti in atrum virescunt, gustu prædulci, ac lenta, tenaciq; pulpa, ex qua Syri, & Ægyptij viscum ad aucupia parant.

• LOCVS.


Idem.

Proueniunt in Syria, & Ægypto, vnde ad nos conferuntur.

QUALITATES.

Idem.

Emolliunt, sitim sedant, & aluum citant.




V I R E S.

Idem.

Baccæ à cortice purgatæ, linguæ asperitatem mirificè leniunt, & dantur vtiliter ex flaua bile febricitantibus. Pectori opitulantur, quo fit ut tussientibus, & lateris dolore affectis opem ferant. Ventris tineas pellunt, urinæ ardoribus succurrunt. Baccæ triginta, aut quadraginta ex iure carniū mactatæ, deuoratæq; aluum commodissimè citant, sed pinguiore, crassiorisque eligendæ sunt.

ZIZYPHA, Græcis Ζίζυφα. Arabibus, Hunen Zufalzef, sine Hanab. Officinis Iaiuba. Italis, Giuggiole. Germanis, Krot Brustbeere. Hispanis, Azufecifa. Gal-
lis, Iaiuber. Boemis, Iaiuba.

Z I Z Y P H A.



F O R M A.

Arbor est Zizyphus Pru-Matth. no humilior, caudice contorto, cortice scabro, viti viniferæ haud absimili, materie Oxiacanthæ proxima, radicibus firmis, ramis vbique spinosis, è quibus quidâ processus exeunt iunci modo lenti, tenuesq; sparti modo, spithama longiores, è quibus vtrinque per intervalla folia exeunt, impari tamen exortu, oblonga, nō magna, firma, vt in Clematide prima, & sensim per ambitum serrata. Flores edit pallidos, & baccas Oliuarū instar primum virides, subinde pallefcentes, & per maturitatem rubentes, in quibus os concluditur oliuæ simili pulpa dulci, & gustui non ingrata.

L O C V S.

Seruntur in hortis, & viri Idem. darijs.

Q U A L I T A T E S.

In humiditate, & caliditate temperata sunt.

Matth.

V I R E S.

Exiguum præbent alimentum, difficile concoquantur, & stomacho inuti- Gal. 2.
lia sunt. Conferunt pectoris, pulmonis, & lateris morbis, à caliditate genitis. de alim.
Medentur quoq; cum maximè renum, tūm etiam vesicæ affectibus. facul.

ARBUTVS, siue Vnedo, Græcis *κόνια* &c. Arabibus, *Hatladib*. Italis, *Albatro*. Hispanis, *Madronho*, & *Madromethro*. Gallis, *Arbaufier*.

F O R M A.

A R B U T V S.

Matth.

Folia profert laurinīs similia, breuiora tamen paulò, crassioraq; colore ex viridi pallescente, & in ambitu ferrata, rubra per medium excurrente costa. Caudex cortice vestitur subrubro, haud crasso, aspero tamen, & squamoso, à quo rami prodeunt rubentiores. floret mensibus, Iulio, & Augusto, Floribus cædidis, paruis, Lilij conuallij haud longè dissimilibus, racematim dependentibus, è quibus fructus gignuntur rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescunt, & per maturitatem rubent, aspero tactu, nullo intus officulo, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. sapor his insipidus, simul & austerus, & vbi eduntur, linguam, & palatum stimulant, acetosa quadam substantia, quæ exterius conteguntur, integro anno maturescunt.



L O C V S.

Matth.

Nascitur in collibus, & syluosis vallibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7.

simp. me.

DIOSC.

Matth.


Arbor acerba vnà cum fructu est, qualitate: at fructus stomacho insensibilis est, & capiti dolorem infert. Adstringit, roborat, & inspissat.

V I R E S.

Arboris folia expetuntur Coriarijs ad spissanda coria: Non desunt, qui foliorum stillatitia aqua vtantur aduersus pestem, eam in principio dantes cum puluere ossis ceruini cordis, magno (vripsi dicunt) auxilio. In summa vbi adstringere, & roborare opus est, Arbutus eximie præstat.

AMYGDALA, vel Amygdalus arbor, Fructus, Amygdala vel Amygdalum. Græcis, Ἀμυγδαλή & Ἀμύγδαλος τὸ δένδρον, ἀμυγδάλη, vel ἀμυγδαλή, vel ἀμύγδα-
λοι, ὁ καρπὸς. Arabibus, Iauz, kauz, siue Lauzi. Italis, Mandorle. Germanis, ar-
bor, Mandelbaum/ Fructus, Mandelstern. Hispanis, Almendras. Gallis, A-
mandes.

AMYGDALAE.



GENERA.

Aliz dulces, aliz amaræ, a. *Matth.*
liz maiores, aliz minores.

FORMA.

Arbor est vtraque spectata *Matth.*
percritatis, caudice crasso, cor-
tice aspero, radicem habet vè
plurimum vnicam robustam,
grandem, altè descendentem.
Folia Persico per omnia simi-
lia, ac etià flores, nisi dilutioni
esset colore. Nuces edit cordis
figura, quæ antea quam obdu-
rescant, integræ cum putami-
ne comeduntur: duplici con-
teguntur putamine, quemad-
modum iuglandes.

LOCVS.

Tractu gaudent calidiore, *Idem.*
quo fit, vt in Apulia, & Sicilia
copiosissimè proueniant.

QUALITATES.

Dulces nihil prorsus adstri- *Gal. li. 6.*
ctoriz facultatis habent, sola *simp. me.*
enim extenuandi, atq; abster- *Co 2. de*
gèdi facultate pollent, & mo- *ali. fac.*
deratè calidæ sunt. Amaræ o-
mninò extenuandi, & calefa-
ciendi, & abstergerendi faculta-
tem possident. Gummi ex cal-
facit, & adstringit.

V I R E S.

Amaræ illitæ vitia cutis in facie corrigunt. Eadem fronti admotæ, aut temporibus cum *Diosc.*
aceto, aut rosaceo, capitis dolorem mulcent. Illinuntur ad vlcera putrescentia, serpentiaque,
& cum melle ad canum etiam morsus. Deuoratæ ventriculi dolores sanant, aluum emol-
liunt, somnum faciunt, & vrinam ciunt: dantur ad renum morbos, & ad pulmonum affectus,
cum resina terebinthina. Præstant ad coli inflationes, & præcipuè oleum ex ijs expressum.
Quinis septenisve præsumptis, ebrietatem non sentiunt poratores. A vulpibus deuoratæ eas
interficiunt, quin etià & gallinas. Gummi datur vtiliter sanguinem reiicientibus. Impeti-
gines ex aceto illitum tollit, tussi vetustæ cum diluto vino potum mædetur, calculosis verò
cum passio. Dulces impinguant, lateris dolores, ac tussim sedant, & præsertim earum cremor, *Matth.*
Oleum ab ijs expressum mulcet intrinsecos dolores omnes intestinorum præsertim, vteri, ac
renum, si calidum sex vnciarum pondere bibatur, est enim certum auxilium.

PISTACIA, siue Pistacea. Græcis *πισάκια*. Arabibus, *Pustech*, siue *Festuch*. Officinis, & Barbaris *Fistici*. Italis, *Pistacchi*. Germanis, *Walsch Pimpermissian*. Hispanis, *Allocigo*. Gallis, *Pistaches*.

PISTACEA.

FORMA.

Matth.

Tota arbor Terebintho similis est, folijs colore ex viridi in luteum inclinante: nuges racematim prodeunt in ramorum extremitatibus, rubra exterius tunica, & odorata, nuce intus alba, vnguentaria glandifacie simili. Internus nucleus cuticula contegitur rufa, atqui medulla virescit, sapore pineæ nuci proximo, sed odoratiore ac gratiore.

LOCVS.


Idem.

In Persia, Arabia, & Syria vnde in Italiam quoq; aduecti sunt, copiosa proueniunt.

QUALITATES.

Gal. & Auic.

Excalfaciunt, & humectât, impinguant, roborant, aperiunt, non tamen valde nutriunt.



VIREs.


Matth.

Idem.

Stomacho amica sunt deuorata, aut ex vino pota. Profunt contra serpentium morsus. Venerem excitant, tabidos, & suppuratos iuuant. Iocinoris obstructions aperiunt.

STAPHILODENDRON. Italis, *Pistaci Saluatici*. Gallis, *Pistaches sauvages*. Germanis, *Wild Pimpernisslein*.

STAPHILODENDRON, SIVE
PISTACIA AGRESTIA.



F O R M A.

Humilis Staphilodendron *Mattb.* est planta, folio Sambuci, materie admodum imbecilli. Floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus, qui quibusdam in folliculis prouenit, colore subrufo, Ciceris ferè effigie, sed maior, in quo subuirens nucleus concluditur, sapore dulci, sed nauseam commouens.

L O C V S.

Prouenit in Syluis, & fructus *Idem.* tetis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Neminem habeo, qui de *Idem.* horum viribus, & facultatibus scripserit: verum cum nau-

seam moueant, si copiosè edantur, vomitiones eadem mouere posse non dubitamus.

Nvx Iuglans, Græcis *ῥεβα Βασιλῆς*. Arabibus, *lebuz leuz, siue Giauexi*. Italis, *Noci*, Germ. *Nuß*, & *Welschnuß*. Hisp. *Noeses*. Gallis, *Noix*.

F O R M A.

NVX IUGLANS

Matth.

Caudice assurgit procero, ac crasso, ramis multis, ingentibus, & longè, lateq; diffusis, libro vestitur cinereo, crasso, ac rimoso. Radicibus nititur prælongis robustisq; frondibus pluribus vtrunque ab vno pediculo exeuntibus, vt in fraxino oblôgis, & grauitèr olentibus. Primo germinatur paniculas quasdam edit, quæ breui flauescentes decidunt, quas nuces sequuntur, duplici obductæ monumento, nempe calloso primum calyce, mox ligneo putamine, crispo intus nucleo, quadripartitoq; callosa intercedente membrana. Leguntur nuces inchoante Autumno, perticis excussæ, & siccantur in vmbra.

L O C V S.

Idem.

Proueniunt ubiq; in campis, & collibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Folia, & germina adstrictio

simp. me. nem quandam possident, cæ-

Item 2. de terum euidentem, multamq;

alim. fac. in nucis putamine recenti pariter, ac sicco. Recentes nuces neq; adstringentis qualitatibus, neque oleosæ conspicuè sunt participes. Nuclei inneterati verò oleosi sunt, & tenues.

V I R E S.

Diosc.

Deuorata ægrè concoquantur, ideoq; stomacho inutiles sunt, biliosæ; & capitis dolores inferentes, & tussientibus inimicæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ à ieiunis, venenis resistunt, nec minus si à veneni hauustu comedantur largius deuorata tineas latas pellunt. Illinuntur vtiliter mammarum inflammationibus, cum mellis exiguo, & ruta, cum calyce suo perusta, tum deuorata, tum vmbilico admotæ, tormina sedant. Nuclei vsti alopecijis impositi præsentis sunt remedio, recentes stomacho innocentiores sunt, & illitæ liuores auferunt. Panniculæ siccæ, & in puluerem contritæ ex vino albo potæ vteri præfocationibus auxiliantur.

Matth.


NVX



Nux Indica. Italis, *Noce d'India*. Mauritanis, *Neregin*, *Dabig*, seu *Giauz* *Island*.
Italis, *Noce de India*. Germanis, *Indianisch Nuss*. Hispanis, *Noiez de las India*.

N V X. I N D I C A.

F O R M A.



Arbor Palmæ faciem ex-*Matth.*
plicat. Fructus tamē edit præ-
grandes, magnorum Melo-
peponum instar. Nāq; ma-
gna inuolucrorū mole obte-
guntur; colore subrufescēte,
tenax, callosusque, exvillosa
tamen materie constans: quæ
manibus extrita, in capilla-
menta fatiscit. Hoc sub inuo-
lucro nux occultatur. puta-
mine plerunq; triquetro, vil-
loso atq; barbato. Cornu in-
star præduro, anteriori parte
humanam fere faciem refe-
rente, nucléo intus oui anse-
rini magnitudine, inani, sub-
stantia pingui, duriuscula ta-
men, alba, callōsaque; sapore
butyroso, tenui subasperaq;
cuticula obrecto.

L O C V S.

Prouenit hæc arbor copio- *Idem.*
sa in India Orientali, vnde ad
nos affertur.

Q U A L I T A T E S.

Nuces excalfaciunt, & hu- *Idem.*
medant ordine primo: emolliunt, læuigant, & dolores sedant.

V I R E S.

Additur nucléus à tenui cuticula repurgatus, in medicamentis, quibus ex- *Idem.*
tenuari corpora refocillantur. Idem genituram auget, & venerem allicit. O-
leum, quod ex ijs exprimitur, vtiliter inungitur ad hæmorrhoidarum dolores,
quin etiam lumborum, genitumq; cruciatus mulcet. Præstat idem, ad neruo-
rum dolores, & ad pectoris asperitates, non modo illitum, sed etiam delinctū.
Rucedini opitulatur; maciē affectos impinguat, & induratos articulos emol-
lit. Quoddārem laxiore sagina corpora reficiat: Idcirco maximè expetitur a
strigosis mulieribus.

Nux Myristica, Græcis, *Μαχαράριον, μαχαράριον, νάριον μυριστινόν, ή νάριον άραμ-
πνον*. Arabibus, *Teuzbaue Iubague, siue Glauzaban*. Italis, *Noci Moscade*. Ger-
manis, *Muscatenussj*. Hispanis, *Nuez de especie*. Gallis, *Noix Muscades*.

FORMA.

MYRISTICÆ NUCES.

Matth.

Arbor, quæ Myristicas pro-
fert nuces, nostratib⁹ Persicis
haud absimilis est, angustiori-
bus tñ folijs, ac brevioribus.
Fructu nostratibus nucib⁹ in
arbore existentib. persimiles
sunt. Primò .n. crasso ac viridi
cortice cōteguntur: cui dein-
de subest nux ipsa duro satis
putamine occulsa, nostrate ta-
men tenuiore, quam macis
(quem vocant) reticuli instar
ambit: putamine autē fracto,
nux myristica inuenitur, quā
vulgus medicorū Muscatam
vocant. Id quod palam faciūt
nuces integræ, quæ ex India
melle asseruatæ ad nos cōue-
hūt. Cæterū arbores absq;
omni cultu fructus edūt sup-
peditante, tantum natura.

Locvs.

Matth.

Afferuntur ex India, ex insu-
la præsertim nomine Badam.

QUALITATES.

Auicenn.

Serapio.

Excalfaciunt, & siccant or-
dine secundo completo, quin
etiam adstringunt.



VIREs.

Matth.

Commansæ oris suauitatem commendant, & foetentis animæ viru abolent.
Lentigines in facie emendant. Visum acuunt, ventriculum corroborant. Lie-
nem absumunt, vrinam cient, fluētē alium sistunt, flatu discutiunt, & frigi-
dis quibuscunq; vteri affectibus mirificè prosunt. E recentibus prius cōtulis,
& in cacabo calefactis, prelo exprimitur liquor, qui refrigeratus, ceræ instar cō-
crescit, fragrantissimum spirans odorem, & neruorum, & articulorum diurnis
doloribus, à frigore excitatis vtilissimus. Idem expetitur Venereis vñcio-
nibus. Mulcet mirificè nux ventriculi dolores, à flatu genitos, & contra vene-
nosorum animalium ictum ex vino pota maximè præstat.

Latinis, Nux Metella; Recentioribus Stramonium. Græcis nostris, *Βαφοειν* *αυγαι*, aut *Καρφοκρητα*. Arabibus, *Leuzalyachaba*. Italis, *Noce Metella*, *Paracoculi*. Germ. *Stechöpfel*, *Dorrenöpfel*. Gallis, *Pomme de Peru*.

NUX METELLA.



FORMA.

Solanis eius planta adeo si- *Serap.*
milis est, ut aliud nihil quam *Auic.*
ipsum repræsentet: verum *Matth.*
eius folia opiæ redolent. Flores gerit albos, conuoluuli
maioris, siue leuis smilacis æ-
mulos. Fructus Mespilorum
magnitudine, circumquaq;
aculeatus umbilicatusq; vi-
ridi colore, in quo semen,
Mandragoræ simile.

LOCVS.

Seritur nunc passim in hor- *Matth.*
tis, ut alia peregrina.

QUALITATES.

Frigida est excessu quarto, *Serap.*
obstruit, mulcet, vomitio-
nes cieit.

VIRES.

Pota quatuor granorum *Serap.*
pôdere cum vino ferrem fa- *Auic.*

citebrietatem, duorum verò drachmarum pondere hausta, statim interimit,
nisi succurratur epoto butyro calido, vomitu, & aquæ calidæ balneis cum
brachijs, tum cruribus adhibitis.

* *Nvc i* Metellæ congener planta, Tatulæ, vel Datura, Germanis, *Iseltol* ben/*Stachelnuss*. Hispanis, *Burladora*. In Malabar, *Vnmata Caya*. In Canara, *Dairo*. Arab. *Marana*. Persis & Turcis, *Datula*.

F O R M A.

TATVLA.

Caule assurgit crasso ramo-
so vltra humanâ altitudinem,
quam tamé excedit ramorum
ambit⁹, folijs amplis Stramo-
niæ similibus maioribus ta-
men, & in longiores acutio-
resq; angulos desinente am-
bitu, odore opio aliquantum
similia, admodum abominan-
do. Flos in extremis ramis
prouenit vt in Stramonio, cui
subnascitur fructus oblon-
gus aculeis horridus, in quo
semina ante maturitatem cã-
didissima, postea penitus atra
efficiuntur.

L O C V S.

Nascitur in Malauar, sed
apud nos in horris colitur.

Q U A L I T A T E S.

Frigida est excessu tertio &
sicca secundi sine, & pernicio-
sa qualitate non caret.

V I R E S.

Semen dimidiæ drachmæ pondere qui hauserit, diu mente alienatus rema-
net. Si quantitas fuerit nimia, interimit. Gentiles ad prouocandas vrinas cum
pipere & folijs Betele id exhibent & perutile esse dicunt. Sed nolim experiri
cum alia medicamenta ad eam rem vtilia non desint. Semine per noctem in
aceto macerato, deinde exacte trito, vtiliter illinuntur herpes miliares &
erysipelata serpentina, nam breui sanantur. Radix verò drachmæ vnus ponde-
re ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia insomnia & mir-
rerum facies obuersantur.*

Nuces Auellanae, seu Ponticae, seu Prænestinae. Græcis, *Κάρυα ποινική, καὶ πρæνέστις*. Italis, Nocciuole, auellane, & nocelle. Germanis, Haselnuß. Hispanis, *Auellana*. Gallis, Noiffles, Noilettes, auellaines.

NUCES AVELLANÆ.

G E N E R A.

Domestica, & Sylvestria. *Matth.*

Cæterum ex domesticis, aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt, veruntamen oblongas præstātiores, & gustui gratiores esse cōstat, & illas præsertim, quæ rufo sunt putamine, & fractu minime contumaces.

F O R M A.

Arbor est, quæ rarò proce-*idem*. ra spectatur, sed quæ ab ipsis statim radicibus fruticosa sit. Arborefcit tamen ramis in summitate frōdosis, folijs alni latoribus, crispiorib. tenuioribusque, & ambitu serratis. Cortice vestit tenui, & enodi materie: floret hæc arbor nūquam, sed iulos emittit autumnō longi piperis figura, quo tēpore folia decidunt. Nuces eduntur æstate, quorum putamen viridi callosaq; vestitur membrana, molli, & quæ in barbæ modū fimbriata præhatur. Quāquam id nō in omnib. fiat. Nuci nucleus, quādoq; albus, quandoq; purpurea vestitus membrana, dulcis, ferè Amygdalarum modo, sed duriore pulpa.

L O C U S.


Domesticæ habentur in hortis, vineis, & viridarijs. Sylvestres verò vbiq; p-*idem*. veniunt in sylvis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S.

Plus habent essentiaē terrestres, ac frigidaē quā inglandes, quin & plus alunt, Gal. 2. alim. fac. liquidem densiores sunt, & minus pingues. & 7. si. m.

V I R E S.

Stomacho infestæ sunt, medentur tussi veteri, si trita in aqua mulla fumantur. Tostæ & Galen. cum exiguo piperis potæ, destillationes concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut p-*idem* adipe illitus alopecijs capillum reddit. Deuoratæ minus Amygdalis alunt, cibis in ventriculo supernant, & caput tentant, sed virides innocentiores sunt.



AVELLANÆ Indicæ, Italis, Nocivole d' India, Arab. Fauſel.

G E N E R A.

Tria nobis allata ſunt genera.

F O R M A.

Matth.

Prima, quod Serapioni Fauſel appellatur, Myſticæ nuci ſimillima ſpectatur, niſi quod pars altera plana, altera eminentior eſt. Sed nullo penitus odore referta, & ſapore adſtringenti. Naſcitur hæc nux lanuſinoſo, ſeu potius capillaceo involucre incluſa, Indicæ nuciſ modo barbato. Arbor quæ eam proferit nuci Indicæ ſimilis habetur, proceritate tamen minor. Secundum & tertium genus, ex eorum imaginibus hic expreſſis, facile quiſpiam intelligere poterit.

L O C U S.

Matth.


Afferuntur ex India vna cū Myſticis Nucibus.

Q U A L I T A T E S.

Serap.

Refrigerat, quæ Fauſel appellatur, corroborat, & valenter adſtringit.

A V E L L A N Æ I N D I C Æ.



V I R E S.

Matth.

Conferat calidis morbis quibuscunque tam hauſta, quàm exterius illita: decoquitur in vino ad dentium dolores, & fluxiones. Si enim eo calido ſoneatur, non modò eorum dolores mulcet, ſed vacillantes firmat: illinitur quoque ad palpebrarum ſcabiem, & additur in collyrijs, quæ parantur ad oculorum inflammationes. Eſt quoque ad dyſenteriam mirificum auxilium, ex rubro vino aſtero drachmæ pondere quotidie pota, aut cotoneorum malorum ſucco. De cæteris autem generibus quid dicam non habeo.

MORVS, Arbor, Græcis, Μορέα, ἡ συρῆνυς. Arabibus, *Tat*, siue *Thut*. Italis, *Mor-
ra*. Germ. Maulbeerbaum. Hisp. *Moras*, del *Moral*. Gallis, *Maurier*.

M O R V S.

G E N E R A.

Duum est generum, album *Matth.*
videlicet, & nigrum, à fructu
appellationem sortitum.

F O R M A.

Nigra Morus caudice plu- *idem.*
rimū est cōtorto, gibberoq;
ac nodoso. Ramos edit cras-
sos, in latum spatiantes, libro
vestitur crasso, lento ac flexi-
li, cui materies subest robu-
sta, & medullitus flaua. Radi-
cibus nititur numerosis, ma-
gnis, ac robustis, non tamē al-
tē descendantibus. Nigræ fo-
lia latiora, crassioraq; sunt, &
ambabus in acutum desinen-
tia, & circumqua, serrata. Ni-
gra fructum fert Rubi, gran-
diorē tamē, oblongioremq;
Sanguineo succo per maturi-
tatem madentem. In alba au-
tem, baccæ minores habētur,
quæ vbi vltimā sensere matu-
ritatis coctionē, melleā pror-
sus dulcedinem recipiunt.

L O C V S.

Alba vbiq; scatur Italia, ac *idem.*
ēi Hispania ad alēdos sericeos

Bombyces, tantum sata, Nigra verò etiam vbique habetur, aut in hortis aut in
vindicarijs.

Q U A L I T A T E S.

Immatura Mora vbi aruerint, admodum ventrem restringunt. Maturorum succus adstrin-
git mediocriter, immatura verò, & tota arbor admistam qualitatem habent, ex restringente,
& purgante compositam, in radicis autem cortice purgatoria cum quadam amaritudine exu-
perat qualitas.

Gal. li. 8.
simp. me.
& 2. de
ali. fac.

V I R E S.

Mori succus decoctus in aereo vase atque insolatus adstringentior redditur. Idem facit ad
fluxiones, & tonsillarum vixq; inflammationes, addito mellis exiguo, immatura, siccaque
coliacos iuuant & dysentericos. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit,
liras ventris tincas excutit & bis quoq; auxiliatur, qui aconitum biberunt. Succus foliorum
potus valet contra thalangiū ietus, seruē facti corticis, & foliorum iure dentes aptissimē
in colore colluntur. Succus ex incisa radice emanans, vbi concreuerit, in dolore dentium ef-
ficax est, tubercula discutit, & aluum purgat.

DIOSC.

SYCOMORVS, Celfo Morofycos. *Ægyptijs*, Ficus Pharaonis. *Græcis*, Συκομορ, & Συκόμαρος, vel Μαρόσυκος. *Arabibus*, Mumeiz, & Iumeiz, Aliumeiz, & Giumeizi. *Italis*, Sicomoro, & Fico d' Egitto.

SYCOMORVS.

FORMA.

Diosc. *Theoph.* Arbor est magna Fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs mori. Fructū ter, aut quater anno fert, non ramis, vt ficus, sed caudice ipso caprifico. nō dissimili, dulciorem grossis, sine granis interioribus, qui non maturescit, nisi prius vngue, aut ferro scalpatur. Decerptis fructibus, alij ac alij ex eodem loco subnascuntur, terno ita, & quatermo partu copiosæ.

LOCVS.

Diosc. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, Syria, & Ægypto. 3

QUALITATES.

Galen. Succus è vulnerato cortice manans, conglutinar, discutit, emollit.




VIRE.

Diosc. Fructus alio utilis, sed per exiguum præbet alimentum, & stomacho non versatur.

PSEVDOSYCOMORVS. Italis, *Sicomorofalso*. Mauritanis, *Azadaracht*.

PSEVDOSYCOMORVS.



FORMA.

Arbor est præcerea. Folijs *Matth.* vulgaris loti longioribus, & in acutum desinētibus. Baccas edit virides, è quorum ossibus Monachi verticillos parant, quibus funiculo traiectis, suas numerant preces.

LOCVS.

Nusquam in Italia (quod *Matth.* sciuerim nouerimque) hæc planta sponte nascitur. Habetur tamen aliunde allata, in Cœnobiorum claustris, templorum arcis, & alijs in locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Deleteriaræ facultatis parti- *Auicenn.* cepsest, sed quid præter id præstare valeat ignoratur.

GENSVRA.

Ridiculum est credere vnâ cum vulgo, hanc plantam esse sycomorum.

FICUS, Græcis, *ἄρα*. Arabibus, *Sin Fin, seu Tin*, Italis, *Fichi*. Germanis, *Feigen*. Hispanis, *Igos*. Gallis, *Figues*.

G E N E R A.

F I C U S.

Matth. Varia ficuum genera sunt, cum facietum colore diuersa.

F O R M A.

Idem. Arbor caudice plurimum est breui, contortoque, subalbicare libro, lacteoque succo madente, gustu adstringenti, acamaro, adeo vt exulcerare possit, materies illi alba, & fungosa, tenaxq;. Radicibus nititur multis, sed summa tellure vagantibus. Folia illi sunt aspera, ampla, firma, viridinea, rotundis ac robustis pediculis nitentia. Fructus edit nullis apparentibus floribus, à foliorum exortu, extremis tantum ramis, turbinatos, & varios, siquidem alij pyri facie repræsentant, alij sessiles sunt inter hos medij. Differunt et colore, quippe quod alie albe, alie nigre, alie purpuree, alie virides, alie subruface, alie pallide, & alie variegato colore spectentur. Molli præterea sunt pulpa, grana minutis resecta, & esui gratissima.

L O C U S.

Idem. Habentur in hortis, vineis & viciarijs; in Italia, & Hispania copiose.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 2. de alim. fac. Commicabiles sunt, & facile in totum corpus penetrant, nam abstergendi vi possent haud obscura, flatuosa. ramen sunt aliquatenus.

Diosc. Aridæ verò vim habent exalfaciendi ordine primo completo, aut secundo incipiente. Habent & partium tenuitatem quandam. Pinguiore magis concoquuntur, gustu verò aciores, magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac & foliorum succus leniter calidus est, coagulat, exulcerat, aperit, soluit.


V I R E S.

Diosc. Maturi Fici aluum soluunt, sed facile sistitur fluxio, cæterisque autumnalibus fructibus, seu immo seniores, sitim sedant; caloremq; restringunt. Sicci vires alunt. Gutturis, renibus, vesicæ. Suspiriosis, Hydropicis, & comitialibus aptissimi sunt. Thoracem purgant. Earundè decoctum cum Hyssopo tussi vereri, diurnisq; pulmonum vitij conuenit. Cum Cnici pulpa tusa, & decocta aluū emollit. Idem arteriæ, & tonsillarum inflammationibus. vtiliter gargarizatur. Coctæ, illitæq; duritias discutiunt. Crematæ, & cerato addito perniones sanant. Lacteus fici succus, lac in ventriculo concretum dissoluit, exulceratq;. Potus menstrua ciet, & infusus vermiculosis aures sanat. Percussis à Scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Causis dentium inditus dolorem tollit. Verrucas auferit circumlitus. Lac dum coquitur, sicculneo ramo assidue moueatur, aluum soluit.



Ficus Indica; Opuntia. Italicè, Fico d' India. Germ. Indianische Feigen.

I N D I C A F I C U S.



F O R M A.

Arboris faciem repræsentat, quanquam sine caudice, sine ramis, germinibusq; cõstet, vt ex appicta hic imagine quispiam cernere potest. Si quidem hæc abscisso vno tantum folio, humiq; ad mediũ vsque sepulto, prõgnatis ex se radicibus, paulò post folia superne ex ipso prodeunt, aded vt hac serie folijs è folijs prodeuntibus in arboris speciem assurgat. Folia ei crassissima sunt, ita vt quandoque pollicis crassitudinem æquent, è quibus tenues, longæ, acutæque prominent spinæ, et si sine spinis etiam habeatur. Parit hæc in foliorum summitatibus, fructus pulpâ, & sapore ficibus nostratibus similes, sed crassiores, & qui superiore parte in coronæ speciem definant. Colore ex viridi purpurascente.

L O C U S.

Peregrina in Europa est arbor, & in Italia à multis, in hortis colitur.

Idem.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

De viribus, & qualitatibus, quid veri, certiq; afferam, sanè non habeo: referunt tamen, qui Orientales Indias sunt peruagati, eorum esu cruentam reddi urinam, non sine sumentium terrore, qui horum vires ignorant.

IBERIS, Græcis, *Ἰβέρια* *ῥαδάμας* *λαύη*, & *ἀργιόρως* *δαμώρ*. Arabibus, *Seitaragi*, *Asettaragi*, *Scitharegi*, siue *Hausab*. Italis, *Iberide*, seu *Lepidio*. Germanis, *Wilder Kress*. Hispanis, *Nasturtio montefino*. Gallis, *Chasserage*, & *Passerage sauvage*, siue *Nasturt sauvage*.

IBERIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Nasturtij, Caul-
Damocr. lem cubitalem, ramosum, flo-
rem lacteum, semen Thlaspi
simile, sapore acri, grauique
odore.

L O C V S.

Damocr. Nascitur secus itinera, in
ruderibus, templorum areis,
& in agrorum incultis extre-
mitatibus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine quarto,
nasturtij modo, minus tamen
eo desiccatur.

V I R E S.

Galen. Radix contusa, cum salsa
Damocr. axungia, horis quaternis ad-
diosc. alligata, Ischiadicis mirum in
modum medetur.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui Iberi-
dem & Lepidium quas con-
tendunt esse plantas.



Libri primi Finis.

TRITICVM, Græcis *τῖγος*. Aphris, *Henta*, *Henea*, *sive Hantha*. Italis, *Grano*, *sive Formento*. Germanis, *Weissen*. Hispanis, *Trigo*. Gallis, *Fourment*.

TRITICVM.



GENERA.

Plura notantur genera, cum *Matth.*
à locis, tum à colore, viribus,
maturitate, præuentu, & spi-
carum numero, forma ac ma-
gnitudine denominata.

FORMA.

Triticum omne radicibus *Theoph.*
numerosis, ac prætenuibus ni- *li. 8. ca. 4.*
tatur: folio singulari, germini- *de his. pl.*
bus omnino multis, sed quæ in
ramos brachiarum non possint.
Tota hyeme herbacea est: re-
molito autem cælo, cauliculis
de medio assurgit, cuius tercio,
aut quarto geniculo spica ge-
ritur, non prius eiciens, quam
folliculo inclusa. consummato
eo, flos erumpit quarto, aut
quinto post die, ac totidè ferè
diebus perdurat, & post florè
granum crassescit, quod ubi ma-
turuerit, demetitur.

LOCVS.

Seritur ubique locorum. Locis *Matth.*
autè maritimis, & tractu amœ-

nore, calidiorèque frugalius, ac copiosius provenit.

QUALITATES.

Excalfacit foris impositum, non tamen refrigerat, nec desiccatur, manifestè. *Gal. li. 8.*
habet etiam quiddam glutinosum, & obstruens. Fermentum autem excalfa- *simp. me.*
cit, & trahit.

VIRE.

Tritici farina illinitur ex hyoscyami succo ad neruorum fluxiones, & contra *DIOSC.*
interaneorum inflationes. Furfures ex aceto decocti turgentes mammas resol-
vunt: viperarum moribus, & torminosi auxiliantur. Tritici pollen, si ex hydre-
leo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Glutinum ex similagine, &
polline, quo chartæ glutinantur, sanguinè excreantibus prodest, si frequenter
delingatur. Panis è similagine confectus plus alit, quam cibarius. Comendatur *Matth.*
tritici oleum ad ulcerum sinus, ad manuum, pedumque rimas, atque ad cutim læui-
gandam: Paratur compressis grani inter calefactas igni ferri laminas.

FRUMENTVM Indicum. Indis *Maiz*. Italis, *Grano*, *sive formento* Indiano. Germanis, *Türckisch Korn*. Boemis, *Turecken Zjto*.

FRUMENTVM INDICVM.

G E N E R A.

Math.

Quatuor est generum, quæ tantum granorũ colore differunt. Est enim q̃ nigrũ, quod rufum, quod album, quodq; fuluum semen proferat.

F O R M A.

Math.

Caule exit arundinaceo, quemadmodũ & folio, crasso, rotundo, procero, geniculato, alba intus medulla, in cuius cacumine paniculæ funduntur diuulsæ, superuacua, nullis intus granis. Fructum edit folliculo membranaceo incisum è medio calamo ex latere prodeuntẽ, cuius spica piceæ arboris conum cum crassitudine, tum lōgitudine æquat, circa quam omnino nuda coaceruantur grana penitissime sese stipantia, læuia, & subrotunda, pisi magnitudine, alba intus substantia. Radicibus nititur numerosis, durisque.

L O C V S.

Idem.

Scr̃itur in campis, & agris, stercoreato solo.

Q U A L I T A T E S.


Idem.

Nostrate tritico paulo calidius est, ac glutinosius.

V I R E S.

Math.

Farina vtiliter miscetur cataplasmatibus, quæ pus mouent. Id quod etiam lentius præstat fermentum ex eadem farina paratum. Ex ea quoq; rura alpibus tractibus pultem, quam suo idiomate vocant Polenta, conficiunt, & addito butyro, & caseo auidissime vorant. Est enim cibus non insuauis, sed crassum præbet alimentum.



FRUMENTVM Saracenicum. Italis, *Formentone, & Saracino*. Germanis *Heckenform*. Boemis, *Pohanka*.

FRUMENTVM SARACENICVM.



F O R M A.

Folijs prouenit primo statim exortu subrotundis, quæ paulò post hederaceâ formam concipiunt : acutiora tamen sunt, & molliora. caulem edit rubentē, inanem, fragilem, bicubitalē, & sæpe maiorem, foliosumq; flores candidos, paruos, racemosos, è quibus seminat oritur triquetrum, pullo colore, sed alba intus medulla.

L O C V S.

Seritur passim in aruis, perinde ac alia frumentacea, bisq; in anno seri potest: nempe vere, & post messē. Itaq; biferum est.

Q U A L I T A T E S.

Calfacit, & humectat, verum non multum à temperatis distat.

V I R E S.

Farina ex lacte decocta præstat illita ad biliosas inflammationes. Rura, non solum ex ea panes pinsunt, sed pulcem quoq; conficiunt, quam polentam vocant, quæ non ingratus est cibus, vbi rectè fiat, & caseo & butyro aspergatur. Pristinam quoq; ex utrisque puraminibus, è granis parant, & ex carniū iure decoquant ad esum.

C E N S V R A.

Proculdubio falluntur, qui Saracenicum frumentum, ocymum, quod pauli genus est, esse statuunt.

HORDEVUM, Græcis *ῥυζὴν*, & *ῥῆι*. Arabibus, *Xabaen*, *sive shaix*. Italis, *Orzo*. Germanis, *Gersten*. Hispanis, *Cenada*. Gallis, *Orge*.

H O R D E V M.**G E N E R A.**

Theoph. lib. 3. cap. 4. de his. plant. Varia sunt hordei genera: aliud enim binis versibus, aliud ternis, quaternisve, cumq; plurimum senis: est enim vel eiusmodi quoddam genus.

F O R M A.

Matth. Folio exit tritici latiore, asperiorq; , quin etiam culmo fragiliore, sed octonis articulis geniculato, simplici stipula, folioque, & eo quidem scabro, ac tritici latiore. Grana simplici amiciuntur tunica, quæ tamen solidè inhæreat. È cuius cacumine aristæ prodeunt firmiores, longiores, mordaciorésq; , quàm in tritico. Nititur fibrata radice.

**L O C V S.**

Idem. Seritur in agris, perinde ac triticum.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. simp. me. Exiccat, & refrigerat ordine primo, pauxillumq; abstergit, & paulò plus desiccatur, quàm farina fabacea, cui non insunt cortices, cætera verò similia sunt, foris vrentibus.

V I R E S.

Diosc. Minus quàm triticum alit. Præfana verò præstat contra acrimonias, & gutturis scabritias, & exulcerationes. Eadem cum fœniculi semine cocta lactis vbertatem facit: & tumores concoquit. Farina cum ficu, ex multa decocta collectiones, & duritias discutit: cum meliloto autem, & papaveris calyce, lateris dolores finit. Hordeaceus panis ventriculum grauat, & frigidos, lentosq; succos gignit. Præfana febrientibus, & pleureticis commodissimè datur: quin etiam tabidis, & hæctica, aut mærasmo laborantibus, & præsertim addito seminis melopeponis, cucurbitæ, cucumeris & papaveris cremore, Hordeum, quod non diu fuerit elixum, inflat, & ventriculo nocet.

ZEa, Græcis Ζέα, ἡ Ζυὰ. Arabibus, *Haic*. Italis, *Spelta*, *Biada*, & *Pirra*. Germanis, *Speltz* / S. Peterstorn / Rintorn / siue Dincsforn. Hispa. *Spelta*. Gallis, *Espeautre*.

ZEa.

GENERA.

Duum est generum, vna Diosc. simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. & ob id dicoccos appellata.

FORMA.

Folio prouenit tritico haud Matth. absimile, tenuiore tamē culmo firmiorēq; verum spica à tritico differt, quod plana sit, granis tantum vtrinq; è lateribus simplicibus versibus, prodeuntibus: aristis longis, ac tenuibus. Dicoccos grandiore firmiorēque culmo, & spica maiore prouenit.

LOCVS.

Seritur vbique locorum in Idem. agris, ceterorum frumentaceorum modo.

QUALITATES.

Vniuersa sua facultate quo Gal. l. 6. dammodo in medio est tritici simp. me. ci; & hordei, itaq; ex illis cognoscatur.

VIREs.

Valentius alit quàm hordeum. Digeritur in panificia, sed minus quam triticum nutrit. Leues efficit panes, concoctu faciles, haud ingrati gustus. Ex Diosc. Matth. cocco paratur Halica, quæ plus alit, quàm Oryza: aluumq; magis cohibet: stomacho longè vtilior. Decocta in aceto, ac illita lepras tollit, vnguium scabrities extricat: incipientibus ægilopijs, medetur. Infunditur vtiliter decoctum dysentericis, quos excruciat dolor. Diosc. Matth. Diosc.

CENSURA.

Non recte sentiunt qui Halicam, & Far adorem vnam, & eandem esse rem existimant,

SECALE.



SECALE, siue Farrago. Italis, *Segala*. Germanis, *Rott*. Hispanis, *Centeno blanco*. Gallis, *Seigle blanche*. Boemis, *Zito*.

S E C A L E.

F O R M A.

Matth. Folio prouenit tritici angustiore: stipula tenuiore, sed firmiore, ac proceriore, spica pendente, aristis infirmioribus, sed fecundis granis. diu floret, adeo, vt quadragesimo tantum die à flore mature-scat.

L O C V S.

Scratur alpinis tractibus.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Refrigerat & humectat ordine primo: emollit, abster-sione non vacans, & pus mouet.

V I R E S.

Plin. li. 18. cap. 16. Sordidos efficit panes, a-grestibus hominibus idone-os, amarulentos, ac lentos, atq; facile permeabiles: minus alit quam triticū, & hor-deum.

Matth. Decocta integra ab equis deuorata, tineas eorum pellit. Farina additur in cataplasmaris, quæ puri mouendo parantur. Idonea eadem est ad glutinum librarium parandum. est enim cæteris tenacius: cul-morum cinis aqua subactus, & illitus, pedum, manuumq; rimas sanat.



C E N S V R A.

Cæcutiunt qui Secalem olyram esse putant, & pariter hallucinantur, qui Secalem cum Siligine confundunt.

AVINA, Græcis, *Ἄριον*. Arabibus, *Cartamum*, *sive Churtal*. Italis, *Vena*, *sive Avena*. Germanis, *Habern*. Hispanis, *Avena*, *sive Auea*. Gallis, *Avoine*.

A V E N A.



F O R M A.

Folio, & stipula non admo- **DIOSC.**
dum à tritico distat: Spica illi
deuulsa, folliculis veluti par-
uis locustis bipedibus depen-
dentibus, in quibus granum
includitur oblongum arque
subalbicans.

L O C U S.

Seritur in campis. gaudet **Martb.**
que frigido tractui.

Q U A L I T A T E S.

Similem hordeo vim ha- **Gal. li. 64.**
bet. Illita enim desiccatur, & **simp. me.**
digerit mediocriter, & sine
morsu. temperiem autem ha-
bet paulò frigidiorē, & non
nihil quoque adstringit.

V I R E S.

Avena in cibis aluum sistit; **DIOSC.**
& eius pulte tussientes iuvan-
tur. Eadem cum putamine **Martb.**

calcfacta, & in sacculis adhibita flatuosos dolores tollit. utilis quoque ad alen-
dos equos, ac etiam homines. Nam putamine exuta, vescitur à Germanis, ex
iure carniū decocta. Sic enim parata cibus sit haud ingratus, & præsertim
ubi estur antequam diffiliat.

ORYZA, Græcis, *ὄρυζα*, & Theop. *ὄρυζα*. Arabibus, *Arz*, seu *Arzi*. Italis, *Ris*. Germanis, *Reiß*. Hispanis, *Arroz*. Gallis, *Riz*.

F O R M A.

Matth.

Folio pronènit arundinaceo, carnosò, porraceo haud ab simili: culmo cubito maiori, geniculato, triticeo crassiore, ac robustiore, in cuius cacumine spica geritur in ramulos diuisa, in qua semen vtrinque impari exortu conspicitur: putamine subflauo, aspero, striatoque. quo exuto candidum remanet granum.

L O C U S.

Idem.

Gaudet locis vliginosis, ac palustribus, verum copiosissima prouenit in Asia, Syria, & Aegypto. Seritur & in Italia.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3.

simp. me.

Habet adstrictorium quippiam, ac etiam siccandi, resoluenti; potestatem.

V I R E S.

Diosc.

Matth.

Orizain cibus mediocriter alit, sed aluum cohibet. Ex lacte decocta, aut amygdalarum dulcium cremore, aut ex pinguium carniū iure, cibus fit haud ingratus. Quin etiam concoctu faciliior, & ori gratior. Datur in cibus vtiliter dysentericis, cæliacis, & diarrhæa laborantibus: præsertim vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi extincti fuerint, decoquatur. farina belle quidem admiscetur cataplasmaris repellentibus. Eadem mammarum incipientes inflammationes arcer: cum rosæ & anthemide decocta & illita.



MILIVM, Græcis, Κέϋρεος. Arabibus, Ieners, Geguers, sine Giatures. Italis, Miglio, sine Meglio. Germanis, Hirſ. Hiſpanis, Millo, & Miyo. Gallis, Mil, sine Millet.

MILIVM.

FORMA.

Milium folia proferat arundinacea, panico haud longè diffimilia, calamum bicubitalem, crassum, genicularum, lanuginosumque. radicem multiplicem, ac duram, paniculis diuulsis, è cacumine dependentibus, in quibus numerosa habentur grana, parua, subrotunda, solida, læuia, subflaua, ac tenui putamine obducta.

LOCVS.

Seritur in agris, pingui, & Matth. stercoreato solo.

QUALITATES.

Refrigerat ordine primo, Gal. 7. & siccatur tertio exoluto, aut simp. me. certe secundo intenso: paululum etiam habet tenuitatis. comestum minimum confert nutrimenti, & ventrem desiccatur.

VIRE.

Milium & eius panis minus cæteris frugibus alit. Eius pulce sistitur aluus si Diosc. deuoreretur, & promouetur vrina. fit ex eo fomentum optimum ad siccandum citra morsum, ubi prius calefactum cum facculis adhibeatur. Firg; magis effi- Matth. cax auxilium admittis sale, & anthemidis floribus: Siquidem rectè ad tormina adhibetur, quæ à flatu excitantur, & ad lateris dolores. Quæ in milij aceruo conduntur, diutius à carie, & putredine tuentur. imò & ipsæ carnes recentes in milio æstate reconditæ, à putredine vindicantur.

MILIVM Indicum. *Hetruscis, Sagina. Longobardis, Melega. Venetis, Sorgh.*
Germanis, Welscher Hirß/ Sorgsame.

MILIVM INDICVM.

F O R M A.

Matth.

Frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens. eius tamen calamus inanis non est, sed alba farctum medulla, sambuci modo: Paniculas in cacumine gerit magnas, crassasq; numerofo semine refertas, colore plurimum rubro: et si nigro quoq; & subalbicante.

L O C V S.

Idem.

Seritur in campis aratro cultis, ac stercoreatis.

Q U A L I T A T E S.


Idem.

Refrigerat, siccatur, cohibet, & resoluit.

V I R E S.

Matth.

Facultas ei haud milio dissimilis. Rura ex eius farina panes conficiunt, sed concoctu contumaces, & qui parum alant. Alium adstringit. Seritur in Hetruria solum ad alendas columbas, & gallinas. calamorum medullæ cinis cum pipere, & spongiæ vitæ puluere, vitellorum assati excepta, propinatur vtiliter à cœna septem diebus decrescente Luna ad gutturis strumas. Florum pulvisculus à paniculis excussus, ex vino rubro drachmæ pondere potus, rubra sceminarum profluvia sistit, si è rubris paniculis deligatur. namque quod ex albis excutitur, alba profluvia cohibet. Datur pari iuuamento etiam dysentericis.



PANICVM, Græcis, *ἄνθος*. Arabibus, *Dachon*. Italis, *Panico*. Germanis, *Se-
nith*/sive *Heydelfenich*. Hispanis, *Panico*, sive *Paniso*. Gallis, *Paniz*.

PANICVM.

FORMA.

Folio, radice, culmoque *Matth.*
milio est per omnia simile:
Paniculis autē differt: Nam
in panic panicula provenit
pedali longitudine, non ut in
milio diuulsa, sed prædens
compacta racemis, granis
numerosis, & hirsutis.

LOCVS.

Seritur in campis mense *Idem*.
maio, & quandoque statim
post messem.

QUALITATES.

Exiguum dat alimentum, *Gall. l. 6.*
exiccat, & adstringit, ut *mili- simp. me.*
um, ac etiam refrigerat.

VIRES.

Datur edendum dysente- *Matth.*
ricis & alijs alui fluxionibus *DIOSC.*
laborantibus. illinitur co-

sum ubi ficcare, & refrigerare sit opus. sed minus alit, & stringit, quam mi-
lum.

PANICVM Sylvestre, Græcis, *ελυμας ἀγριος*. Italis, *Panico saluatico*, sine *Panica-
strella*.

PANICVM SYLVESTRÆ.

FORMA.

Matth.

Sponte per se prouenit,
gracili admodum culmo, ge-
niculato tamen, cubitali lon-
gitudine. folijs longis, angu-
stis, asperisque: paniculis par-
uis, longis, subrubentibus, ac
adeo hirsutis, & asperis, ut ve-
stibus pertinaciter inhære-
ant.

Locvs.

Idem.

Nascitur in hortis, & viri-
darijs: quin etiam in campis,
& vineis.

QUALITATES.

Idem.

Exiccat, refrigerat, adstrin-
git, magis quàm satium.

V I R E S.

Idem.

In ciborum vsum non vè-
nit, eo tamen delectantur a-
uiculæ, quibus paniculæ offeruntur. cætera cum panico satino communis
habet.



SESAMVM, Græcis, σίταυον. Arabibus, Semsam, siue samsara. Italis, Sefamo. In officinis vulgo, Gingolena.

SESAMVM.



FORMA.

Caulē provenit milio simi- Theoph.
le, crassiore tamen, ac proce- lib. 8. cap.
riore, folijs rubentibus, flore quod pla.
viridi, aut herbaceo, semine hist.
vasculis incluso papaveris
modo.

LOCVS.

Seritur in campis, quos ste-
riles reddit.

QUALITATES.

Non parum glutinosum Gal. lib. 8.
est, & pingue, quare emplasti- sim. me.
cum est, & emolliens, modi-
cè calidum. Eiusdem faculta-
tis est, quod ex eo conficitur
oleum.

VIREs.

Cibis inutile sesamum est, DIOSC.
& halitus grauitatem facit,
neruorum crassitiem illitu
discutit. medetur auribus fra-
ctis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & ceratæ morsibus. facit &
ad capitis dolores æstu concitatos, ex rosaceo illitum. Eadem facit herba ex vi-
no decocta, quæ peculiariter oculorum inflammationibus, ac doloribus au-
xiliatur.

LOLIVM, Græcis, *αἶνα*. Arabibus, *Sceilen*, *sive Zened*. Italis, *Gioglio*, *sive Loglio*. Germanis, *Erwalch*, *Rüweissen*, *sive Eulch*. Hispanis, *Toio*. Gallis, *Turaje*.

LOLIVM.**FORMA.****Matth.**

Cum hyeme nascitur, folio est longo, pingui, hirsuto, ad ultimum deinde culmum edit tritici graciliorem, in cuius cacumine spica exit longa, aculeatis siliquis, impari exortu utrinque referta, è quibus grana terna quaternave cumulatim aperte prodeunt, contumaci obducta putamine. maturefcit vna cum tritico.

LOEVS.**Idem.**

Nascitur in arvis è tritico, hordeoq; corruptis vligine seminibus, aut per hyemem imbre nimio madidis. Corruptur contra & ipsum, & in triticum conuertitur.

QUALITATES.**Gal. li. 6.**

Excalfacit in principio tertij ordinis, & exiccat in fine secundij.

Matth.


Item attenuat, resoluit, abstergit, inebriat, somnum mouet, & mentem tentat.

**VIRES.****Diosc.**

Farina nomas, putrescentia vlcera, gangrenas compescit, cum raphanis, & sale illita. Ex aceto vero & sulphure viuo feros lichenes, & lepras sanat. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, & Lini semine decoctum in vino rumpit, quæ ægre ad coctionem perducuntur. Illinitur vtiliter Ischiadicis ex aqua mulsa decoctum. Si cum polenta, myrrha, & thure sufficitur, conceptionem adiuvat.

FOENVM GRÆCVM, Græcis, Τήλεις, & Βούκερος. Arabib. Olba, Helbe, seu Hebbe. Italis, Fieno Greco. Germanis, Fenigrec, siue Dockshorn. Hispanis, Alfornas, vel Aloluar. Gallis, Fenigrec, seu Senegre.

FOENVM GRÆCVM.



F O R M A.

Planta est trifolio similis, fo *Matth.*
lijs per ambitū serratis, cauli-
bus exilibus, compluribusq;.
Flores edit albicantes, è quib^o
ornicula prodeunt incurua,
longa, acuminatq;., in quib^o
semen gignitur subfuluum,
pingue, & graueolens. Ra-
dice nititur tenui, sed fibrosa.

L O C V S.

Seritur pingui solo Februa- *Idem.*
rio, & Martio calidiori tractu.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine secūdo, & *Gall. 8.*
siccat primo. Digerit, resoluit, *simp. me.*
emollit, pellit, & abstergit. *Matth.*

V I R E S.

Farina ex mulsa aqua deco- *DIOSC.*
cta duos tumores digerit im-
posita, sed feruentibus inflam-
mationibus obest. Lienes ex-
tenuat cum aceto, & nitro il-
lita. Mucoso seminis decocto
iuvantur vteri præclusiones,
ac tumores, si in eo infideant
fœminæ. Seminis mucago cap-
illos, surculos, & manantia
capitis vlcera purgat, & mulie

bres locos dilatat, & emollit, cum anserino adipe supposita. Decoctū eius pro-
dest ad tenasmos, & fetidam dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo
exprimitur, & Myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. Medetur vl- *Matth.*
cerosæ scabiei, si cum quarta parte seminis nasturcij excipiatur aceto, & subin-
de illinatur. Farina ex mulsa vsurpatur vtiliter ad genitalium tumores. Eadem
cum sulphure, & nitro lentigines delet, quin etiam parotidas sanat. Podagram,
chiragram, & articularū luxationes. Ex vino subacta, carcinomata purgat. Da-
tur vtiliter potandum fœnogræci decoctum ad diutinam tussim, & vbi pectus
fuerit exulceratum. Seminis mucago fronti ex lintheolis adhibitum, oculorum
fluxiones auertit. Decoctum verò eius ex aqua oculorum inflammationes ar- *Matth.*
cer instillarum.

LINUM, Græcis, *Λίνον*: Arabibus, *BaZarichichen*, seu *BeZerchetan*. Italis, *Lino*. German. *Lein*/sive *Flachs*. Hispanis, *Lino*. Gallis, *Lin*.

FORMA.

Matth.

Caulē edit sesquicubitalem, teretē, rectū, obsequiosum: folia oblōga, angusta, molliaq; ramulos promit in summitate ternos, quaternosve, in quib⁹ cærulei emicant flores. Semen edit in orbicularis folliculis in acutū desinentibus, planum, leue, cordis figura. Radice nittur vnica, nō tamē sine fibris.

LOCVS.

Idem.

Seritur passim in campis, atrito, ac stercoreato solo.

QUALITATES.

Gal. 6.

sim. me.

Matth.

Excalfacit semē ordine primo, mediumq; est inter siccitatem & humiditatem. Quinetiam emollit, resoluit, concoquit, & abstergit.

VIRE.

DIOSC.

Seminis farina cū melle, oleo, & exigua aqua decocta, discutit, atq; emollit tam internas, quàm externas inflammationes. Eadem cruda vitia cutis in facie, & varos tollit. Illita cum nitro, & siculneo cinere, parotidas, & duritias discutit. Ex vino decocta fauos,

& vlcera, quę serpunt expurgat. Scabros quoq; vngues eximit. cum pari nasturtio, & melle illita. Delincta cum melle pectoris vitia extrahit, & tussim lenit. Estur decoctum semen, melle, & pipere additis, ad excitandam venerem. Eiusdem decoctum infunditur ad interaneorum, & vteri crosiones: alui excrementa euocat, & est vtile admodum in defensionibus quæ ad vuluæ inflammationes parantur. Oleum quod è semine exprimitur valet ad neruorū conuulsiones: perutile quoq; est omnibus sedis affectibus, & ad emolliendos induratos foeminarum locos. infunditur vtiliter coli dolore vexatis, daturq; magno auxilio, potandū pleuriticis, & nephriticis. Medetur ambustis, ex aqua rosarum potum, & illitum. Præstat quoq; ad Lucernarum vsum, quodd diutius igni resistat: Expetitur pictoribus, lapicidis, lignarijs, cæmentarijs, & ferrarijs fabris.

Matth.

LINUM.



LINUM Sylvestre, Græcis, *Alvov ζυγιστον*. Italis, *Lino saluatico*.

LINUM SYLVESTRE.

F O R M A.

Complures ab vna radice emittit *Matth.* caules, graciles, teretes, rectos, ac flexiles, folijs in caule vniuerso lini æmulis, sed breuioribus, ac firmioribus. Flores in cacumine exeunt pusillis è ramulis, aurei, lini floribus facie haud absimiles.

L O C V S.

Nascitur sponte in conuallibus in- *Idem.* culto solo.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Herba ipsa vna cum floribus deco- *Matth.*cta, & cum recenti butyro illita tumores resoluit, & inflammationes lenit. quin etiam induratos articulos emollic; addita althææ radice, & gallinaceo adipe.

C E N S V R A.

Linum sylvestre hanc plantam à no- *Matth.* bis inuentam vocare libuit, non solum, quòd linum facie referat, sed quod lini modo in stamina trahi possit.

N. 5.

* LINUM.



* LINVM Sylvestre cæruleo flore.

LINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Linorum sylvestrium varietas ex alijs autoribus peti potest, est enim infinita fere. Nobis elegantiusculam hanc speciem addere libuit, cæruleo flosculo Satiui æmulam, vti etiam folijs in tenuissimis virgulis sine ordine digestis, semen minus est, radix perennat.


LOCVS.

Oritur sponte circa Vienne, præsertim gramineis decliuibus & iuxta vias.*



Gossipium, Græcis, Ξύλον, Εόμβας, siue παμπάξ, siue ἐριφύρον. Officinis, & Barbaris, Corum, Bambax, seu Bambasum. Italis, Bambagia, siue Cotone. Germanis, Baumwooll. Gallis, Coron.

G O S S I P I U M.



V I R E S.

Lanugo combusta mirum in modum sanguinem è vulneribus manantem *Idem.* sistit. eadem accensa, & naribus suffita, vteri strangulatus auerit. Seminis medulla ruffientibus, & ægrè spirantibus auxiliatur: genitale semen auget, & venæ stimulat. Oleum è semine expressum lentigines, alphas, & cæteras cutis infectiones in facie perunctum delet, & palpebrarum asperitates lenit.

F O R M A.

Planta est quæ Gossipium *Marth.* profert folijs vitigineis, floribus luteis, vmbilicotenus purpurascens: fructu exiguï mali magnitudine, barbato, nucis ponticæ fere modo. is lanugine per quam alba refertus est, seminibus pipere maioribus, in quibus medulla est alba, ac pinguis. Planta seritur, adolescitque tribus, aut quatuor mensibus, ad arbusculæ proceritatem.

L O C V S.

Seritur in Creta, Cypro, & *Idem.* Sicilia insulis, quin etiam in Apulia, & alijs in Regionibus calidioribus.

Q U A L I T A T E S.

Lanugo exalfacit, & exicat. *Idem.* Seminis verò medulla exalfacit, & humectat.

CICER, Græcis, ἐπέσιρδος. Arab. Chemps, Hamos, seu Halhamos. Italis, Ceci. Germ. Richeirn, Richeirerbs, siue Zisererbs. Hispanis, Grauanços. Gallis, Cices, siue Cbichu.

G E N E R A.

C I C E R.

Matth. Satiuū est & Syluestre. Satiuum
Diosc. trium est generum, candidum columbinum vocatum. Rubeum venereum dictum, & nigrum arietinum appellatum.

F O R M A.

Idem. Adolescit cubitali altitudine, folijs oblongis, denticulatis, subalbicanibus, pilosis: caule lignoso, ramis multis brachiato, florib⁹ subpurpureis è quibus siliquæ prodeunt breues, turgentes, hirsutæ, in acutum tenuemq; mucronē desinentes, in quibus ad summum grana duo concluduntur.

L O C V S.

Idem. Seritur pingui solo vere appetente, & maturescit æstate.

T E M P V S.

Idem. Demeritur arescentibus siliquis. nam si citius extirpetur, semen rugosum euadit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Cicera calida sunt, & modicè humida, atq; amaritudinis nō omnino expertia. Prouocant, abstergunt, aperiunt, attrahunt, discutiant, incidunt & flatus excitant.

V I R E S.

Diosc. Satiuum Cicer urinam ciet, colorem commendat, menses, & partus pellit. Lac auger cum eruo decoctum. illinitur vtiliter ad testium tumores, verrucosas formicas, scabiem, vlcera capitis manantia, & impetigines. Item cum melle ad carcinomata, & contumacia vlcera, addita hordeacea farina. Arietinum autem præter hæc præstat peculiariter cū rore marino ad hydropem, & regium morbum, epoto eius decocto. Lēdunt Cicera exulceratā vesicam, & renes, atramentum calculū frāgunt. Venerē stimulant & geniturā augēc. Farina ex Intubi stillatitia aqua decocta, & illita Iocinoris tumores resoluit, & serpentiū morsib⁹ medetur.

Matth.

C E N S V R A.

Errant maximè Germani, qui pisorum ius potandum exhibēt ad abstergendum ventriculum. sibi persuadentes pisum columbinum esse cicer.



CICER Sylvestre, Græcis, *ἐρίσθιος ἄργιος*. Italis, *Ceci saluaticchi*.

CICER SYLVESTRE.



F O R M A.

Satiuo ciceri simillimum *Matth.* habetur, sed folia denticulata non sunt, & siliquæ minores rotundioresque spectantur. Est planta in vniuersum hirsutior, atque asperior.

L O C U S.

Nascitur sponte in agris, *Matth.* & locis incultis.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit & siccat, & cum *Matth.* plus amaritudinis habeat, magis quàm satium abstergit, & aperit.

V I R E S.

Ventrem subducit, sed flatu- *Plin.* tus, & intestinorum dolores gignit.

F A B A.

FABA, Græcis, *Κάππος*. Arabibus, *Hachille*, *Haballe*, *sive Bachale*. Italis, *Fava*. Germanis, *Bonen*. Hispanis, *Hauas*. Gallis, *Fauve*.

G E N E R A.

F A B A.

Matth.

Plura fabarum extant genera, forma, colore, & magnitudine differētia. Alię enim magnę sunt, alię parvę, alię subrotundę, alię compressę, & alię quidē colore albicanre, alię subrutile, & alię subnigro.

F O R M A.

Idem.

Fabarum planta caule exit quadrangulo, obliquo, inani fragiliq; geniculis intersecto. alis etiam multis, ē quibus flores complures ex vno pediculo racematim prodeunt. non vtrinq; quidem, sed vno tantum latere seriatim appensi, versicolores, hirti, ac cristati. Exeunt ē cauli rami, in quibus folia habētur pingua, vtrinq; quaterna. E ramusculorum ca cum inibus clauiculę prodeunt prætenues, ac singulares, quę faciliē perduntur. Siliquas edit cæteris leguminibus maiores, carnosioresq; in quib; fabę cōcluduntur. Vnica nitid radice paucis adnatis fibris.

L O C V S.

Matth.

Seruntur in agris cæterorum leguminum modo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. l. 7.

simp. me.


In exiccando, & refrigerando secundum vtrunq; ad medium temperamentum propinquissimē accedunt adstringunt, discutiunt, desiccant, abstergunt, impinguant, sed status gigaunt.

V I R E S.

DIOSC.

Ex posca decocta datur vtiliter deutoranda dysentericis, & cæliacis. Lomentū eius tumpe se, tum cum farina hordeacea illitum, vulnerum inflammationes mitigat, cicatrices concoctores facit, turgentes lacte mammas iuuat, & ab inflammatione vindicat: Lac extinguit, furculos, sugillata, parotidasq; cum fœnogræci farina, & melle discutit: cum rosīs autem, tharē & oui candido, procidentes oculos, tumores, vuasq; reprimat. Subactum verō cum vino oculorum suffusiones, & ictus recreat. Manducata faba, & fronti illita fluxiones auertit, Fabarum putamine illiti, capillis, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus nutrimentum capeffunt. Fabalium caulium & siliquarum cinis cum veterē axungia illitus, præstat ad coxendices, & veterem neruorum dolorem.

Matth.



FABA Sylvestris. Græcis, *κίβανος ἄγριος*. Italis, *faba saluatica*.

FABA SYLVESTRIS,

FORMA.

Caules edit quadrangulos *Matth.* humi repentes, ac sese inuicem implicant: folijs domesticæ fabæ similibus: floribusque in purpura albicantibus, è quibus siliquæ prodeunt, lupinorum modo pressæ, sed fabarum longè minores. In quibus semen continetur rotundum, fabaceo sapore.

Locvs.

Prouenit sponte in Apulia, *Idem.* campestribus locis.


FACULTATES, ET
VIRES.

Sunt qui dicant hanc eas- *Idem.* dem cum domesticâ habere vires.

CENSURA.

Et si non desint qui hanc plantam Aracum domesticum faciant, nos tamen sylvestrem fabam eandem esse centemus.

ARA-



ARACVS, Græcis, ἀρανος. Italis, Araco.

ARACVS.

FORMA.

Matth. Aracus humi repit, caule anguloso, flexili, subaspero, cicerculæ haud absumile. folia illi sunt oblonga, caulem inferne ambientia, quæ summo cacumine clauiculas rënues fundunt: flores edit non magnos erui fere modo, è quibus filiquæ oriuntur pisi minores, in quibus semen est asperum, rotundum, pullo colore.

LOCVS.

Idem. Nascitur inter segetes, campestribus locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem. Abstergit, resoluit, desiccatur, & expurgat.



FABA

FABA Ægyptia, siue Colocasia, Græcis, Κίανθ' αἰγυπτίῳ. Italis, Fava d' Egitto. Hispanis, Hava de Egipto. Gallis, Fave d' Egipte.

FABA ÆGYPTIA.

F O R M A.



Folia edit ampla instar ga-Diosc. leri: caulem cubito longiorem digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaveris amplitudine, è quo folliculus prodit oblongus, vesparum fauis similis, in quo fabæ supra operculum bullantis ampullæ modo prominent. Radice nititur arundinacea, grandi, Colocasia peculiariter appellata.

L O C U S.

Prouenit in Ægypto, Asia, Diosc. & Cilicia, in Lacubus, & paludibus, feritur humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa.

Q U A L I T A T E S.

Sicuti nostratem fabam ma-Gal.lib.1. gnitudine præcellit, ita & na-de alim. turam humidiorē, magisq; facul. excrementitiā sortitur.

V I R E S.

Manditur virens cruda, pariter & cocta: adstringendi facultatem obtinet, Diosc. itaq; dysentericis, & caliacis prodest, in parso polentæ vice Lomento. Cortices in mulso vino decocti, si terni inde mulsi cyathi bibantur, magis proficient. Quod in fabarum medio viride spectatur gustu amarum, facit ad aurium dolores, si tritum cum rosaceo instilleretur.

Pinximus, hodierno die Ægyptijs dictam Colocasiam, quam peritissimi quiq; negant ferre eiusmodi flores, quales Autor suæ tribuit, & nos parua imagine representatos adieccimus.

LENS, Græcis, ~~Γάρδι~~ Arabibus, Hades. Italis, Lente, & Lenticchia. Germanis, Linsen. Hispanis, Lenteyas. Gallis, Lentille.

LENS.

G E N E R A.

Matth. Duum est generū. Album, quod altero minus est, & in cibis gratus. Cinereo colore alterum, orbe paulo maiore.

F O R M A.

Idem. Maior folio exit viciz, minore, flore hanc longè abfimi, in purpura candicante. Siliqua parua compressa, moliterq; in latitudinem fusa in qua semina terna, aut quaterna concluduntur, rotunda pressa, tenui putamine connecta.

L O C V S.

Idem. Seritur vbique in campis, cum cæteris leguminibus.


Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. In caliditate, & humiditate medium tener, desiccatur tamen ordine secundo. valenter quoque adstringit. Ipsum itaq; eius corpus desiccatur, & sistit ventrem, decoctum ve-

Diosc. rō prouocat. Inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

V I R E S.

Diosc. Cum cortice cocta, & deuorata aluum sistit: contraverō ius primum prouocat. Dantur vtiliter triginta grana delibrata ad ventriculi subuersiones: cum farina hordeacea decocta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat, scissas rumpit, vlceras purgat. Decocta in aceto duritiās, & strumas discutit. Coroneo malo, aur meliloto medetur oculorum inflammationibus. & ademarum aqua, valer ad nomas, quæ in gangrenas euaserunt. Cocta in aqua maris, & illita, lac in mammis concretum dissoluit. Frequenter in cibo sumpta oculorum aciem obrundit, ægrè concoquitur. Stomachum lædit. eumq; & intestina inflat. Somnia tumultuosa excitat. estq; capiti, neruis, & pulmōni inuulsi-



**LENS MINOR.* Græcis φακὸς ἡρακλήϊατος. Germ. Klein Linsen.

LENS MINOR.



F O R M A.

Strigosior est in totum quam maior, & tenuioribus exit cauliculis, durioribus & obliquis foliolis, angustioribusque & minoribus. flores exigui simpliciter albi, siliquæ minores minora semina habentes.

L O C U S.

Seritur & hæc in campis, utraq; solum amat tenue, celiq; temperiem siccam.

Q U A L I T A T E S.

Huc refer quæ de prioribus scribunt auctores.

V I R E S.

Æquipollent & hæc præcedentis facultatibus.*

PHASIOLI, Græcis, *φασόλοι*. Italis, *Fagioli*. Hispanis, *Fasíolos*. Gallis, *Fasioles*.

PHASIOLI.

G E N E R A.

Matth.

Diuerſa, variaq; ſunt Phaſiolorum genera, varijs colorib⁹ diſtincta. Nam candidi, ruſcentes, melini, nigri, ac diuerſi reſperſi maculis reperiuntur.

F O R M A A L B O R V M.

Matth.

Albi, & magis vulgares, qui in campis ſeruntur, ſine pedamento per ſe reguntur, in latum ſeſe pandentes, folijs hederaceis, latioribus tamen, & mollioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntib⁹, flore cāddido, piſi minore. è quibus cornicula prodeunt incurua, ſpithamę longitudine, in acutum deſinentia, quę per maturitatem albeſcunt. In his ſemina plura cōcluduntur quadrupedum renibus ſimilia, alba, vmbilico excepto, qui tantum in ijs nigricat.

L O C V S.

Matth.

ſeruntur in agris, mēſe Maio, & quandoq; poſt meſſem.

Q U A L I T A T E S.

Simeon.

Sethi.

Gal. 4.

ſimp. me.

cap. 23.

Matth.

Excalfaciunt, & humectant ordine primo. Arqui fului, flauī & rubri, albi calidiores ſunt.


V I R E S.

In cibis ſumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, ſemen tamen generant, & venerem ſollicitant, & præſertim ſi cum longo pipere, galanga, & ſaſſocharo aſpergantur. Id autem valentius præſtant, ſi ex lacte bubulo coquantur, quouſq; rumpantur. Redduntur in cibo innocētioreſ, ſi cum ſinapi, aut cum ſemine edantur. Tumultuoſa præterea, ac terrifica ſomnia repræſentant, cornicula dum viridia ſunt & tenera, elixantur, & cum pipere in acerarijs, eduntur. Phaſioli maſticati, & illiti ſanant equorum morſus. Adduntur etiam in facis, quibus mulieres faciem concinnant.



PISUM, Græcis, Πισυδ. Italis, Pisello, & Biso. Germanis, Erbis.

PISUM.



GENERA.

Duum est generum, Alte- Matth.
rum maius, alterum minus; Ma-
ius pedamento gaudet, minus
humii accumbit.

FORMA MAIORIS.

Maius caulibus exit fistulo- Idem.
sis, ramosisq; claviculis mul-
tis è ramorum summitatibus
prodeuntibus, folijs nume-
rosis, longiusculis, subpingui-
busque. Siliquis cylindraccis,
rotundo, & candido semine
se se intus stipante albi cice-
ris maiore. Flores edit papi-
lionis animalis figura, umbi-
licotenus purpureos, & quã-
doq; in vniuersum candidos.
Radice est imbecilli.

LOCVS.

Facilem & solutam terram Columel.
desiderat, & in apricis feri. lib. 2.

QUALITATES.

Exiccant, & refrigerant fa- Gal. 1. de
fac. alim.

barum modo, attamen non æquè ut fabæ sunt flatulenta; tum etiam, quòd de-
tergendi facultatem non habent.

VIREs.

Vbi faba nõ sit ad manus, pisum eius poterit esse succedaneum, præterquam
ijs in morbis, qui abstersione opus habent.

CENSVRA.

Qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, auriginosos sanari, &
aqua intercute laborantes iuuari, proculdubio decipiuntur, quòd hæc haud-
quaquam præstare possit medicamentum, quod refrigeret & siccet. cicera enim,
quæ pisa ij esse credunt, non ipsa pisa, id præstare possunt.

PISUM minus, Græcis, Πισίον μινὸν. Italis, Pisello minore. Gallis, Pois.

PISUM MINUS.¹

G E N E R A.

Matib. Duum est generū, album;
& subnigrum, quod Eruillam
vocant.

F O R M A.

Idem. Maiori per omnia simile,
sed minora & graciliora illi
sunt omnia, humiq; accum-
bit.

L O C U S.


Idem. Seritur, vt maius, aprico
loco, solo probe culto, ac so-
luto.

Q U A L I T A T E S.

Idem. In qualitatibus omnibus
nihil prorsus à maiori differt.

V I R E S.


Idem. Vires eadem minori in-
sunt, quæ maiori inesse dixi-
mus.



ERVUM

ERVUM, Græcis, *Ορεζο*. Arabibus, *Herbum, Keisene, sive Kersene*. Officinis, *Orob. Italis, Eruo, sive Mocho*.

ERVUM.



etiam emolliendi vim habet.

Farina ulcera cum melle purgat, Lentigines, & vitia cutis in facie, & maculas *Diosc.* in toto corpore afflicta delet. Nomas, & gangrenas diutius serpere nō patitur. Mammarū durities emollit, carbunculos rumpit, atra ulcera emarginat, cum vino subacta, & illica, viperarum, & canum moribus medetur, vrinæ difficultates, atq; etiā tenasmos ex aceto mitigat. Melle excepta, ac delincta, crassa pul- *Matth.* monum excrementa eijcit. Eruum à ieiunis deuoratum lienem minuit, inguinum bubones resoluit ex melle illitum. Virentes siliquæ cum suo caule, folijsq; contritæ, illitæq; capillos denigrant. Farina vipereis pastillis additur. Damnatur autem Eruum in cibis sumptum.

C E N S U R A.

Astipulandum haud ijs est, qui Eruiam Pisi genus, Eruum esse contendunt.

G E N E R A.

Duum est generū, Candidū, *Diosc.* & Rufū. Gal. quoq; tertium addidit nempe pallidum, inter prædicta medium.

F O R M A.

Planta est farnērosa, folio- *Matth.* saq; humi procubens, ramis sese implicantibus, folijs parvis, longiusculis, lente minoribus. flores edit paruos, subpurpureos, & quandoq; candidos, siliquam pisi breuiorem, gracilioremq; in qua rotundum concluditur semen, conclusa inter granum & granum siliqua.

L O C U S.

Nascitur sponte in aruis, & seritur quoq;.

Q U A L I T A T E S.

Calfacit ordine primo, & *Gal. 3.* siccat secundo inrenso: quate *simp. me.* nus autem amaritudinis est particeps, eatenus incidit, ex tergit, atq; obstructions aperit. Itē impinguat, vrinam ciet, adeo vt quandoq; sanguinem cum vrina trahat, quin

V I R E S.

LUPINVS, Græcis, *Οἰσῦς*. Arabibus, *Tarinus, Arinus, seu Tormus*. Italis, *Lupino*. Germanis, *Wickbonen/Seigbonen*. Hispanis, *Entramuces, siue Entramucos*. Gal-
lis, *Lupins*.

LUPINI.

FORMA.

Matth.

Vnico exit caule, haud infirmo, folio septisariam dissecto, piloso, molli, subalbicante, flore candido, siliquis fabaceis, compressis; albicantibus, per ambitum crenatis; in quibus quina, senave continentur grana membranis distincta, orbiculata, alba, pressa, umbilicata, & insigniter amara. Radice nititur subfluascente, ac diuaticata.

LOCVS.

Idem.

Seritur in agris, sterili solo: nā ipse solum sibi impinguat.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, & siccit manife-
stè, abstergit, aperit, digerit, resoluit, & attenuat.

VIREs.

Diosc.


Matth.

Farina ex melle sumpta, ventris animalia pellit. Idem præstat ventri illita. Præstat hoc idem eorundem decoctum cum ruta, & melle potum. Idem Lienosos iuuat, quin etiam vlcera terra, gangrenas, pustularum eruptiones, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasque fori sanat: menses, & partus extrahit in vellere subditum cum myrrha, & melle. Eorum farina cutem, & liuores abstergit: inflammationes quoq; cum hordeacea farina, & aqua mitigat: coxendicum cruciatus ex aceto lenit. Cocta in aceto, & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Lupini in cælesti aqua decocti, quousq; lentescant in pulcem, faciem abstergunr. Radicis decoctum ex aqua, vrinam ciet. Ij vbi macerari dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auiditatem faciunt.



**LUPINVS sylvestris*, Græcis, *Σικυό* & *ἀγρίο*. Germanis, *Wilder Fegbonen* / *Teurischer Viel*. Posteriore tamen vocabulo eum dignantur qui florem luteum proferunt.

LUPINVS SYLVESTRIS.



GENERA.

Lupini sylvestres aliquot à se inuicem differentias habere obseruatur, inter quæ præcipuæ duæ.

FORMA.

Prior luteo flore copioso, pulchro, suaueolente spicato insignis est, violam luteam odore & colore prope æmulas. folia & caulis domestico similia sunt, siliquæ minores, duriores, hirsutiores, semina includentes minora, sapore amariss. multis maculis variegata. Alter altius excrescit, & ramosior fit, folijs tamen angustioribus, & minorib. flosculis cæruleo purpurascens aut subrubentib. præditus est: fructus minuti, colore fordido, vario, & nonnihil liuente aspersi sunt.

LOCVS.

Ornuntur plerisque locis sponte, sed nobis non nisi sati proueniunt.

FACULTATES.

Amaritudine superant satiuos, vt Galenus inquit, ideoque præpollent in eisdem cum ipsius generis facultatibus.*

O S. RAPVM,

RAPVUM, Græcis, ραπύον. Arabibus, Selien, Selgem, Selgrem: siue Alfegrem. Italis, Rapa, & Rauo. Germanis, Rüben. Hispanis, Nabo. Gallis, Raue.

RAPVUM.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, sessile, longum, rotundum.

F O R M A.

Idem. Rapum aded omnibus vulgare habetur, vt superuacaneū sit eius formam describere.

L O C V S.

Idem. Seritur in campis, citoque prouenit, nam post messem factum, vbi seges prius fuerat, alpinis tractibus tribus mēfibus perficitur.


Q U A L I T A T E S.

Gal. Radix exalfacit & humectat. Semen verò calidum est, & siccum: cum autem sit etiam amarum, abstergit, aperit, digerit, prouocat, flatu gignit, & venerem excitat.

V I R E S.

prosc. Radix elixa ex iure carniū alit, sed flatu gignit, humentem ac mollem carnem creat. Venerem stimulat, & præsertim cum longo pipere deuorata: forum rapi decoctum pedagricos, & perniones iuuat. Si excuata: radici cera vna cum rosaceo adigatur, & feruenti sub cinere coquatur, auxilium non infimum erit ad exulceratos perniones. Cymæ prius elixa, deuorata, vrinā cient. Semen potum venenis aduersatur: quare in antidotis additur. Constat experimento, valere ad variolas & morbillos, nam potum semidrachmę pondere morbillos latescentes ad cutim expellit.

Matth.



RAPVM LONGVM.



Forma tantum ab altero
differt. Cætera verò nihil dif-
fident.

RAPVM

RAPUM sylvestre, Græcis, γογγύλη ἀγρία. Italis, Rapo saluatico.

RAPUM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth.

Prouenit sylvestre rapum folijs, caule, floribus, siliculis; & semine domestico non ab similibus, sed omnia agrestiora, asperiora, hirsutioraque spectantur. Radicem habet raphani modo longam, crassamq;: sed sapore domestici rapi, præditam, acriore tamen & amariore.

L O C V S.


Idem.

Nascitur in agrorum marginibus, & iuxta semitas.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Radix, quòd acrior, amariorque sit, excalfacit ordine secundo, & siccatur in principio primi. Atqui semē id longè valentius præstat: præterea abstergit, incidit, aperit, attenuat, & prouocat, magis quàm domestici.



V I R E S.

Idem.

Semen in farinam tritum, lentigines, & alphas exterit: potum ventris animalia pellit, & vrinam ciet.

A P P E N D I X.

Tametsi scimus hanc plantam non esse Dioscoridis sylvestre rapum, cum tamen notis omnib; rapum referat, nobis sylvestre rapum ipsam appellare libuit.

RAPUNCULVS, Italis, Raponzolo. Germanis, Rapunzel.

RAPUNCULVS.

F O R M A.



Planta est cubitalis, caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, in cacumine ramosis. Folia profert anteaquam caulem edat, oblonga, humi accubantia, sed quæ in caule sunt, angustiora & longiora habentur. Flores fert in ramusculorum cacuminibus cæruleos. Semen concluditur simplici calyculo nigrum, ac minutum. Radice nititur longiuscula, crassiuscula, & media sui parte extuberante, alba, fragili, terrena, & subdulci sapore prædita. *Matth.*

L O C V S.

Nascitur in aruis non cultis, in collibus amœnis, & in pratis. *Idem.*

Q U A L I T A T E S.

In caliditate & frigiditate rarior, non longe abest à téperatis, imo nec in alijs qualitatibus. *Matth.*

V I R E S.

Estur cruda radix, ac pariter cocta in acetarijs, quod maximè gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quod radix elixa, & cum longo pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat.

C E N S V R A.

Non rectè sentiunt, qui putant Rapunculum, Rapum esse syluestre Dioscoridis: Horum enim sententiæ repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plantarum hist. quippe qui syluestre rapum radice constare longa raphani modo, breuiq; caule consistere scribit.

NAPVS, Græcis, Βουριάς. Italis, *Nauone*, & *Nagone*. Germanis, *Stechrüben*. Hispanis, *Nabicas*. Gallis, *Nauet*.

GENERA.

Matth.

Plura Theophrasto & Plinio habentur genera. Verum nobis duo tantum feruntur, nempe album, & subflauum.

FORMA.

Idem.

Folijs atq; radice, raphano similis est, caule verò, florib⁹, & semine rapum æmulatur.

LOCVS.

Idem.

Seruntur napi in campis, raporum modo, & in hortis.

QUALITATES.

Idem.

Radix excalfacit ordine secundo, & humectat primo incipiente: atqui semē excalfacit & siccat, abstergit, aperit, digerit, prouocat, & incidit.

VIREs.

DIOSC.

Matth.

Cocta radix inflat, modicum alit. Semen potum venenorum vires hebetat, quare antidotis miscetur. Necat idem interaneorum vermes ex limonum, aut Citriorum succo potum: ex adianti autem decocto sumptum morbillos, & ex-anthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat. Datur vtiliter cochlearis mensura; addita Lini seminis drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit ex oxymelite, & tepēti aqua sumptum. Datur quoque diebus pluribus quotidie drachmæ pondere ex marrubij stillatis aqua, aut decocto, vtiliter potandum regio morbo laborantibus. Semen, tulum pressumq; copiosum remittit oleum, ad omnia vtile, ad quæ semen.

NAPVS.



RAPHANVS, Græcis, Ραφανίς, & Ράφανος. Lat. Raphanum, & Radix. Arab. Fegiel, fœue Fegiel. Italis, Rafano, & radice. Germanis, Rettiſch. Hispanis, Rauano, & Rauanillo. Gallis, Reffort.

RAPHANVS.



G E N E R A.

Duum est generum. Sati-
num & sylvestre, quod Ar-
moraciam Latini vocauerunt. DIOSC.

F O R M A.

Folia fert napo similia, a-
spersa, atq; hirsuta: caulis illi
teres, flos alb°, silique tumē-
tes, ac mucronatæ, semine
int° rotūdo, rufo, acuto sapo-
re. Radice nritur varia: non-
nullis. n. inest longa, alba, te-
res, tenera, fragilis, nec ad-
modū acris. Aliquibus crassa
napi figura, altera longē du-
rior & acrior. Differt quoq;
colore: nām q, alba & nigra
vbiq; fere habetur, non solū
latina, sed agrestris quoque. Matth.

L O C V S.

Satiuus seritur in hortis, Matth.
& agris. Agrestis sponte pro-
uenit in campestribus in a-
gro Romano.

Q U A L I T A T E S.

Radix exalfacit excessu tertio,
& exiccat secundo, sed in vtroque Gal. li. 8.
agrestis efficacior. Semen autem simp. me.
longē efficacius est. Quin etiam Matth.
digerit, aperit, prouocat, incidit,
extenuat, rarefacit.

V I R E S.

Radix vrinam ciet. Decocta contra veterem rufsim, & pituitæ crassitiem in pectore efficax DIOSC.
est, lieno sis utilis, suggillata cum melle delet: auxiliatur cōtra viperarū ictus. Alopecias ad pi-
lum reducit. Lentigines cum liliacea farina emendat: valet aduersus fungorum venenū quo-
quo modo sumpta: menses ciet. Recens minutim incisa, & ex albo meraco, & buryo in sartag-
ine calefacta, pubique admota, remoratori vrinam pellit. Idem præstat eius succus duarum
vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis tantundem croci
granis quatuor. Casie odoratæ drachma. Et duabus succi sabinae: omnibus rarissimo linteolo
exceptis, & subpositis, subuenit presentaneo auxilio egrē parturientibus. Radicis succus cum
oleo amarum amygdalarum & vini albi nonnihil feruefactus, addito colocynthidis momen-
to, aurium sonitus curat.

C E N S V R A.

Errant profectō qui raphanum rusticum, de quo statim dicitur, Armoraciam faciunt.

RAPHA-

RAPHANVS longus. Italis, Radice longa.


RAPHANVS LONGVS.

FORMA.

Radicis forma tantum ab altero raphano differt, quæ in hac longa, tenera spectatur, in altera dura solidaque habetur, ac magis quoque actis.


QUALITATES,
ET VIRES.

Cùm sit altera mitior: mitiores quoque vires possidet.



RAPHANVS Rusticanus montanus, Græcis, *ἀργία ῥάφανος*. Italis, *Rafano*, & *Rafano*. Germanis, *Kren*. Gallis, *Rafan*, siue *Reffort sauvage*.

RAPHANVS RVSTICANVS.



F O R M A.

Folijs prouenit Hippolapa- Matth. thi proximis, radice lōga, pollicis crassitudine, ac etiam crassiore, acerrimo gustu, sinapi haud ab simili: floribus in caulium summitatibus albis, & puillis.

L O C V S.

Nascitur sponte in pratis, vi *Idem*. ridaijs, & secus itinera.

Q V A L I T A T E S.

Radix excalfacit, & siccatur ordine tertio completo. Aperit, pellit, incidit, prouocat, at tenuat, & abstergit.

V I R E S.

Ea omnia potest, quæ dome- *Idem*. stica, & agrestis radix, sed valentius operatur. Quinetiam sinapivires obtinet, vrinam, & arenam valentius pellit. Illinitur centrata radix ex vino albo, & recenti butyro calefacta, vtiliter pubi ad ciendam vrinam, siue sit dolor exrenum calculis, siue ex crassa, lentaq; pituita vésicæ ceruicem obstruente. In quo casu datur quoq; non paruo auxilio, potandum vinum, in quo incisa radix fuerit macerata. Germani, Vngari, atq; Poloni hac radice suos condiunt cibos, in quibus quanquam appetentiam facit, reuera tamen, & caput lædit, & nidosas eruclationes mouet.

C E N S V R A.

Rectius fortasse saperent, qui hanc plantam perperam Armoraciam faciunt, si Crateuz Thlaspi, de quo in Thlaspi meminit Dioscandem esse scribe-
rent.

SISER, Græcis, *Σισαρον*. Arabibus, *Culca*, *Fisrum*, *sive Seisaron*. Italis, *Sisarn*.
Germ. *Grüselindren*.

SISER.

FORMA.

Matth.

Folia promi hortensi pastinacæ similia, breviora tamen, atq; minora, cæules etiam similes habet, striatos. Semen in umbella prouenit, petroselinimodo: Radicibus nititur numerosis, asphodeli modo, teneris, fragilibus, dulci sapore, & amariuscule, origanis, tenui intus matrice.

LOCVS.

In Germania ubi passim habetur, seritur in hortis.

QUALITATES.

Gal. 8.

Radix excalfacit ordine simplic. me. cundo, aperit, digerit, vrinam ciet, adiunctamq; habet amaritudinem, cum leuicula adstrictione.

VIRES.

Diosc.

Stomacho haud inutilis est,

Matth.

appetentiam inuat. Venerem stimular.



SISER

SISER alterum, Italis, *Carota bianca*. Germanis, *Gierlin* / *sive Giergellin*. Hispanis, *Chiruius*. Gallis, *Cherijy*, *sive Giroles*, aut *carottes blanches*.

SISER ALTERVM.

F O R M A.



Folia caules, umbellas, flo *Idem*. res, & semen habet sylvestris pastinacæ. Radix, napi effigiem repræsentat, colore albicante, aut subflavescente, sapore subdulci, ac simul amariusculo.

L O C V S.

Seritur in hortis, ac etiam *Idem*. in agris, in vniuersa Germania, & Boemia.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & humectat, *Idem*. inflat, aperit, vrinas mouet.

V I R E S.

Valet radix ad ea omnia, *Idem*. ad quæ Siser primum valere diximus.

A P P E N D I X.

Tametsi sub Siseris alterius nomine hæc planta posita sit, nihil tamen cum legitimo sisere habet cognationis.

LAPATHVM, siue **Rumex**, Græcis, *Λάπαθον ἢ ὀξύλάπαθον*. Officinis, *Lapathum acutum*. Arabibus, *Hunad*, siue *Humad*. Ital. *Lapatio*, siue *Rombice*. Ger. *Amppfer*, *Mengelwurk*, *Streichwurk*, *Zitterwurk*. Hisp. *Labara*. Gallis, *Lapau*, *Parcile*.

GENERA.

Matth.

Quina habentur genera: Oxylapathum, Satiuum, q̃ & Rumex, Syluestre. Quartū quod quidā Oxalida, alij anaxirida vocant. Et Hippolapathum.

FORMA RVMICIS, ET OXYLAPATHI.

Idem.

Exit Rumex folijs betæ nigre proximis, sed minoribus, plantagini ferè equalib⁹, humi accubantibus. Caulis illi inest cubitalis, striatus, flore rubescente, semine minuto, pellucido, nigricâte. Radicibus nititur longis, flauo colore. Oxylapathum autem folijs prouenit longioribus, in cacumine acutis. cætera Rumici similia sunt.

LOCVS.

Prouenit Rumex sponte in hortis, secus itinera, & incultis locis: Oxylapathum verò, in aquosis, & palustribus.

QUALITATES.

Gal.lib.7. *Lapathum* moderate digestum, simp. me. rentē fortitusest facultatem,


at oxylapathum mistam: nam cum eo, quod digerit, non nihil quoq; repercutit. Semen autem eorum, manifestam quandam adstrictionem obtinet.

VIREs.

Gal.ili.
Aetius.
Matth.

Vtriusq; semē, & præsertim oxylapathi dysenterias, diarrhæas, ac cætera alui profluvia cohibet potum. Præstat ad eanum rabidorū morsus, fotu vulneri applicatū, & herba ipsa illita, atq; vna cū radicibus potui data. Vinum in quo oxylapathum decoctum sit, diebus aliquot potum, auriginē pellit. Aqua tota planta distillata, vna cum caphuræ momento, pustulas in facie delet. Herba pubillita, vrinam ciet. Quin etiā radicum ex vino decoctum potum, calculos renum frangit. Idem præstat radicum siccarum puluis. Earundem decoctum fomentis adhibitur scabiem sanat: Idemq; præstat succus cum sulphure illirus.

*LAPA.



**LAPATHVM rubrum*, Cretense, vulgo sanguis Draconis. Græcis Ερυθραία-
μαχον. Germ. Rot Ampffer/Drachenblut.

LAPATHVM RVBRVM.

F O R M A.

Folia & caulis cruento suc-
co turgent, vt manus infici-
ant si premantur, radix lutea
est vt vulgaris lapathi, cui fe-
rè per omnia respondet, ex-
cepta magnitudine.

L O C V S.

Frequētius in hortis quam
alibi nascitur & seipsum serit.

F A C V L T A T E S.

Gustu nitrofiore quā oxy-
lapathum esse depræhendi-
tur. Reliqua huic sunt cū eo-
dem communia. Aluum ciet
iusculum aut expressus suc-
cus sanguineus totius plan-
tæ. Semen eius puluerisatum
& in aliquo decocto adstrin-
gente porum singularem ha-
bet efficacitatem in sistendis
nimijs mensibus & similibus
fluxibus.*



OXALIS, Græcis ὀξύς. Officinis, & Italis, *Acetosa*. Germanis, *Sauer Ampffer*. Hispanis, *Azedrilla*, *Agrelles* & *Azedas*. Gallis, *Oseille*, *Vinette*, siue *Saliette*.

OXALIS MAIOR.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Maior folia promit Lapatho adeo æmula, ut quandoq; oculos fallat: atamen minora sunt, læuiora atq; paulò angustiora. Et ab ipsorum exortu sagittali ferè figura, acido omnino gustu. Radicè nititur, vbiq; fibrata, sed non rumicis modo fulua, sapore perinde ac folia, & caules. Semen profert subrubrum, paruum, & acuminatum. caulem cubitalem, & striatum, & succosum.

L O C V S.

Idem. Nasceitur spontè in pratis, & feritur etiam à nonnullis in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Refrigerat, & siccat excessu secundo, digerit, aperit, & nonnihil incidit.

V I R E S.

Matth. Herba ipsa biliosis, ac pestilentibus febribus aduersatur. Præstat & ad cordis affectus. Sitim sedat, putredini resistit
Diosc. vermes necat, appetentiam excitat. Semen fluentem aluum cohibet, dysentericos, & cæliacos iuuat; stomachi fastidia tollit: Sanat scorpionum ictus; quòd si quis in poru præsumat, nihil molesti patietur ex ictu. Hæc omnia præstat non solum semen, sed vniuersa quoq; planta.



Oxalis minor, Acetosa onillax. Græcis, ὄξαλις μικρά. Italis, Acetosella, Saecciola, & Janniciola. Germ. Klein Saurampffer, Schöpsampffer. Gallis, petite oseille.

Oxalis MINOR.



F O R M A .

Folia promit alteri longè *Matth.* minora, pinguiuscula, lanceæ cuspidis figura; lævia, minutisque, ac rubentibus venulis exarata acidioraque quàm in maiori. cauliculos edit pedales, tenues, in quibus flosculi numerosi spectantur rubentes, ac foliacei, & semen ut in altera subrubens, sed longè minus.

L O C U S .

Crescit exoluto solo, & in *Idem.* culto.

Q U A L I T A T E S .

Refrigerat, ac siccat perin- *Idem.* de ac altera: digerit, & incidit.

V I R E S .

Omnia belle potest, quæ *Idem.* maior; nec infirmioribus pollet viribus.

HIPPOCRATHVM. Græcis, ἵπποκράτιος. Officinis, Rhabarbarū Monachorum. Italis, Rombice maggiore. Germ. Münch Rhabarbare. Gallis, Reubarbe de Mayen.

HIPPOCRATHVM.

G E N E R A.

Matth. Duū est generum, alterum Hortense, alterum sylvestre.

F O R M A.

Idem. Planta est grandis, ac formosa, folijs, semine, radicib⁹, ac cæteris in vniuersum notis, minori lapatho similibus; sed omnia longè maiora, nam folia grandia sunt, helenij ferè modo, radix pariter grandis, vegeta, fuluo colore.

L O C V S.

Idem. Alterum seritur à pluribus spectaculi causa in hortis, & viridarijs, alterum sponte nascitur in palustribus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Digerit, abstergit, mundat, aperit, prouocat.

V I R E S.

Idem. Radicis succus cum sulphure illitus scabiem sanat, cum lupinorum verò facit lentigines, alphas, & alias cutis infectiones exterit. Radicis dilutum, ex vino paratum præstat, ad pellendos renum calculos. Idem facit siccæ radicis pulvis drachmæ pondere ex meraco potus: quin etiam ex marrubij decocto haustus, auriginem curat.



LAMPSANA, siue Brassica sylvestris. Germanis, Keinföl/ Senffhof. Græcis, Λαμλάγν. Italis, Cauolo saluatico, & rapo falso, & rapastrella.

LAMPSANA.



FORMA.

Planta est pedalis altitudinis, hirsutis folijs, sinapi non absimilibus; flore melino subalbicante, semine in corniculis erucæ modo sursum spectantibus.

LOCVS.

Nascitur sponte in campis Matthe. cultis, & incultis.

QUALITATES.

Semen excalfacit, & siccat, Gal. li. 6. absterge di; digerendiq; non-simp. me. nullam facultatem possidet.

VIREs.

In cibum sumpta; succos DIOSC. prauos præcreat, & plus alit, quàm rumex.

P 5

BLITYM.

BLITVM, Græcis, Βασιλός Arabib. *Bachala*, Iamenia, siue *Bachale* Aliamanie. Italis, *Blito*, *Biedone*, & *Bietolone*. Germa. *Wayer*, Hisp. *Bredos*. Gal. *Blette*.

BLITVM.**GENERA.**

Marib. Daum est generum, Rubrū & Albū, & in rubri genere maius & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Rubrum maius, crescit ad arbusculæ magnitudinem, folijs & caule alterius longè maioribus: flore grandi, numerosas veluti panniculas fundente, caeuminibus deorsum spectantibus, atque rubentibus amaranthi fere modo, caule brachiali crassitudine, firmo, lignoso ac striatō.

LOCVS.

Seritur in hortis & viridarijs, & habetur etiam fictilibus ad fenestras opacandas.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Refrigerat & humectat *Blisimp. me.* tum ordine secundo.

**VIRES.**

Gal. 2. de alim. fac. Sumitur in cibum, sed stomacho infestum est. Datur edendum adnerius scorpionum ictus, quinetiam succus idem facit, cum vino potus. *Plin. lib. 16.* ad lienis, & temporum dolores.

BLITVM rubrum minus, Græcis, Βλήτων μικρόν. Italis, Blito, Biedone, aut Bierolone minore, & Gelofia.

BLITVM RUBRVM MINVS.



FORMA.

Folia promit purpurea, *Matth.* amaranthi proxima, minus tamen rubescentia. Caulem quoque habet purpurascens, striatum, cubitalem-que. flores edit spicatos, siue in racemi modum, pariter purpureos: Radicem multifidam, purpureo succo prægnantem.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Idem.* in ijs spontè prouenit.

QUALITATES.

Refrigerat, humectat, & *Idem.* emollit.

VIREs.

Auxiliantur peculiariter *Idem.* ad menses remorantes prouocandos, molas, & secundas educendas, si foeminæ vapore decocti calidi suffiantur, aded, vt vapor ad vterum ascendat.

das educendas, si foeminæ vapore decocti calidi suffiantur, aded, vt vapor ad vterum ascendat.

BLITVM

BLITVM album, Græcis, Βαϊτλον λευκόν. Italis, Blito, Biedone, & Bietolone bianco.

FORMA.

Matth. Folia profert Blito rubro minori similia, subalbido colore. Flores & semen racematim tenuibus insident ramusculis, ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie.

LOCVS.

Matth. Sponte nascitur in agris nō cultis, secus itinera, ac etiam in hortis, & areis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Iisdem qualitatibus & viribus pollet, quibus & cætera genera.

BLITVM ALBVM.



*BLITVM

* *BLITVM sylvestre*. *Polyspermon Aloysij Anguillare*. Græcis, *Βλίτον ἄγριον*, aut *ελιανθρον*. Germanis, *Wildt Meier* / *Wildt Traubenkraut*. Italis, *Biedoni*, seu *Blito saluatico*. Hispanis, *Bredos saluages*. Gallis, *Blete sauvage*.

BLITVM SYLVESTRE.

FORMA.

Minus est reliquis generibus *Bliti*, folijsq; ocymi angustioribus, flosculis racemosis, & semine copiosissimo *Botrys*o insar, nigro splendente, radix alba gracilis.

FACULTATES.

Hac mirè capiuntur pisces, vt experientia confirmati tradunt.*



MALVA.

MALVA, Græcis, Μαλὰν. Arabibus, Chubeze, seu Chabazi. Ital. Malva, & Malua.
Germ. Pappel. Hispanis, Maluas. Gallis, Malue.

MALVA.

G E N E R A.

Matth. Vna hortensis, altera agrestis, & vtraque maior, & minor.

F O R M A.

Idem. Vulgaris adeò notitiæ malua est, vt eâ calamo delineare opus non sit.

L O C V S.

Idem. Prouenit sponte, & sata quoque in hortis & viridarijs, & vbique.


Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Domestica quanto plus habet aqueæ humiditatis, quàm agrestis, tanto minus digerentis est facultatis.

V I R E S.

Diosc. Illinitur vtiliter contra aculeatos apium, & vesparum ictus, nec ab his feriuntur, qui ea trita cum oleo fuerint peruncti. Sanat capitis vlcera, & furfures: medetur sacris ignibus, & ambustis decocta folia, & ex oleo illita. Eius decoctum in sessione vulvas emollit, quineriam clysmate infusum, vesicæ, & intestinorum erosiones sanat. Ius decoctæ vnâ cum radice, bibitur vtiliter contra omnia venena, si cōtinuò à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum ictus remedio est. Semen ex vino potum, lac euocat, vrinæ cruciatus tollit. Feruescētia folia in cibum apposita rauces expediunt, ex sale autem, oleo, aut recenti butyro aluum citant. Folia cum porris, & capis illita, præstant ad serpentium venenosorum morsus. Succus tribus instillatus dolore sedat. Foliorum, & radicum decoctum ad lentorem vsque feruescētum datur potandum agrè parturientibus magno iuamento. Idem præstat succus felibræ pondere potus. Semen ex vino rubro potum, nauseam tollit. Cauliculi molles elixi, delibrat. que comeduntur asparagorum modo, ad citandam aluum. In summa, Malua ad multa vtilis est, ideoque non immeritò antiqui Maluam Omnimorbiâ vocauerunt.

Matth.



MALVA Arborea, siue Malua maior, Mosceutos Plinio. Græcis, *Δενδρὸν μαλᾶρον*.
 Italis, *Malva*, siue *Malua maggiore*. Germanis, *Grosse Pappel* vel *Pappel Rosen*.
 Gallis, *Malus de lardin*.

MALVA ARBOREA.

FORMA.



Folia gerit hortensis Mal- *Math.*
 uæ grandiora subhirsuta, per
 ambitū hortensis Maluæ mo-
 do diuisa, longisque pediculis
 appesa. Stolonibus interdum
 singulis, interdum pluribus
 ab vna radice prodeuntibus,
 tricubitalibus, & quandoque
 maioribus, subhirsutis, baculi
 effigiem referentibus: floribus
 in superiore parte cauliū sese
 pendentibus, rosarum modo
 amplis, & quandoq; foliorum
 multitudine similibus: colore
 in quibusdā purpureo, in non
 nullis candido. Et in quibus-
 dam subpurpurascente. Semē
 edit cæteris maluis simile, sed
 maius: Radicibus nititur vali-
 dis, & multifidis.

LOCVS.

Seritur in horris, & virida- *Idem.*
 rijs, ac etiā in fictilibus, ad opa
 candas in æstate fenestras.

QUALITATES ET VIRES.

Ea omnia faciliè præstare potest, quæ & cætera maluarum genera.

Idem.

ATRIPLEX, Græcis, ἀτρίφαξις, ἢ χεντολάχανον. Arabibus, Cataf, siue Cataf. Italis, Atriplice, Reppice, & Treppice. Germanis, Molten, seu Wiltten. Hisp. Armoles, Gallis, Choux, Arroches, Bonnes, Dames, Folles, seu Femmes.

ATRIPLEX.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, Hortense, Sylvestre, Marinum.

F O R M A.

Matth. Hortensis Atriplex folia mitit humotenus lata, in mucronem tamen desinentia, sagittarū instar, pingua, succosa, colore ex viridi in luteum languescente: caulem rubrum, multis vndiq; adnatis ramis, qui ad quatuor cubitorū mensuram adolescit, semine spicato, pressis, tenuibusq; folliculis occluso.

L O C V S.

Matth. Seritur à rusticis in hortis, & in campis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Humida & frigida temperie est. Humida quidem secundum ordinis à medijs, frigida vero primi, quam vtiq; tepidam esse caliditatem dicimus, cuiusmodi in rosis inest, non tamē adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimē terrena: Hortensis itaq; tum humidior est, tum frigidior sylvestri, & paululum omnino est, quod digerendi vim obtrinet. Semen autem abstergendi vim habet.

V I R E S.

Diosc. Panos discutit si cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua multa potum, regium morbum sanat. Idem potum vomitiones ciet, & aluum exoluit: Estur herba cæterorum olerum modo.



ATRIPLEX sylvestris, Græcis, ἀράπαξ ἀγρία. Italis, *Reppice saluatico*. Germanis, Wild Milten. Gallis, *Arroches sauvages*.

A T R I P L E X S Y L -
V E S T R I S I.

G E N E R A.

Trium est generum folio- *Matth.*
rum diuersitate dissimilium.

F O R M A.

Primum genus folia edic
hortensi haud dissimilia, mi-
nora tamen, & quæ ad terram
sunt per ambitum laciniata,
subalbicantiq;: caulem ses-
quicubitalem, ramosum, ac
etiam striatum: semen race-
mosum, & exile: Radicibus
necitur numerosis, ac tenui-
bus.

L O C V S.

Nascitur sponte cum in
hortis, & vineis, tum secus
itinera, & locis incultis, &
campestribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Humida est, & frigida, sed *Gal. 6.*
simp. me.

minus quam hortensis. Itaque aliquantulo plus digerit.

Q

ATRI-



ATRIPLEX SYL-
VESTRIS. II.

FORMA.

Folijs exit latioribus, quercus modo per ambitum incis, subalbicanribus. cætera cum altera paria sunt.

LOCVS.

Nascitur prope vrbium mœnia, & locis quoque alijs incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem illi sunt qualitates & vires, quæ priori.



ATRIPLEX

ATRIPLEX SYL-
VESTRIS III.



FORMA.

Folia habet oblonga, viridia, carnosa, non, ut reliqua laciniata, in acutum desinentia: semen racemosum, ceteris minutius, caule ramoso, supino atq; striato.

LOCVS.

Nascitur intra, & extra urbium, & oppidorum moenia, & in areis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus praestat, quibus, & praecedentes.

ATRIPLEX Marina, Græcis, ἀτρίπλεξ θαλασσία. Italis, *Atriplice*, siue *Reppice marino*.

ATRIPLEX MARINA.

FORMA.

Matth. Caules humi repunt, in quibus folia exeunt albicantia, spanachij oleris figura, minora tamen, falso sapore: Semen profert in caulium summitatibus racemosum, radicem diuaticatam, multifidamque.

LOCVS.

Idem. Nascitur sponte maritimis locis, non procul à litore.

QUALITATES.

Matth. Abstergit magis quàm cetera genera, magisq; aluum citat, & digerit. Incidit, attenuat, liquat, à putredine vindicat, aperit, & abradendo expurgat.

• VIREs.

Idem. Humentem ventriculum siccat, hydropicos iuuat, pingues extenuat.




SPANACH-

SPANACHIVM, Græcis, Σπανάκιον. Italis, Spinace. Germanis, Spinat. Arabibus, Spanach. Gallis, Espinaches, sive Espinars.

S P A N A C H I V M.

F O R M A.



Nascitur septem diebus, à *Matth.* satione, folijs primū triquetris, quæ deinde in sagittæ formam exeunt, mox à pediculo intybi sylvestris modo lacinia evadunt. Exigua nititur radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, & quandoq; maiori, inani tamen flores gerit in vertice rotundos, paruos, herbaceosque, racematim coherentes, semen aculeatum, angulosumque.

L O C Y S.

Seritur passim in hortis *Idem.* cæterorum olerum modo.

Q U A L I T A T E S.

Humidum est, & frigidum *Matth.* ordine primo, nec omnino vacat nitrosa qualitate.

V I R E S.

Alum emollit, sed flatus gignit. Succus foliorum potus, præstat ad scor- *Serap.* pionum, & phalangiorum ictus. In cibum deuoratum, lenit exasperatas arterias.

KALI vel Vſnenita Mauritanis vocata. Italis, *Soda*, *Salsola*. Gallis, *Soede*.

K A L I.

* G E N E R A.

Plurima eius habentur genera, è quibus quatuor exhibebimus.

F O R M A I.

E T I I I I.

I. Multis ramulis fruticat, è stipite lignoso, grandi perpetuo, & interdum ad duos cubitos atollitur, subrubente cortice obducto. Surculi ex folijs ceu granulis, hordei magnitudine, componuntur sapore salsuginoso.

IIII. Vel idem genus habetur, vel parùm differt à priori, granulis tantum in summitate rotundis ceu seminibus annatis, lenticulas referentibus, aut exiles squamas.

L O C V S.


In maritimis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Calida & sicca est herba, & calidior ex eo confectus cinis, qui ad quartum qualitatis vtriusq; gradum accedit, vrendiq; & causticam vim habet.


V I R E S.

Comburentur in cinerem hæ plantæ, quo liquefiunt contriti lapides ad parandum vitrum. Lixiuum inde percolatum acerrimum & mordacissimum, addito oleo in saponem decoquitur ad abluendas vestes vtilissimum. Herba exigua quantitas intro assumpta, vrinas & menses potenter euocat, særum eicit, aquosos per alium humores ducit, hydropicos purgat. Eius nidore fugantur serpentes. Miscetur etiam cinis, quæ scabiei & curis sceditatibus illinuntur, medicamentis. superfluum & excrecentem in malignis vlceribus carnem exci.*



* Cal. II. & III. *Salicornia*. Germanis, *Salstrauf*,

C A L I.



F O R M A.

II. Frequentioribus ramulis prodit è stipite cinereo componiturque tota planta quasi granis in se inuicem confertis, superioribus semper inferiorum osculis ceu acetabulis insidentibus. III. Tenerior est herbula, folijs crassis, pinguibus, carnosiss, teretibus constans, ut reliquæ id genus plantæ præcedentes, quæ omnes, ut ex iconibus patet, differentias parvi momenti sortitæ sunt, & autumnî tempore rubent.

L O C U S.

Ad maritimas oras crescit & minor illa species in Germania quibusdam in locis circa Salinas & salios lacus prodire visitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Huc refer quæ paulo ante de reliquis dicta sunt.*

BRASSICA lævis, Plinio Cumana, Græcis, Κραυση λεία, Theop. λεϊευλαθ.
Arabibus, *Corumb*, seu *Karumb*. Italis, *Cauolo liscio*, sine *Verza liscia*. Germa-
nis, *Köl*. Gallis, *Choux Vers*, aut *Choils*. Hispanis, *Colthes*, seu *Couues*.

BRASSICA LÆVIS.

F O R M A.

Matth.

Folio exit grandi, ima parte
vtrinq; dissecto, per ambitū
fimbriato, læui, pinguiq; cau-
le breui, firmo, subalbicante,
albaint^r medulla. Flores edit
melinos, & semē rapi simile,
ac similibus quoque siliquis
inclusum subrufo colore, &
subamarum.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis.

F A C U L T A T E S.

Gal. 7.

simp. me.

Desiccandi vim habet, non
ramē admodum acrem, quin
etiam emolliendi, glutinan-
di, & abstergendi.

V I R E S.

DIOSC.

Cæcūrientibus, & tremu-
lis deuorata prodest, Summo
cibo sumpta crapulā discutit,
& vini noxā restinguit. Cru-
dus succus cum nitro, & Iride
deuoratus, aluū emollit, ex
vino verò potus, viperarum
morsib⁹ auxiliatur. Cum fœ-
nogræci farina, podagris, &
articulorū vitijis cōmodē illinitur. Prodest sordidis, & vetustis vlceribus. Caput
purgat naribus infusus, Menses trahit cū loliacea farina inditus. Illita folia per
se, aut cum polenta, conferunt inflāmationibus, & tumoribus, & ignē sacrum,
leprāsq; sanant, carbunculos ex sale rūpunt, fluentes capillos retinent. Ex mel-
le cocta valent ad depascentia vlcera, gangrenāsq;. Cruda ex aceto lienosis pro-
sunt. Mansa, & exucto succo retusam vocē instaurant. Decoctū eorum porum
aluū, & menses ciet. Semen porū tineas ventris pellit: lentigines, alphōsq; illitū
in facie purgat, caulū cinis adipe suillo exceptus, illinitur vtiliter ad diurnos
laterum dolores: Brassica leuiter feruefacta aluum citat deuorata, percoctave-
rō sistit.



BRASSICA crispa, seu Sabellica Plinio. Græc. κράμνη δουλίσφυλλοι. Italis, Cazzolo crespo, seu Verza crespa. German. Krausföhl.

BRASSICA CRISPA.



FORMA.

Caule exit firmo, nodoso, *Matth.* è quo folia numerosa exeūt, lata crispaq; , & quæ in medio sunt, crispiora, albicanria, & in orbem conglomata, tenera, & in cibis grata.

LOCVS.

Seritur in hortis, perinde *Idem.* ac altera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat ad ea omnia, quorum in læui Brassica memimus, *Idem.*

BRASSICA capitata, siue Imperialis, Græcis, Κράβη κεφαλάς. Italis, *Cappuccio*, *Cappuzzino*. Germanis, *Rapstrauc*. Gallis, *Choux*, *Caluz*. Hispanis, *Repollo*, *Colhe morcianos*.

BRASSICA CAPITATA.

FORMA.

Matth.

Folia fert primum ampla subrotunda, à pedamento in girum sese fundentia, quæ deinde in orbem capitatum, ac solidum cōglomerantur, qui in aliquibus rufescit, in quibusdam albicat, in nonnullis virescit.



LOCVS.

Idem.

Seritur in Germania in campis. In Italia verò in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.


Matth.

Viribus ab alijs brassicis non differt, nisi quod in cibis nocentior habeatur.

*CAVLORAPV M, Rapæcaulis. Græcis, κράμβη γογγυλάδης. Germ. Rübenföhl.

CAVLORAPV M.

F O R M A.



Lævi brassicæ congruit foliorum figura, quæ tamē nonnunquam crispantur profundis lacinijs, sed magnitudine capitatam ferè adæquat, eius caulis crassescit infra folia iuxta radices, extuberatq; in rapæ mediocris magnitudinem, flores & semina veluti aliæ profert.

L O C V S.

Hortensis est, & amat solum mediocre, pingue, & bene stercoratum, probeq; subactum. Semen aliunde inferitur.*

*BRASSI-

*BRASSICA cauliflora, siue Cypria, Plinco Pompeiana. Germanis, *Käpflin*, *föl*; *Blumentöl*. Italis, *Caulo fiore*. Gallis, *Chou floriz*.

BRASSICA CAULIFLORA.

F O R M A.

Caule folijsq; imitatur l^z-
nem brassicam sed albidior
est, crassiorq; ac in totum ma-
ior, in medio foliorum in ca-
put conglomerantur ramuli
pingues albidi molles, quasi
asparagi, denso ordine com-
pacti, Floret vt vulgaris bras-
sica, cui semen etiam simile
profert.

L O C U S.

Peregrina est, & instructio
ribus tantum hortis manci-
pata. *



BRASSI-

BRASSICA marina, Græcis, Κράμβη θαλασσία. Italis, & Officinis, Soldanella.
Gallis, Chou de mer.

BRASSICA MARINA.



F O R M A.

Facie à sativa prorsus ab- DIOSC.
horret: nanque folia fert Ari-
stolochiæ rotundæ similia, sed
parua, singula à ramis ruben-
tib⁹ exeuntia singulari, vt hæ-
dèra, pediculo, lacteo succo
prægnantia, salso iustu, & ali-
quantum amaro. Flores fert Matth.
læuis smilacis vulgaris haud
ab similes, calathi effigiem re-
ferentes..

L O C V S.

Prouenit sponte locis ma- Matth.
ritimis, & præsertim in litori-
bus Veneris, & Aquileiensibus..

Q U A L I T A T E S.

Cùm subsalsâ, & subamara Gal. li. 6.
fit, sanè etiâ ad externos cor- simp. me..
poris vsus idonea fuerit, & ad
omnia, ad quæ tales qualita-
tes accommodantur..

V I R E S.

Herba in tōtum stomacho inimica, acris, ciet alium vehementissimè in ci- DIOSC.
bo cocta, & coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Præstât eius Matth..
decoctū potum, cum Rhabarbaro, ad pellendas hydropicorum aquas. Idem
facit foliorum siccorum puluis, addito Rhabarbaro, & cubebis, pluries ex vi-
no potus.

*SOLDANELLA alpina. Italis quibusdam *Lunaria di dinari*.

SOLDANELLA ALPINA.

F O R M A.

Herba elegans est ob flosculum cæruleo colore pulcherrimo insignem, multipliciter dissectū campanulæ formam repræsentantem. Folium est ipsi crassiusculum vnum atq; alterum & sæpius plura, Soldanellæ marinæ subastringente & amaro nonnihil sapore, vnde illi nomen.

L O C U S.

In Alpibus colligitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vi pollet glutinandi vulnera, atque ad cicatricem perducenda.*



BETA, Græcis; τεύλον. Arabibus, *Decka*, sine celb. Italis; *Bietola*. Germanis, *Wangolt*, sine *Pieffen*. Hisp. *Afelga*. Gal. *Porree*.

BETA ALBA.



est alba, quam nigra. Succus absterforius est.

V I R E S.

Succus naribus inditus caput purgat: aurium doloribus auxiliatur radicis D T O S C. decoctum, & foliorum: surfures, lentesque detergit: perniones fotu mitigat. Crudis folijs vitiliginis nitro antea perfrictas, alopeciarum inanitates, scalpel-
lo prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus pa-
pularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur. Huius ceu aliorum olerum Gal. 2. de
exigua est alimonia, iecoris obstructionibus aptius, quam in alua accommo- ali. fac.
datur: magis autem, vbi cum sinapi, aut aceto estur, lienosos item similiter
manducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam
alimentum dixerit.

G E N E R A.

Trium est generum, alba, Matthi.
nigra, & rubra.

F O R M A . A L B Æ.

Alba folijs prouenit cate-
ris grandioribus atriplicis aut
hortensis rumicis ferè simili-
bus, per ambitum leuiter fim-
briatis; caulem gerit bicubita-
lem; striatumq; flores exiguo-
s, sublutei coloris: semē co-
piosum, inæqualiter rotun-
dum, ac subasperum: radice
alba, raphani modo longa, ac
etiā tenera:

* Nigra paulo minor est, &
colore differt.*

E O C V S.

Scratur passim in hortis. Idem.

Q U A L I T A T E S.

Nitrosa facultatis particeps Galén: 8.
est, qua tum digerit, tum ex- simp. me.
tergit, & per nares purgat.
Cocta nitrositatem omnem
exuit, fitque facultatis leuiter
digerentis. Porro ad detergē-
dum, digerendumq; validior:

BETA rubra, Græcis, *ῥέβηλον ῥιζόρον*. Italis, *Bietola rossa*. Germanis, *Rot Mangold*; *Rot Rüben*.

BETA RUBRA.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit cæteris angustioribus; duriorib. rubentibusq; radice rapi longi modo crassa, sanguinolenta, adnatis circumquaq; prodeuntibus: caule verò, pariter rubente, semine cæteris simile.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in Germania in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth. Non aded multum differt suis in qualitatibus, ac viribus à cæteris generibus. Hæc Germani hyeme, aut elixant in aqua, aut cineribus calentibus coquunt, & ex utrisq; inde corticibus, incidunt, & in aceterijs, asperso pipere, concinnant ad esum. Quin etiam semicostas in aceto, & sale diu asseruant, & cum assis carnibus vorant.



PORTULACA, Græcis, ἀρδῆαρον. Arabibus, Bakleancha, seu Bachele Albanica. Italis, Portulaca, Procaccia, siue Porcellana. Germanis, Burckeltraut. Hispanis, Verdolagas, & Baldroegas. Gallis, Porcelaine, Pourpier, siue Pourchaille.

PORTULACA DOMESTICA.

GENERA.

Duum est generum, sativa,
& sylvestris.

FORMA.

Sativa folia insunt latiora, Matth. pingua, crassa, splendētia, & a tergo candicantia, gustu acido, & austero: caulē edit crassum, glabrum, erectum, subpurpureū atq; pinguem: semine nigro, exiguo, in herbaceis calyculis incluso. Radice multifida.

LOCVS.

Seritur in hortis passim ab olitoribus.

QUALITATES.

Frigida, & aquea tempera. Galen. 6. mento est; refrigerat quidem simp. me. ordine tertio, humectat verò secundo, viscosum etiā quiddam obtinet. Succus magis adstringit, quàm herba, quæ succum gignit modicū, eumque frigidum, humidum, & glutinosum.

V I R E S.

Portulaca cum hordei farina capitis doloribus, & oculorum inflammationibus vtiliter imponitur: Quin etiā ventriculi ardoribus, igni sacro, vesicæ doloribus auxilio est, cum manducata dentium stuporem sedat: stomachi, & intestinerum æstuationē, fluxionesq; mulcet. Veneris impetus coercet. Succus epotus simili effectu prodest. Contra teretes ventris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluuiā sanguinis, percocta efficax est: ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur. Interancis fluxione laborantibus, atq; vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores æstu exci-
tatos, caput ex rosaceo, & oleo fouetur, eruptiones papularum in capite, cum Galen. 6. vino emendat: vulnerib. ad syderationē spectantibus vtiliter illinitur. Fluxiones calidas omnes repellit, & in febribus hædiciis totis hypocondrijs illinitur, Plin. libr. confert muliebri profluuiio tum herba ipsa deuorata, tum eius succus potus. & capite Præciduo vmbilico etiam imponitur. sanat quoq; & mammarum, & podagræ 20. inflammationes.

R

PORTV

PORTULACA sylvestris. Græce, ἀνθαράχνη ἀγρία. Italicè, Prochabia, & Portulana saluatica, & parimente grassola.

PORTULACA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth.

Portulaca, quæ sponte nascitur, caulibus exit rotundis, lentis, pinguibus, rufescentibus, humi sese diffundētibus, folia gerit alteri-similia. sed minora, oblōgiora, numerosioraq;: cætera cōsimilia sunt.

L O C U S.


Idem.

Prouenit in hortis, vineis, campis, & agris incultis.

Q U A L I T A T E S,
ET V I R E S.

Idem.

Non differt à domestica, nisi quod adstringenti vi, paulò sit potentior, atq; etiā non nihil minus humectat. Ruricola integras plantas elixant: & deinde in sole siccant. & ad hyemales cibos afferuant.



ASPARA

ASPARGVS, Græcis, *ἀσπάργος*. Mauritanis, *Halion*, siue *Helium*. Italis, *Asparago*. Germanis, *Spargel*. Hispanis, *Esparago*. Gallis, *Esparge*.

ASPARGVS.

GENERA.

Duplex habetur, altilis, & sponte nascens. Huius tria videntur genera, nempe Palustre, Græcis, *ἐλάσ* vocatur, Montanum, & Petreum, corrua, propriè dictum.

FORMA.

Thyrsum is primum, siue *Matth.* germen à radicibus mittit tenerum; cacumine crassiore in acutum desinente, perinde ac Orobanche, qui tandem, auctus, in ramos sese explicat, in quibus folia sunt capillacea, fœniculo breuiora, tenuioraque. Florem edit exiguum, quo flacescente, bacce subsequuntur, primum virides, & deinde rufescentes. Radice nititur circa caulem spongiosa, à qua numerosæ oriuntur fibræ ellebori modo, albicantes, crassioresq; vt in rusco.

LOCVS.


Altilis passim in hortis colitur. *Matth.*

QUALITATES.

Abstergendi vim habet, idque citra manifestam, aut caliditatem, aut frigiditatem. *Gal. li. 6. simp. me.*

V I R E S.

Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autem, siue coctus vrinæ stillicidiû, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum vino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat, coxendicis cruciatus, stranguriamque leuat. Seruntur ad esum, nam non ingratus sunt cibus, siue in acetarijs, siue dum calefcunt, asperso modico sale, recentiq; butyro, cum pipere deuorentur. *Matth.*



ASPARAGVS sylvestris, Græcis, ἀσπράγος ἄγριος. Italis, Asparago saluatico.

ASPARAGVS SYLVESTRIS.

GENERA.

Tria (vt in altili diximus) huius habentur genera, Palustre, Montanum, & Petreum, Corrada vocatum.

FORMA.

Matth.

Montanus, & Palustris, facie vix ab altili differunt. Corrada verò caule exit lignoso postquam adoleuit, flexiliq; folijs exiguis, præduris, & aculeatis. huius cauliculi prima germinatione etiam in cibis veniunt, sed ceteris tenuiores sunt, & amariusculi: quo fit, vt etiam ingratiore habean- tur in cibis.

LOCVS.

Idem.

Montanus, in montib. Palustris, in paludibus, & Petreus, siue Corrada, saxosis locis, & in sepibus, prouenit.



QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Palustris, & Montanus eadem omnia possunt, quæ altilis, nec imbecilliores, nec valentiores vires habent. Cæterum Corrada ob manifestam, quam possidet amaritudinem, longè magis aperit, prouocat, & abstergit, id quod manifestè patet ex fertida quam ciet urinam.

APPENDIX.

Idem.

Nascentur tibi Asparagi altiles totius anni decursu, si, vbi fructum legentis radices, quæ summo cespite vagantur, circumfoderis, ac aperueris.

PLANTAGO, Græcis, ἀργύρεον, Arabibus, *Lifen*, aut *Lefan alhamel*. Italis, *Piantagine*, seu *Centinerbia*. Germanis, *Wegrich*. Hispanis, *Lbantem*, sine *Tamebagem*. Gallis, *Plantain*.

PLANTAGO MAIOR.

GENERA.

Plantaginis tria obseruauimus genera, nempe maius, medium, & minus, quod quidam longam Plantaginem vocant. sunt etiam, qui aquaticam addant, de quibus omnibus speciatim dicemus.

FORMA.

Maïor, latior, virentiorq; cæteris Diosc.
habetur, latis constans folijs, olera- Marth.
cei generis, neruis septem, & quandoque pluribus secundum longitudinem excurrentibus, quo fit, vt à nonnullis septineruia vocitetur, Huius caulis cubiti altitudinem petit, & à medio ad verticem, tenui femine circumdatur, & in quadâ specie foliis quibusdâ vestitur, quæ primò exortu, antequam penitus adolescunt, rosæ effigiem præ se ferunt. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digiti crassitudine.

LOCVS.

Nascitur plurimum in lacuosis, & humidis locis, in Plateis, in arcis, & secus itinera, & sepes:

FACULTATES.

Mixta est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum, quiddam verò, & austèrum, id quod terreum est siccum, frigidum. itaq; refrigerat simul, & desiccat ordine secundo. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quòd siccioris, & minus frigida.

Sed semen subtilius etiam est partium: radices verò crassiorum, folia autem excicata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt.

V I R E S.

Folia malignis omnibus vlceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephanticis, sordidisq; illi-Diosc.
tis profunt: profluuiâ sanguinis, serpentia vlcera, carbunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia sanant: sinus conglutinant: canum moribus, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopijs illita cū sale profunt. Folia cocta cum aceto, & sale dysentericos, coeliacosq; iuuant: Estur in Betæ locū olus ipsum, cum lenticula coctum, ad aquam inter cutem, quam leucophlegmatiam vocant: foliorū succo vtiliter os colluitur ad sananda eius vlcera: gingiuis cruentis, & sanguinis reiectionibus in potu confert. Clystere dysentericis infunditur: valet ad vuluæ strangulationes, cum vellere suppositus: semen ex vino potui alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. mansa radix dentium dolores sedat: eadem cum folijs vtiliter in passio datur ad vlcera, tum renum, tum etiam vlcera.

PLANTAGO media, siue minor, Græcis, ἀνθράκωτον μικρόν, siue μέσον. Italis,
Plantagine minore.

PLANTAGO MEDIA.

F O R M A.

Matth. Folia habet angustiora, minora, molliora, laxiora, & tenuiora, cauliculo est anguloso, in terram inclinato, floribus spicatis, pallidis, pilosisq; semine summis caulibus emicâte: radicibus multifidis, tenuibus, albicantibusque.

L O C U S.

Idem. Nascitur, & hæc perinde, ac altera plurimū humectis, & vliginosis locis, in hortis, & fecus vias.

FACULTATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultatibus, & viribus, quibus & maior.



PLANTA

PLANTAGO longa, Græcis, ἀνιζαννον μακρόν. Italis, *Plantagine longa*, sine
lanciola.

PLANTAGO LONGA.

FORMA.

Folia gerit longa, cuspidis *Matth.*
 lanceæ modo, vnde illi nomē,
 striata, nervosaq., humi accu-
 bantia: caules, flores, semina,
 ac etiam radices media plan-
 taginis, omnino similia.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, ac
 ferè vbique.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differt facultatibus, & *Idem.*
 viribus ab alijs generibus, nisi
 quòd minus humidas quali-
 tates habet.



R 4 PLANTA-

PLANTAGO aquatica ita recentioribus appellata, Græcis, incognita. Officinis, *Barbafyluana*. Italis, *Piantagine aquatica*.

PLANTAGO AQUATICA.

FORMA.

Matth. Folijs est hæc Planta, cæteris crassioribus, carnosioribus, robustioribus, ac læuioribus ex lata origine in acutū desinentibus, lanceæ cuspidis modo, caulem gerit cubito longiorem, ramosum, ubique flosculis candidis referum, radicibus nſcitur numerosis, albicantibus, ellebori modo.

LOCVS.

Idem. Nasctur tantum in aquis, & palustribus.

*QUALITATES,
ET VIRES.*

Matth. Cum neminem antiquorum habeam, neq; apud Græcos, neque apud Mauritanos, aut Latinos, qui huius Plantæ meminerit, nec de eius viribus aliquid scriptum reliquerit, nihil sanè habeo, quod de eius viribus tuto in medium asferre possim.

CENSURA.

Idem. Non desunt, qui hanc Plantam *Damosonium*, siue *Alysimam esse aurument*. Atqui proculdubio falluntur.



SIVM Græcis, *Zior*. Mauritanis, *Rocathalni*, & *Inhamehanella*, seu *Hamehanet-*
la. Italis; *Sio*, & *Gorgolestro*. Germanis, *Wassermerck*. Hispanis, *Rabacas*.
 Gallis, *Berle*.

S I V M V E R V M.

F O R M A.

Sium, caule exirecto, ex- *Matth.*
 pansis folijs, per ambitum
 ferratis, smyrnio similibus,
 sed minoribus, & odoratis:
 umbellas profert in summis
 caulibus, floribus albis, semi-
 ne odorato, aniso non dissi-
 mili.

L O C V S.

In scaturientium fontium *Gat. li. 6.*
 riis, quorum aquæ hyeme *simp. me.*
 calent, æstate verò frigent,
 plurimum nascitur, ferè sem-
 per vna cum *Sisymbrio* aqua-
 tico.

Q U A L I T A T E S.

Quantum gustu Sium o- *Gat. li. 1.*
 doratum est, tantum etiam *simp. me.*
 exalfacientis facultatis est *Diosc.*
 particeps. Cruda folia co- *Matth.*
 ctave esu, calculos rumpunt,
 atque excernunt, vrinæ ci-
 ent, menses, & partus extra-
 hunt, dysentericis in cibo au-

riantur. Hepatis obstructions quoque expedit, vniuersæ plantæ decoctum
 potum, auriginem tollit, hydropicos iuuat. idem, aut ipsa herba deuorata,
 visum acuit.

C E N S V R A.

Errant, qui Plinium secuti, aquaticum *Sisymbrium* Sium esse censent.

Sium vulgare. Italis, *Sio falso*.

FORMA.

Math.

Caulem edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragilemque: folia gerit apij, non insuauia, flosculos in summitate albos, semine corniculis incluso, paruo, minutoque: radice superuacua.

LOCVS.

Idem.

Prouenit tantum in aquis decurrentibus, perinde ac *Sium* verum.

FACULTATES, ET VIRES.

Idem.

Excalfacientis est facultatis, quæ tamen imbecillior illi est, quàm legitimo *Sio*.


SIVM VVLGARE.



SISYMBRIVM

SISYMBRIUM latium, sine hortense, Græcis, Σισυμβριον ὀνόμαζον. Italis; Sismetro domestico, Balsamita, seu mentha cresta. Germanis; Rachenbalsam.

SISYMBRIUM HORTENSE.



G E N E R A.

Trium est generum. Hor- *Matth.*
tense, Sylvestre, Aquaticum.

F O R M A H O R -
T E N S I S.

Folia profert circinnata, *Idem.*
vulgaris menthæ latiora, ro-
tundioraq;. crispa tamē: cau-
lem edit quadrangulū, & flo-
res spīcatos: folia menthæ a-
criora, odoratioraq;.

L O C V S.

Seritur in hortis ferè omni- *Idem.*
bus.

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est partium, ex- *Idem.*
calfaciens, & exiccans in fine
secundi ordinis, aut in princi-
pio tertij: attenuat, digerit,
resolvit, aperit, incidit, & pro-
uoat.

V I R E S.

Flatus, & lumbricos pellit, *Idem.*
tum herba ipsa in puluerem
trita, tum eius decoctum po-

tum: valet ad vteri inflationes, si vnā cum parthenio in calēti tegula calefa-
ctum, & odorato meraco aspersum, imo ventri applicetur: valentius quoq;
vterinis doloribus puerperarum subuenit, si cum parthenio, artemisia, & an-
themidis floribus, tenuiter concisum: tribus aut quatuor onis excipiat, &
deinde in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, & calida ventri me-
dio applicetur. Illinirur tam recens, quā siccum calefactum, & Cretico vino:
asperum, celiacis, & ventriculi doloribus à flatu prouenientibus. Succus te-
stibus illirus, nocturnas pollutiones cohibet.

SISYMBRIUM sylvestre, Græcis, Σισυμβριον ἄγιον. Italis, *Sisembro saluatico*, Arabibus, *Sisnabarion*, seu *Sisnabar*.

S I S Y M B R I U M
S Y L V E S T R E.

F O R M A.

Diosc. Prouenit menthæ hortensis similitudine, odoratius tamen, & folio latiore : caule quadrâgulari, radicibus longè vagantibus, tenuibus, villosis.

L O C V S.

Diosc. Nascitur inculto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, excitantis facultatis, & temperaturæ in tertio ordine. sed & semen eius tenuium partium est, & calidum.


V I R E S.

Diosc. Bibitur semen eius contra stillicidia urinæ, calculosque : idem tormina, & singultus sedat : folia in capitis dolore à pituita genito, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra vesparum, apiumq; ictus. vomitiones potu quoq; cohibet.



SISYMBRIUM aquaticum, Græcis, Σισυμβριον ἑρλεον. Officinis, & Barbaris, Senecion. Italis, Crescione. Germanis, Brunnkressen/ seu Wasserkressen. Hispanis, Berros, aut Agriris. Gallis, Cresson.

SISYMBRIUM AQUATICUM.



FORMA.

Folia promit primum rotunda, adulta crucæ modo finduntur.

LOCVS.

Riguis gaudet, & iisdem Idem. locis, quibus Sium.

QUALITATES.

Nasturtio simile quiddam Gal.li.8. gustu præfert: cum siccum est, simp.me. tertij enim est ordinis exal-facientium, & desiccantium: cum verò humidum est, & viridē, secundi.

VIREs.

Vrinas mouet: estur cru- DIOSC. dum. purgat lentigines, cutisque vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum. Cum raphano om- Matth. ni, & petroselini radicibus sectum, & ex albo meraco,

& butyro calefactum, calidumq; pubi admodum vrinas educit, ac trahit. Sin- cipiti illitus veterinosos iuuat, & præsertim foliorum succus.

SISYMBRIVM aquaticum minus, Italis, Crescione minore.

**SISYMBRIVM AQUATICUM
CVM ALTERVM.**

F O R M A.

Matth. Folia, & cautes edit longè minores, ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus albicantibus, in cacumine tantum cernantibus.

L O C V S.

Idem. Non solum in riguis, & aquosis prouenit, sed etiam in hortis, & secus itinera.

**Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.**

Idem. Imbecillius est altero: nanque minus exalfacit, & siccat: vbi verò alterum non sit ad manus, hoc vti præstabit.



*COCHLE

*COCHLEARIA. Germanis, Löffeltraut.

COCHLEARIA.



FORMA.

Herbula est non alta; folijs prædita multis, splendentibus, latiusculis pinguibus, concavis, cochlearia parua referentibus, interdum nonnihil angulosis, in petiolis cradice simul enatis, ex horum medio surgunt caules dodrantales, quibus flosculi albidifecundum longitudinem adnascuntur: semina subrufa Nasturtij valvulis clauduntur, radices pusillæ fibrosæ, gustu acri.

LOCVS.

Prouenit sponte in Frisia, Hollandia & in maritimis inferioris Germaniæ, Item circa Hamburgum & alibi locis palustribus & riguis. Ex semine Hortis quoque familiaris redditur.

QUALITATES.

Calida est & sicca et virens: Nasturtium.

VIRES.

Scorbuto medetur in acetarijs vsurpata, aut cum lacte vinoue cocta & sa-pius continuèq; bibita.*

CRITHMUM, Græcis, *Κριθμύδον*. Italis, *Crithmo*, Finocchio marino, & herba di San Piero. Germanis, *Bacillen* & *Meer Fenchel*. Hispanis, *Perexil de la mar*, & *Vnhas de agnula yerua*. Gallis, *Basilie*, & *Fenoil marin*.

C R I T H M U M L.

G E N E R A.

Matth.

Quatuor habetur genera, quorum tria Marina sunt, & quartum terrestre.

F O R M A P R I M I.

Diosc.

Planta est fruticosa, & vndique foliosa, cubiti altitudinem ferè petens, folijs pinguibus, Portulacæ ferè modo, sed longioribus, latioribus, numerosis, albicantibus, ternis ex vno petiolo dependentibus, falso gustu, flores in umbellis quandoque candidi quandoq; lutei spectantur, è quibus semè oritur, ceu Rosmarini, odoratum, molle, rotundū, in quo nucleus tritici effigie, radices funditres, aut quatuor, digiti crassitudine, odoris grati, & iucundi.

L O C U S.

Diosc.

Nascitur in maritimis, petrosis locis. Scopulis, & rupibus, in ipsis maris littoribus.

Matth.

F A C U L T A T E S.

Gal. 6.

Gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate, quamobrem facultas illi est, tum exiccandi, tum abstergerendi: vtraque tamen in eo est imbecillior, quàm in amaris.

simp. me.

V I R E S.

Diosc.

Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur, menses cient, & aluum citant. semèn ex vino potum, flatu pellit.

C E N S U R A.

Qui credunt Crithamum marinum, esse Empetron, manifesto errore cecunt.



CRITHMUM secundum. Italis, *Crithamo secundo.*

CRITHMUM II.

FORMA.

Non valde differt à primo, *Matth.* nisi quod folijs est angustioribus, mucronatis, atque pungentibus, salso, amariuscule, & acuto sapore: caulibus verò prægnatiorib⁹, succosioribus, vegetioribusque, in quorum cacumine ramuli exeunt bini, terni, quaternive, suas singuli umbellas ferentes, albis flosculis refertas, è quibus semen oritur sceniculo quadantenus simile, cui radicem quoque non absimilem habet.

L O C U S.

Iisdem provenit locis in maris littoribus.

*Idem.*FACULTATES
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest, quæ primum Crithmi genus, nisi quodd vim aliquam incisivam habere videtur.

Idem.

S

CRITH-



CRITHMUM tertium, vitriaria, Italis, *Crithmoter* &c.

CRITHMUM III.

F O R M A.


Matth.

Planta est fruticosa, plures ab vna radice emittens caules, rectos, circa quos totos folia habentur, per intervalla, plura ex vna origine gregatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & falso etiam gustu: sub horum exortu peculiare quoddam erumpit foliū cæteris duplo longius, è quo propè caulis cavitatem petiolus exit, ex quo sex septemve folia breviora produntur. flores fert in cacumine orbiculatos, villosq; palido colore, radice nititur longa, tereti, non sine adnatis.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in litore Maris, locis planis, non cliuosis.



F A C U L T A T E S E T V I R E S.

Idem.

Ea omnia potest, quibus pollere cætera genera diximus.

C E N S U R A.

Matth.

Subscribam ego illis nunquam, qui hanc quoque plantam Empetronem minant.

CRITHMUM quartum. Italis, *Crithamo terrestre*. Germanis, *Eichelfraut* / *Schelmören*.

CRITHMUM IIII.



F O R M A.

Folijs prouenit longis, angustis, firmis, ternis ex vno petiolo, ipsoq; lōgo prodeuntibus, utrinque denticulatis falcis frumentariæ modò. Cæterum quæ in caulium summis partibus habentur, minora, breuioraque sunt. caulem gerit ramosum, alis concuum, geniculatumq; : in cuius summitate ramuli exeunt diuulsi, in quibus floridæ, albican-tesque sunc umbellæ, quæ postremò semen oblongum, acre, & odoratum mittunt: tota planta gustu saluginoso percipitur, atque amariuscule, ut cætera Crithami genera, quanquam non adeo vehemēti. Radice cohæret pastinacæ maiore gustanti dulce, atque subacri, odorata.

F O R M A.

Nascitur copiosa in Boemia in agro Pragensi, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus, ac etiam alijs in regionibus.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Aperit, digerit, excalfacit, succat, & mediocriter incidit.

CORONOPVS, Græcis, *Κερονόπος*. Italis, *Herba stella*. Germanis, *Kraenfig*. Hispanis, *Guiabelba*. Gallis, *Corn de Cerf*, siue *Sanguinaire*.

CORONOPVS.

GENERA.

Matth. Duo eius habentur genera domesticum & sylvestre.

FORMA.

Matth. Domesticum folia fert longa, angusta, per intervalla corniculata, crassiuscula, humi accubantia: & in stellæ modum radiantia, caulem, spicam, florem, & semengerit per omnia Plantagini similia, nulla intercedente differentia. Niritur vnica tantum radice, numerosis tamen adnatis capillamentis: foliorum fapor Plantaginis omnino est, quo fit, vt crediderim Coronopum eiusdem esse generis.

Locvs.

Diosc. Seritur passim in hortis, nasciturque sponte in aggeribus, locis incultis, & secus vias.



FACULTATES, ET VIRES.

Diosc. Ipsdem pollet viribus, quibus Plantaginem pollere diximus, peculiariter tamen radix coeliacis auxiliatur.

CENSURA.

Qui Capriolam seu sanguinellam vulgo vocatam Coronopum esse censent, manifesto errore ducuntur, quemadmodum & ij qui ranunculum Coronopum faciunt.

CORONOPVS Sylvestris, Italis, *Herba stella saluatica*, et peculiariter Goritienſibus, *Serpentina* vocatur.

CORONOPVS SYLVESTRIS.

FORMA.


Folia fert tenuioria, capil- *Matth.*
laceaque, rariuſculè corni-
culata, humi accubantia: cau-
libus, ſpicis, floribus, ſemi-
ne, hortenſi ſimilibus, ſed
longè tenuioribus.

LOCVS.

Prouenit in Goritienſi a-
gro diluto, extenuatoque ſo- *Idem.*
lo, non longè à Sontij flumi-
nis ripis, & alijs etiam in a-
gris.

FACULTATES, ET
VIRE.

Radix ex vino pota vipera-
rum, aliorumque venenoſo-
rum animalium morſibus, *Idem.*
mirificè auxiliatur, ita vt ipſa
ſola liberet de morſos. præfe-
runt eam quoque ad hydro-
pem, quam Anaſarcam vo-
cant, epoto apozemate plu-
ribus diebus, in quo radix
conferbuerit.



SONCHVS, Græcis, Σίγγες. Italis, Soncho, Cicerbita, seu Crespine. Germanis, Wilder Hasenböl/sive Gänsefistel. Hispanis, Serraya, & Serralba. Gallis, Laitron, & Palais au lieure.

SONCHVS.

G E N E R A.

Matth. Duo sonchi habentur genera: sylvestris, siue aspera, & levis, cuius duæ etiam sunt species.

F O R M A P R I M I.

Idem. Folia profert Cichorij modo per ambitum laciniata, crispata, aspera, aculeata, & subrubentia. Caulem gerit cubitalem, inanem, fragilem, lacte prægnantem, ac etiam quandoq; subrufescentem: flores in summis caulibus meliuros, Senecioni haud ab similes, qui deinde in pappos euanescent.

L O C V S.

Idem. Prouenit in agris incultis, in vineis, in hortis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. simp. me. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea, terreaq; essentia, utraq; leuiter frigida, & est etiam adstrictionis cuiusdam particeps.

V I R E S.

DIOSC. Illinitur vtiliter æstuanti ventriculo, ac eius inflammationibus. Sorbent quoque eius succus ad stomachi rosiones: lac elicet in velle suppositus, sedis, ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba, quam radix illita vibratis scorpione iactibus subuenit. Soncho vtuntur Itali in acetiarijs, & præsertim eius radicibus, quæ cum teneræ sint, & dulces, frequenter hyeme mensis expendantur. In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur, lacteus eius succus potus suspitiosos, & asthmaticos iuuat. idem auribus instillatus, earum dolores mulcet, & præsertim in malicorio cum oleo decoctus: stranguriam quoque lenat yncie pondere potus. commanducata folia, oris graueolentiam tollunt.



SONCHVS lævis, Italis, Cicerbita gentile.

SONCHVS LÆVIS.



GENERA.

Duo habentur genera, quæ *Math.* tantum folijs aliquatenus differunt.

FORMA.

Alterum læuioribus habetur folijs, minus quoque lacinjatis, & magis extensis, cætera verò (demptis aculeis) sylvestri similia spectantur. *Idem.*

LOCVS.

Nascitur in hortis, invineis, *Idem.* & locis incultis.

QUALITATES ET
VIRE.

Non differt à primo genere, siccis in facultatibus.

SONCHYS lævis altera. Italis, Cicerbita gentile secunda.

SONCHYS LÆVIS ALTERA.

FACULTATES
ET VIRES.

Huc referas quæ de alijs
generibus dicta sunt.



* *SONCHVS* Flore Cæruleo. *Sonchocichorium.*. *SONCHVS* CÆRVLEVS.

FORMA.

Amara est herba, bicubitali caule valde hirsuto pilis rigidis, non tamen pungentibus, rubicundis. Folia sonchi habet lactescentia, sed flores Cichorij à cæruleo ad purpureum inclinantes, interdum etiam magis cæruleos. plures in caulis summitate conferctos, Radix crassa & valde intricata est, ac multas veterum caulium reliquias ostendit, telluri tenacissime inhærens.

Locvs.

Amat loca opaca in Austria frequens & alibi circa alpes.*

S S

INTV-

INTYBUS. Græcis, Σέλις. Mauritanis, Dumbeye, Aundebe, seu Endebe. Italis, Endivia. Germanis, Endivien. Hispanis, Endiuvia. Gallis, Endiuié.

G E N E R A.

INTYBUS MAIOR.

DIOSC. Duo eius habentur genera, altera quidem hortensis, altera sylvestris. Hortensis itē due habentur species, altera maior altera minor, quam seriolam maiorem, siue (vt officinæ) scariolam vocant. **Matth.** Quin etiam sylvestris due species, quarum alterā scariolā minorem, siue Cichoriū satium, alterā quidē sylvestre Cichorium, & pigrin, ab amaritudine vocant.

F O R M A.

Matth. Hortensis maior, folijs prouenit latoribus, lactuce similib⁹, caule bicubitali brachiato: floribus cæruleis, Cichorij similib⁹, semine paruo, oblongoq[;]. Vnica nititur radice, ipsaq[;] villosa. * Minor foliagerit longiora & angustiora, caules quoque tenuiores, cætera maiori similis est. *

L O C U S.

Idem. Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Domestica magis quam asimp. me. gressis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit, verum adstringentis qualitas est particeps, subfrigida est, & subamara, ac moderatè adstringens. corroborat, abstergitque.

V I R E S.

DIOSC. Stomacho vtilissima est: cocta aluum sistit, si cum aceto edatur. Cardiacæ & hordei farina vtiliter illinitur. Quin etiam podagris, & oculorum inflammationibus. Herba cum radice illita, ictis à scorpione subuenit: igni sacro cum farina hordeacea medetur. Succus cum cerusa, & aceto additur vtiliter frigidis illitionibus. Verum enimvero vis eius magna quidem est ad calidos iocinoris morbos, oscula venarum eius extergit, & præsertim eius cum radice decoctum. Estur passim cruda, coctave in acetarijs.

Matth.



INTUBVS crispa, Italica, Endiuia crispata.

INTUBVS CRISPA.



FORMA.

Recensetur, & hæc inter *Matth.* maiora intubi genera, siquidem amplo, foliosoque cespite prouenit, folijs magnis, sed in ambitu vbique crispis, ac fimbriatis, caule cæteris maiore: reliqua cum alijs paria sunt.

LOCVS.

Seritur in hortis ab olitori- *Idem.* bus, quòd admodum in acetarijs in cœnis placeat.

QUALITATES ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.* de hortensibus intubis superius dicta sunt.

INTV-

INTUBVS sylvestris, Græcis, *Σέως ἀγρία ἡμερος*. Hetruscis, *Tornasole*. Italis *crucis*, *Cichoria domestica*. Germanis, *Begweise*/ *Begwurz*. Hispanis, *Almarnes*, & *Cichoria*. Gallis, *Cichorea*. Officinis, *Scariola minor*.

CICHORIUM.

G E N E R A.

Duum est generum, *Picris* sylvestrior, & *Satiua*, latioribus folijs, & cori gravior, minusque amara.

F O R M A.

Satiua folijs exit minori satinoque Intubo similibus, angustioribus tamen atque brevioribus: minusque per ambitum lacinitatis, sed caule, & flore similibus. Radicem habet pedali longitudine, alba intus pulpa, tenebram, & subamaram.

L O C U S.

Seritur passim in hortis.


Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Eadem omnia potest, quæ domestica Intubus: Ea tamen siccior est, & magis extergens.



SYLVESTRIS Intubus, Græcis, *Κισχόριον ἄγριον*. Italis, *Cichoria saluatica*. Germanis, *Wildt Begwurt*.

INTUBUS SYLVESTRIS.



FORMA.

Folia fert longa, sonchia- *Matth.*
speræ modo incisa & in sum-
mitate sagittæ instar acumi-
nata: rubea per mediû excur-
rêre costa, amaro sapore: cau-
lis est illi durus, atq; lignosus,
flores à ceteris generib. haud
absumiles, quemadmodum
& semen: Radice nititur do-
mestice duriore, amarioreq;.

Locvs.

Nascitur in agris incultis, *Idem.*
in pratis, & secus itinera.

QUALITATES.

Olus est subamarû, obid- *Gal. lib. 3.*
que picrida ipsum quidâ nun *sim. me.*
cupant: est autem ea frigida,
siccaq; temperaturæ, vtraq;
secundo excessu, & adstrin-
gêtis qualitaris est particeps.

VIRÈS.

Isdem pollet viribus, quib. cætera genera pollere diximus: verum cû plus *Matth.*
amaritudinis habeat, magis quoque abstergit.

CENSURA.

Tiresia cæciores sunt, qui Hieracium, & sylvestrem lactucam Intubum syl-
vestrem faciunt.

DENS leonis, Græcis, præsertimq; Theophrasto, ἀράρις. Italis, Dente di cane, & Piscia allerro. Germanis, Pfaffenblatt/ & Münnichstopff. Officinis, Taraxacum, & caput monachi, ac nonnullis Rostrum porcinum, & Ambubeia.

DENS LEONIS.

F O R M A.

Matth.

E terra prodit ipso statim Veris initio, folijs cichoraceis, frequenter laciniatis in sagittæ modum desinentibus, humi accubantibus, caule spiramæ magnitudine, rotundo, glabro, subrubente, intus concauo, lacteo succo prægnante, flores gerit luteos, foliososque, quibus decidentibus, subcrefcit papposum caput. Radicem habet Cichorio proximam, lacteo succo plenam, sed longè amariorem.

L O C U S.

Idem.

Prouenit in hortis, in campis, prope sepēs, & in ruinosis ædificiorum muris, quin etiam in vineis, pratis, & viridarijs.

F A C U L T A T E S.

Idem.


Adstringit, roborat, atque abstergit, magis quàm vtrunque Cichorium.

V I R E S.

Idem.

Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum sistit, eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus gènitura effluit, in aceto decocta, vrinæ tormina discutit. Vniuersæ plantæ decoctum potum Ictericam tollit.



ZACINTHA, Italis, *Cichoria verrucaria*,CICHORIUM VERRUCARIUM,
SIVE ZACINTHA.

FORMA.

Folia profert Cichorij, 2. *Matth.*
 Superiora tamen, ac minus laciniata. Caules edit cubitales, & quandoq; maiores, tennes, asperiusculosque, in quorum cacumine flores spectantur aurei cichoracea specie, quibus flaccescentibus semen remanet subnigrum, capituli instar, circumquaque secundum longitudinem secti, striatim, radice nititur rapunculi æmula, tenuibus adnatis circumquaque fibris.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, *Matth.*
 & à nonnullis quoque scribitur in hortis, & fœtilibus in medicum vsum.

QUALITATES ET
VIRES.

Mira huius plantæ facultas est ad tollendas verrucas, *Idem.*

cas, siquidem scimus nonnullos, quorum manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acerario semel tantum huiusce plantæ folijs. Idem præstat eius semen tribus diebus drachmæ pondere à cœna potum, dum se cubitum recipiunt verrucosi.

CYANVS

CYANVS maior, Græcis, *Κύανος*. Italis, *Fior Campese, fior Aliso, & Battisuccia*. Germanis, *Kornblum*. Officinis, *Batisecula*.

CYANVS MAIOR.

GENERA.

Matth. Duum est generum, maius, & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Maius latioribus prouenit folijs, albicantibus, tomentosis, & nulla in parte diuisis. vegetiores quoq; habet caules, albicantiores, breuiiores tamen, & flores longè maiores, & patentiores quàm minor. Flos cyaneus, ceruleúsve spectatur, foliosus, & in cristæ modum extremis oris laciniatus, calyculis, è quibus prodit, squamosis, ac subasperis.

LOCVS.

Idem. Prouenit in montibùs frequentius, quàm in campetribus.



QUALITATES, ET VIREs.

Idem. Huiusce plantæ vires nullus antiquorum, quod sciuerim, scriptis mandant non desunt tamen recentiores, qui purent Cyanum propria dote pestilentibus morbis aduersari: maioris pulvis datur vtiliter ab alto deuolutis, & sanguinea reijcientibus, ex aqua Plantaginis, aut portulacæ, aut maioris Symphyti, aut quiseti. succus illitus recentia vulnera glutinat, & oris vlcera sanat.

minor, perinde ac maior, tam Græcis, quàm Italis, & Germanis vocatur.

CYANVS MINOR.

F O R M A.

Folijs exit longis, pilosis, *Matth.* albicantibus, barbulis quibusdam dissectis, caules edit plures, bicubitales, lanuginosq; minoribus refertos folijs: flores in cacumine profert cæruleos, in ambitu crenatos, squaroso è calyce prodeuntes.

L O C U S.

Nascitur in campis inter *Idem.* segetes, & floret Maio, & Iunio mensibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ea omnia præstare potest, *Idem.* etiam valentius, quæ de iniori dicta sunt, peculiariter tamen huiusce folia, ac pariter semen ex vino decocta, & hausta, auxiliantur à scorpione, phalangioque ictis, quin

etiam venenis omnibus resistunt: præstat quoq; tota planta ad pestilenciales, & pernecabiles febres.

T

CON-

CONDRI^{LLA}, Græcis, *χρῆσσαν*. Arabicis, *Candarel*, *Cadaron*, & *Ainiron*. Italis, *Condilla*, & *Terravapolo*, Hispanis, *Lentugas*, & *Leichugas* dentre los planos. Gal-
lis, *Leisteron*.

CONDRI^{LLA}.

G E N E R A.

Matth. Duo eius habentur genera, foliorum diuersitate differentia.

F O R M A P R I M A.


Diosc. Prima, quæ quidem Cichorij species est, caulem, florem, & folia habet Cichorio similia: verum planta tenuior tota est, in cuius ramulis gummi aliquando inueniri solet mastiches similitum: radice nititur Cichorio breuiore, & lacteo succo prægnante.

L O C U S.

Matth. Nasclitur in agris non cultis, & secus itinera, atq; etiam in pratis.

F A C U L T A T E S.

Gal. 8. simp. me. Non differt ab alijs Cichoraceis suis in facultatibus.



V I R E S.

Diosc. Tusa cum radicibus herba, melleq; excepta, & admisto quoq; nitro, vitilignes illitu emaculant, gummi quod ab ea resudat subpositum sceminarum menses trahit, pilos inordinatos replicat. Quod item tenera radix efficit, vbiacus succo intincta pilis admoueat: ex vino pota, viperarum morsibus auxiliatur. succus decocta in vino, aut per sese potus aluum listit.

CHONDRILLA altera, Græcis χονδρίλλα ἑτέρα. Italis, Chondrilla secunda.

CHONDRILLA ALTERA.



FORMA.

Folia fert oblonga, circum Diose.
rosa, humi sparsa; caulem la-
tæo succo madentem: radice
tenui, rotunda, lævi, vegeta,
flavescente, succosa.

LOCVS.

Nascitur in latis, & cultis Idem.
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Caules, & folia cōcoquen- Gal.
divim habent, succus incom- Diose.
modos palpebrarum pilos re-
flectit.

II 2

CYCVA

CUCURBITA, Græcis, Κολοκυθία ἐδωδιμῶ. appellatur Arabibus, *Haba*, *Hem*, seu *Carba*. Ital. *Zucca*. Ger. *Kürbß*. Hisp. *Calabassa*. Gall. *Courge*, *Courle*, sine cause.

G E N E R A.

Matth. Cucurbite tria recensentur genera, nempe longa, rotunda, & sessilis.

F O R M A.

Idem. Hederaceis virefcit folijs, sed amplis & subcandicantibus: flagellis farmetosis, angulosisq; humi repentibus, verū vbi adminiculū nata fuerit, illud facile clauiculis compræhendit, quibus arbores, & pergulas scandit, & ijs sese implicat. flores profert albōs, grãdiōresq; & in stellæ ferè modū diuifos, verū nō omnes frugiferi sunt. Frugiferi. n. facillè noscuntur ex conceptu sub ipsis extuberante, fructus edit magnos, q quidem in vno genere longi, in altero rotūdi, & in altero sessiles vifuntur, verūm omnes in magnam extuberant molem.

L O C V S.


Idem. Seruntur passim in hortis, & circa sepimenta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Cucurbita humidæ, frigidaq; temperaturæ est, vtraq; qualitate secundi ordinis.

Matth. *Diosc.* Illita cruda, tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius illinuntur vtiliterincipiti infantibus, contra capitis ardorem, quem syriasm vocant, oculorum inflammationes, podagrasq; refrigerant. succus è ramentis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat. Totius feruefactæ, & expressæ cremor, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter soluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum aluum leuigat. Folia recentia iumentis illita, affricatq; muscas abigunt. eadem mammis puerperarum admota lac siccant. oleum, quod è cucurbitarum floribus paratur, ijs in eo diutius insolaris, renum calores inunctum exinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: aridæ cinis ambusta, & pudendorum vicina sanat. Estur passim estate in cibis cum iusculis elixa, tum quoq; in oleo, aut butyro friza, farina prius cum melle, & acerbè vix succo aspersa.

V I R E S.



CUCURBITA Indica, Italis, Zucche Indiane, oltra marine.

CUCURBITA INDICA.

G E N E R A E T
F O R M A.

Varia huiusce cucurbitæ *Matth.* habentur genera, magnitudi-
ne, facie, & colore differen-
tia. Referunt tamen omnes
melopeponum effigiem, sed
aliæ magnæ, imo maximæ,
ventricosæq; aliæ parvæ, alię
mediocres, & aliæ oblongæ,
aliæ rotundæ, aliæ vario colo-
re spectantur: folijs nostrati-
bus longè maioribus, firmio-
ribusq; asperis vitigineis, &
rigenti petiolo adnexis, sar-
menta illi crassa, angulosa,
aspera, hirsutaq; Ea humi ser-
punt, longo admodum tra-
ctu, atque etiam scandunt, &
pergulas, & atregias opacant,
flores edit magnos, lilij ferè
effigie, aureo colore. Semen
in ventre gerunt magnum, al-
bum, in quo nucleus conclu-
ditur dulcis, & suavis, sapor
fructibus subdulcis, non vt
nostratibus vsq; adeo insipi-
dus.

L O C U S.

Planta est peregrina ex Indijs, & alijs fortasse longinquis regionibus ad nos *Idem.*
allata, sed iam diu Italico solo proueniunt.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Cum subdulci sint sapore, crediderim has primo excessu refrigerare, & hu- *Idem.*
mectare secundo.

CUCUMIS sativus, Græcis, *Σίκυς* *ἡμεῖς*. Arabicis, *Chathe*, seu *Chethete*. Ital. *Cocomero*. Hetruscis, *Cedruolo*. Ger. *Eucumern*. Hisp. *Cogombro*. Gall. *Cocombre*.

G E N E R A.

CUCUMIS SATIVVS.

Matth.

Duo habentur genera vñ Citrei mali figura, alterum lōgum anguium formam referens.

F O R M A.

Idem.

Planta est sarmentosa, hūmi repēs, folijs vitigineis, asperis, scabrisq; , flagellis pariter scabris, atq; rigentib⁹, flores edit melinos, fructu sub ipsis exuberāte, qui tandē in longū protensus citrei mali modo viridi primū fit colore, & dum maturefcit flauo cortice verrucis scatente.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim ab olitoribus in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3.
simp. me.

Cucumis esculentus, maturus quidē tenuioris est essentīe, qui verō immaturus est, crassioris: ambo tamen, abstergendi facultate participant, superat in eis humida, frigidaq; téperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis, aut semen, aut radicem arefaciat, haud etiā humidæ fuerint naturæ, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente. est & in istis maior abstergendi facultas, quàm in fructus ipsius carne.

V I R E S.

Diosc.


Prodest vesicæ morbis: olfactu deliquio animi affectos reuocat. semen yrinam mouet, & cum lacte, aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. illita cum vino folia morfus canum lenant, epinyctidas cum melle. Veniunt frequenter in cibis crudi, sed prauos generant succos,

Gal. 2. de
alim. fac.

nam etsi nonnulli cucumeres rectè concoquant in ventriculo, dum tamen in hoc fissi asaxim ijs se replent, temporis tractu gelidum, & vtrunque crassum humorem in venis acervant, qui non facile in probum sanguinem conuerti potest: proinde abstinere ab illis consiluerim: etiam enim, sensimq; post longum tempus prauus in venis succus ex ipsis accumulatur, qui velleuicula putredinis arrepta occasione, febres sæuissimas, & mire contrumaces excitabit.

C E N S V R A.

Non est eorum admittenda opinio, qui vulgarem cucumin peponem esse contendunt.



CYCVMIS longus, Italis, Cocomero serpentino. Hetruscis, Cedruolo longo.

CYCVMIS LONGVS.

F O R M A.


Non differt tota sua facie ab *Matth.* altero, nisi in fructu, qui longus est, & serpentis modo curuus, strijs per longitudinem prorensis.

L O C V S.

Seritur in hortis, & præsertim in Apulia.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Eadem illi sunt facultates, *Idem.* quæ alteri.



T 4

PEPON,

PEPON, Græcis Πέπων. Mauritanis, *Batecha*, seu *Bathiecha*. Italis, *Mellone*. Heruliscis, *Popone*. Germanis, *Melon*. Hispanis, *Melon*. Gallis, *Melons*.

F O R M A.

PEPON.

Matth.

Serpit Peponum, & Melo-peponum planta lōgis, ac viticulosis sarmētis, cucumeris modo, folijs vitigineis, minoribus tamē incisuris, scabris, hirsutisq; floribus luteis, fructu grādi, humani capitis instar, & sæpe maiori, cortice cartilagineo. Sed non omnibus idem est color. Namq; alij herbaceo sunt colore, alij pallido, nonnulli flauo, quidā albo, pleriq; cinereo. Sunt etiam qui tota cute textura quadam reticulari magno naturæ artificio pueniant. Striati ferè sunt omnes, Toris secundum longitudinē circum quaq; prominentib. Interna pulpa gustatu suavis est, versi color tamen, in altero. n. genere rubet, in altero albicat, aut in albo rufescit. Qui præstant (plurimi sunt, qui nulla cōmendantur gratia) præter odoris incunditatē, dulces, & suaves sunt: Semē intus ingerunt copiosum, oblōgum, nucleo intus dulci, albo coniectum putamine.



L O C V S.

Idem. Gaudent læto, & aprico solo, ac etiam libertate, qua possint vltro vagari: feruntur in hortis & agris.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Vniuersa Peponum natura frigidior, cum larga humiditate existit, sed habent quoq; quædam abstergendi vim: atqui melopepones minus humidi, quàm pepones sunt.

V I R E S.

Diosc. Peponis pulpa in cibis sumpta, vrinam ciet, & inflammationes oculorū illita sedat: ramenta eius scincipiti admoda syriam infantium tollit, & oculorū fluxiones auertit. succus cum semine, farina exceptus, & in sole siccatus, cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant: radix sicca ex hydromelite pota drachmæ pondere vomitiones mouet. Gignit pepo in corpore vitiosum humorem, potissimè, quando non probe coctum fuerit, tum verò morbum etiam, qui cholera dicitur, inducere consuevit.


C E N S V R A.

Errant toto cælo, qui pepones vulgares Cucumeres faciunt.

ANGURIA, Arabibus, *Dullaha*. Italis, *Anguria*. Hetruscis, *Cocomero*. Germanis, *Erdöpfel*. Hispanis, *Cogombro*. Gallis, *Cocombres*.

ANGURIA.

FORMA.



Folia promit *Colocynthis* Matth. dis medicamentosa maiora, aspera, & per ambitum diuisa. Caules sarmentosos humi repentes, melopeponis modo. Flores edit aureos: & fructus mirum in modum extuberantes, pōderosos, subrotundosque: Corrice læui, herbaceo colore, maculoso tamen: carne intus humida, aquosaq; in quibusdam prædulci, in nonnullis verò subacida, insipidave, sitiq; extinguendæ per quam idonea. Semen conclusit latū, cucurbitæ paulò minus, rufo, nigrove putamine.

Locvs.

Seritur in hortis & virida- *Idem*. rijs, ac etiam in agris.

QUALITATES.

Frigida est, & humida ordi- *Idem*. ne secundo, sitiq; arcendæ idonea.

VIREs.

Succosa eius pulpā confert ardentibus febribus, & linguæ ariditati quam *Matth.* maxime: acutos humores vincit, & ijs præsertim auxiliatur febrientibus: qui *Serap.* humorum prauitate, magis, quàm abundantia scatent, illisque præsertim conuenit, qui tenuis, & imbecillis, sunt temperamenti, macri, & exangues, cùm ijs alterantibus magis opus sit, quàm ducentibus humores.

LACTUCA, Græcis, *Θησαξ*. Arabibus, *Cherbas*, seu *Chas*. Italis, *Lattuca*. Germanis, *Lactuck*, *Lattich*. Hispanis, *Lechuga*, seu *Alfalfa*. Gallis, *Laitue*.

G E N E R A.

Matth.

Plura ac diuersa sunt lactuce genera. Est etiam & syluestris. Inter sariuarum genera habetur, quæ à crispis folijs, *Crispa* appellatur: quæadmodum & altera à lato caule, *Laticaulis* dicitur: Est & quæ sessilis vocatur. Nos verò in capitatam, rotundam & crispam, genera diuisimus: Differunt etiam foliorum colore, alia enim saturatè viridis est, alia subviridis, & quæ cruentis maculis sit respersa.

F O R M A.

Idem.

Crispa folijs exit crispis, maiori Intybo similibus: Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus folijs, tenerioribus, & vnà sese stipantibus, capitata autem parum folijs à rotunda differt, sed in globum folia conglomerantur, brassicæ capitatæ modo, in quo genere & ea quoque recensetur, quæ vulgo Romana nuncupatur; ceteris in cibis gravior, quæ candidior, teneriorque habeatur: caule edunt oesalbicantè, brachiatum, flosculis melinis, & semine tum albo, tum etiam nigro.

L O C U S.

Idem.

Seritur passim ab olitoribus, & ab alijs quibuscunque in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6.

simp. me. fontana.

Humidum, ac frigidum olus lactuca est, non tamen extremè, perinde ac aqua

DIOSC.

Stomacho in cibis gratè omnes habentur: somnū conciliant, aluū emolliunt, lacuocant, verum decoctæ magis alunt, stomachicis prosunt, si illorū edantur. Semè assiduas in somno imaginationes libidinosas cōpescit, & venerē repellit. Ipsa verò frequentius in cibo sumptæ oculorū claritati officiant: inflammationibus & ignibus sacris opitulantur. Earundè succus fronti, & temporibus illitus, febrientibus tum somnum cōciliat, tum capitis dolores mulcet: testiculis illitus nocturnas pollutiones cōpescit, & seminis profluuiū, addito caphuræ momento, sed venerē restinguit: Seminis cremor urinæ ardoribus opitulatur; cauendus aut lactucarum vsus suspiriosis, sanguinè excreatibus, pituitosisque; sed ijs maxime, qui procreandis liberis dant operam.

Matth.

L A C T U C A.



V I R E S.

LACTUCA florescens. Italis, *Lactuca florita*. Germanis, *Ettich mit der Blüt*.

LACTUCA FLORESCENS.



FORMA.

Folia, quæ ad terram sunt *Matth.* exolera paucioraque spectantur, caulis illi brachiatus parvis foliolis, ipsisque acuminatis refertus, floribus melinis nō magnis, qui in pappos euanescunt.

LOCVS.

Scarent ea horti ferè vni- *Matth.* versis in fine Æstatis.

QUALITATES.

Amaro percipitur gustu: *Matth.* quam ob causam abstergendi facultate nō vacat, & præsertim lacteus eius succus.

VIREs.

Lacteus caulium liquor o- *Matth.* culorum argemas, & maculas delet, & vitia cutis emendat.

LACTV-

LACTUCA sylvestris, Græcis, *Θρίδαξ αγρία*. Italis, *Lactuca saluatica*.

LACTUCA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth.

Sylvestris Lactuca folio exit oblongo, hyeracij maioris modo per ambitum laciniato, candidiore, graciliore, asperioreque quàm domesticæ, quinetiam aculeato, post quam caulē ediderit, amaro gustu. Caulē mittit florecentis domesticæ quadantenus similem, & flores pariter similes.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in aruis & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Matth.

Abstergit eius lacteus succus, & somnum conciliat, soporiferus etiam est, prouocat, & deijcit.


V I R E S.

Diosc.

Lacteus eius liquor aquam per aluum eijcit, si ex mulso bibatur duorum obolorum pondere: argemas, coliginesque repurgat, oculis instillatus: illinitur efficacius cum lacte muliebri adustionibus: somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, & contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur: semen satius modo libidinum imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet.

G E N S V R A.

Non desunt Pharmacopæi, qui è sylvestri lactuca aquas per alembicum parant, quam deinde pro Intybi aqua vendunt, decepti superiorum myropolarum inscitia.



GINGIDIVM, Græcis, Τρυγίδιον. Italis, Gingidio.

GINGIDIVM.

FORMA.



Est gingidium pastinacæ syl Diosc.
uestri haud ab simile, amarius Matth.
tamen, caule ramoso, rotun-
do, sesquipedali, striato, subni-
gricante, geniculatoque, um-
bella in cacumine alba, mino-
ribus circumquaq; comanti-
bus folijs: ipsisque laciniatis. E
florib. semen prodit, quo ma-
turescēte, umbella in sese con-
trahitur, vt in pastinacam, &
tactu glutinosa percipitur, ra-
dicem habet candicātem, spi-
thamæ longitudine, subama-
ro sapore.

LOCVS.

Copiosum in Syria nascitur, Matth.
vnde in Italiam aduectum se-
men, iam seritur in hortis.

QUALITATES.

Sicuti gustu amaritudinem Gal. li. 6.
& adstrictionem præfert, sic simp. me.
temperamento quoque ipso

caliditatem, & frigiditatem: secundum verò vtranque qualitatē desiccatorium
est, sed stomacho amicum, vt pote non paruam obtinens adstrictionem, quam-
obrem non admodum conspicuam caliditatem possidet: secundo autem reces-
su desiccatur.

VIRES.

Olus hoc crudum, coctum, conditumque estur magna stomachi vtilitate, v- Diosc.
tinam cit. Decoctum ex vino haustum vesicæ utilis est. Perspicuum verò est, Gal. 2. de
quod hæc herba medicamentum potius, quàm alimentum est, quippe quæ ad- alim. fac.
strictionis & amaritudinis non obscure, nec exigue particeps est.

CENSURA.

Eorum sententiæ minimè subscribendum est, qui volūt vulgare cerofolium
legitimum esse gingidium.

CEROFO-

CEROFOLIUM, Græcis, *χαριφυλλον*. Italis, *Cerofoglio*. Germanis, *Körffel*/sive
Kerbelkraut. Gallis, *Cerfueil*.

FORMA.

Matth.

Fragilis ac tenera est plan-
 ra, senis ab vno pediculo e-
 mergentib. folijs, vulgaris pe-
 trofilini modo per ambitum
 incisis. Caulibus sesquipeda-
 libus, pinguibus, subrufescen-
 tibus, genicularis: Umbellam
 in summis caulib. gignit, flos-
 culis albis stipatam, è quibus
 tenuia, rectaq; exeunt corni-
 cula in racemi ferè modum,
 ex vno petiolo emergentia, in
 quibus semen longiusculum
 concluditur, pullo colore. Ra-
 dix illi brevis in plures diuari-
 cata fibras.

L O C U S.

Idem.

Scrìtur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Tota planta dulcis est, &
 odorata acriusculo quodã ac-
 cedente sapore, vix ferè sensi-
 bilis: quo fit vt alijs oleribus addita, ea gustui graviora reddat. Estur cruda in A-
 cetarijs, vnà cum alijs plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum beta alijsque
 oleribus.

C E N S U R A.

Qui hanc Myrrhim esse autumant, non diligenter eius notas expenderunt.



VISNAGA, Italis. *Vishaga*.

VISNAGA.



FORMA.

Facie pastinacam agrestem *Matth.* eo usque refert, ut rectè dici possit, Pastinaca sylvestris maior. Nam caulium crassitudine, longitudineque: quin etiam umbellæ magnitudine, vulgarem sylvestrem Pastinacam superat.

LOCVS.

Nascitur copiosa in Syria: *Idem.* etiam nunc feritur in hortis in Italia.

QUALITATES,
ET VIRE.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.* sylvestris pastinaca.

CENSURA.

Non desunt, qui hanc plantam Gingidium esse credunt: Sed proculdubio falluntur.

PECTEM

PECTEN VENERIS, Italis, *Pettine di Venere*. Germanis, *Bilde Moren*.

F O R M A

PECTEN VENERIS.


Matth.

Radice niritur candida: cauliculis pedalis: folijs Anthemidis proximis, exilibus: floribus albis, emergentibus, turmatim ab eodē capitulo compluribus acuminatis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines ferè referunt, quibus linum mulieres concinnant, siue pectunt.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Huius radix cum malua tusa, corpori infixæ extrahit: Eadem cum herba, & floribus calesacta, cum albo meraco, & butyro, additis petrosilini folijs pubiq; adhibita, remorantem yrinam elicit.




CAYCA

CAVCALIS, Græcis, *Καυκαλίσ*. Italis, *Petrosello saluatico*. Gallis, *Perfil sauage*.

CAVCALIS.

FORMA.



Caule exit dodrantali, & Diosc. sæpe maiori, dauci, aut pastinacæ simili, subhirsuto, folijs apio similib⁹. sed quæ in caule, ac ramis sunt, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidsq[;], candida in cacumine umbella. Semine odorato, Radice pastinacæ.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, Idem. inculto præferim solo.

QUALITATES.

Gustu ac viribus Dauco si Gal. 7. milis est: nam exalfacit, vt il *simp. me.* le, & pariter desiccatur. Ape. Matth. rit, prouocat, abstergit, attenuatq[;].

VIREs.

Cruda, coctave oleris modo Diosc. do estur. Vrinam cit. Cor. Matth.

dis affectibus auxiliatur. Epotus succus calculos, & arenas pellit, & iocinoris, lienis, renumque pituitas attenuat: Semen haustum oculorum aciem acuit, & mentes fœminarum trahit. Datur viris contra feminis profluiuia cum aspleno, & viticis semine. Steriles prolificas facit, assidue ex vino potum: præstat aduersus Trigonis, Draconis, & Scorpionis marini ictus, vulnere illitus. Herba tota ex aceto mansa, & vomitione reddita aluum purgat, appetitum languentem excitat, nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat, tum herba ipsa in cibis sumpta, tum eius succus epotus, tum semen, tum totius plantæ decoctum: proinde datur vtiliter quartanarijs, scabiosis, & gallica lue affectis.

ERVCA, Græcis, *ῥυζαυρον*. Mauritanis, *Lergir*, seu *Giargir*. Hetruscis, *Ruchetta*. Cæteris Italis, *Rucola*. Germanis, *Weiß Senff*. Hispanis, *Oruga*, & *Arugua*. Gallis, *Roquette*.

ERVCA.**GENERA.**

Matth. Dnum est generum, *Satiua*, & sponte nascens.

FORMA SATIVÆ.

Satiua folijs exit oblongis, profunde laciniatis, *Sisymbrij* aquatici modo: sapore acri, & amariusculo: caule sesquipedali, floribus in cacumine albicantibus: semine in tenuibus corniculis concluso. Radix illi alba, tenuis, & acri, ut herba gustu.

LOCVS.

Idem. Seritur passim copiosa in hortis.

QUALITATES.

Gal. 2. de alim. fac. Excalfacit per quàm manimalim. festè, aded, ut nō facile, atque adiunctis lactucæ folijs edatur, siccat, attenuat, aperit, incidit, flatus pellit, & extergit.

VIRES.

Diosc. *Eruea* in cibis sumpta, genitale semen auget, & venerem excitat: concodi-
Gal. ibid. ni prodest, alio per quàm accommodata. Semen potum muris aranei moribus medetur, ventris tineas necat, lienemq; extenuat. Tritum, & ex melle illitum nigras vulnerum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò vitæ cutis in facie emendat, & lentigines emaculat.



ERVCA sylvestris, Græcis, *ῥυζακίον ἀγρίον*. Italis, *Ruchetta gentile*, & *Rucola salu-*
sica. Germanis, *Wild Weiß Senff*. Gallis, *petite Roquette*, & *Roquette sauvage*.

ERVCA SYLVESTRIS.



FORMA.

Folijs prouenit satiuæ an- *Idem*.
gustioribus, ac magis lacinia-
tis, gustu acriori sapidiorique:
caulibus numerosis: floribus
luteis: corniculis in vniuersa
ferè planta copiosis, sursum
spectantibus: semine sinapi si-
mili, acri, & amariusculo.

LOCVS.

Prouenit spontè locis ari- *Idem*.
dis, adeo, vt in muris quoque
nascatur.

QUALITATES.

Magis excalfacit, siccatur, at- *Idem*.
tenuat, aperit, incidit, extra-
hit, extergit, prouocat, quàm
satiua.

VIRES.

Ea omnia præstare potest Diosc.
quæ satiuæ, valentius tamen. *Matth.*

Costa, & deuorata infantium tussi medetur, addito saccharo. Tradidere qui-
dam, rria sylvestris erucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoq; deuorata, auri-
ginosos sanare.

OCIMUM, Græcis *ὄζυμον*. Italis, *Basilico*. Mauritanis, *Berendarios*, & *Bedareg*. Germanis, *Basilien*, & *Basilgram*. Hispanis, *Albahaca*. Gallis, *Basilic*.

OCIMUM.

G E N E R A.

Matth. Tria ocimi habentur genera omnibus cognita.

F O R M A.

Matth. Primū quod maius vocant, folia mittit Amarantho longè maiora, lara, oblonga, crassaq; Citreæ mali quadantenus æmula; flores spicatos, albo colore, è quibus semen gignitur subnigricans. Tota planta suauiter spirat.

L O C U S.

Idem. Seritur in hortis, & fœcilibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3. Excalfacit secundo ordine, habet quoq; recrementum humiditatem, quare eius minime idoneum iudicatur: pellit, aperit, prouocat.

V I R E S.

Diosc. Copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum emollit, flatu mouet, vnam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur. Mlirum cum hordeaceæ farinae polline, ex aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionum ictibus per sese prodest, & cum vino albo odorato oculorum doloribus. Succus instillatus, caliginem oculorum abstergit. Semen potum datur vtiliter infanientibus, ægrè mingentibus, inflatisq;. Naribus haustum sternutamenta mouet, sed oculos comprimere oportet cum sternutamentum vrget. Additur in Antidotis, quæ ad cordis affectus parantur.

Matth.



Ocimum alterum sine medium, Græcis, ὀκνυος ἑτερον. Italis, Basilico mezzano.

O C I M U M S E C U N D U M.



G E N E R A.

Duum est generum, odore Matth. tantum differentium.

F O R M A.

Folijsexunt maioris simili- Idem. libus, sed duplo minoribus. odore in altero quidē plebei ocimi, in altero verò citrei mali, adeo simili, ut nulla sit odoris differentia. Proinde hoc citratum Arabes vocauere.

L O C U S.

Seritur, & hoc in hortis, & Idem. scilicet.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Ea omnia præstare potest, Idem. quæ maior.

Ocimum minus, siue tertium, Græcis, ὀκίμνον μικρότατον. Italis, Basilico gentile.

O C I M U M M I N U S.

F O R M A.

Scrap.

Folijs constar paruis, odore cæteris fragrantiore, quare Mauritanis ocimum Caryophyllatum nuncupatur.

L O C U S.


Matth.

Seritur, & hoc in hortis, & scitilibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Idem.

Quanto cæteris est odoratius, tantò quoq; ad omnia efficacius.



OROBANCHE, Græcis, *ῥεοβάρχη*. Italis, *Orobanche*. Officinis, *Cauda leonis*.

OROBANCHE.



FORMA.

Cauliculum edit asparagi Diosc. instar, sine folijs, in cacumine hypocistis faciem referentem, subrubeum, hirsutum, mollem, pinguem, fistulosum, sesquipedalem. Flos illi subalbicans, hirsutus, è calyculis prodiens: Radix fungosa, digitali Matth. crassitudine, breuiq.

L O C U S.

Nascitur in segetibus, inter Idem. legumina, in campestribus, in pratis: secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES.

Est frigida, siccaq; natura Gal. lib. 3. in primo ordine. simp. me.

V I R E S.

Estur vt. olus asparagi mo- Diosc. do, legumentis addita concoctionem accelerare creditur.

Hæc planta à nonnullis herba tora vocatur, quod yacca ea deuorata illico tantum admittere soleant. Matth.

BARBVLA hirci, Græcis, Ταρακῶνα. Italis, Barba di becco. Hetruscis, Saffet-
ca. Germanis, Doctsbart Josephsblumen. Hispanis, Barba de Cabron. Gallis,
Barbe de bouc.

BARBVLA HIRCI.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, alterum
flore aureo, alterum purpura-
scente.

F O R M A.

Primum genus folijs exit
Crocī latioribus, ac longiori-
bus, floribus aureis, magnis, ē
calycibus prodeuntibus. Hi se-
reno cœlo fatiscunt, nubilofo
autem contrahuntur, oclu-
dunturq; concludo calycis ver-
tice. barba dependet incana,
prolixaq; inde illi nomē. E flo-
ribus papposum oritur caput,
in quo semen continetur ob-
longum. Radice nititur longa,
alba, dulci, iucundaq; qua uti-
mur nos in acetarijs.

L O C V S.


Idem. Prouenit copiosa in pratis
ac etiam saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Radix exalfacit, ac etiam primo ordine humectat.

V I R E S.

Idem. Glutinat hæc recentia vulnera si foliorum succus vel etiam stillatitia aqua in
splenijs admoveatur. Estur quoq; in cibis.



BARBVLA hirci altera, Græcis, Τριαντάφυλλον ἑρμαῖον. Italis, Barba di Beccho por-
porea.

BARBVLA HIRCI ALTERA.

FORMA.



Prodit hæc folijs alteri si- *Matth.*
milibus, aut paulò latiorib⁹,
& numerosiorib. robustio-
ribusque: caule quoq; simi-
li, geniculato, còspicuis pro-
pè genicula alis, è quibus ra-
mi prodeunt. Flores mittit
in cacumine purpurascèrès,
minores tamen quàm in al-
tera, radiantib. circumqua;
calycis apicibus in stellæ fe-
rè modum. Radice quoque
firmatur grandiore, robu-
stiorèque, lacteo succo re-
ferta, non quidem vt in alre-
ra dulci, sed adstringenti, &
amariusculo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Radicis lacteus succus ad- *Idem.*
stringit, cohibet, firmat, &
modicè abstergit, esui tamè
inidonea est.

V 5

SCORZO-


SCORZONERA, siue Scutzonera, seu Viperina. Italis, *Scorzonera*.

SCORZONERA HISPANICA.

F O R M A.

Matth.

Folia fundit hæc plâta Tragopogono (cuius procul dubio species est) longè latiora, & quæ solo p̄p̄inquiore sunt per ambitum sinuata, longo, pressoque pediculo, à radice prodeuntia, humique accubantia. Caulem edit sesquidodrantelem, & sæpe maiorem, teretem, geniculatum, in quo folia angustiora, minoraque spectantur. Flores profert aureos, Tragopogono aded æmulos, ut alterū ab altero vix cognosci possit. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur Tragopogono simile. Radice nititur sesquidodranti pollicari crassitudine, raris adnatis fibris, vegeta, tenera, fractu facili, alba intus pulpa, lacteo succo prægnante, dulci, & gustatu iucunda. Floret æstare.



L O C U S.

Idem.

Nascitur in sylvis, vliginoso solo, ac etiam alibi.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Matth.

Foliorum, radicūve succus datur præsentanco remedio potandus adversus viperarum, cæterorumque venenosorum animalium ictus, quin etiam ad quoscunque pestiferos morbos. Radix recens, sicca, aut saccharo cōdita, quotidie deuorata, pestilentia contagia arcet, & venenis quibuscunq; resistit. Datur eadem, aut eius succus vtiliter quoque comitialibus, cardiacis, vertiginosis, animi deliquio, cordisq; tremore, aut pulsu laborantibus: commanducata per se radix, tristitiam discutit. Lacteus radicis succus, oculorum nubeculas delet. In summa tota planta, magni est ad omnia vsus.

ORNITHOGALVM, Græcis, ἐρνιθάλογον. Italis, *Ornithogalo*. Gallis, *Chourles*.

ORNITHOGALVM.

* G E N E R A.

Habentur plures varietates *Ornithogali*, ex quibus duas hic depictas exhibem⁹.

F O R M A.

Primū folia habet aliquot tenuia, angusta, longa, mollia, per medium eorū lactea discurrente linea, in terram strata, completentia imum calliculi sesquipedalis, & plerunq; breuioris, teneri, cui adnascuntur aliquot ramuli vel pedunculi sustinentes nivosos intus flores, foris herbaceos, è quibus vascula fiunt sexangula, continentia semina compressa nigri coloris. Radix bulbosa, cādida, bulbos paruos adhærentes habet. Alterum maius est, & folia longitudine cubiti, latitudine digiti infima parte cingunt caulem vnicum robustum, rotundum, cubitalem aut maiorem, pluribus ornatū florib⁹, qui mediam

ferè partem caulis occupant, & formam spicæ efficiunt, singulis similis iam dicto *Ornithogalo*, intus albis, foris herbaceis cum apicibus intus luteis. Radix bulbosa similis est *Cepæ*, magna, candida, vt prioris *Ornithogali*.

L O C V S.

Abundat his Italia, & prope *Monspelim* quoq; inter segetes proueniunt.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Coquitur cum pane vt *Melanthium*. Radix cruda coctæve mādatur, est enim *DIOSC.* dulcis & suavis.*

T R A S I,



TRA S I, ita Veronensibus appellati. Venetis, *Dolzolini*, & *Trasi* dicuntur.

TRASI.

FORMA.

Matth.

Folij exeunt longis, in cacumine mucronatis, Cyperi modo, quem quidem planta tota plurimū emulatur. Caulis enim edit cubitales & angulosos, in quorum cacumine folia exiliora, in stellę modum radiantur. Inter quę flores spectantur spicati, subfulvescentesque. Radices habet numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, subrufescentes, fabarum magnitudine, ac etiam grandiores, alba, dulciq; intus medulla castanearum sapore, scabro putamine.

LOCVS.

Idem.

Nusquam proueniūt sponte in Italia, nisi in agro Veronensi.

QUALITATES.

Idem.

Excalfaciunt, & humectant ordine primo, leniunt, laugiant, emolliunt.

VIRES.

Idem.


Radicum bulbosarum cremor lacteus, pectus, & pulmones expurgat hantus, quo fit, vt tussientibus opem non modicam præstet. Tunduntur ergo radices, maceranturque carni iure, & deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam recentiorum nonnulli venereis potionibus admiscunt. Præstat idem haustus ad vrinę ardores, & præsertim si melopeponum, cucurbitarum, & cucumerum semen addatur, Veronenses, pro bellarijs ijs radicibus rescuntur, sed flatu excitant.



TVBERA.

TYBERA, Græcis, *idra*. Mauritanis, *Ramech*, *Alchamech*, *Tamer*, & *Kema*. Italis, *Tariasi*, & *Tartusole*. Germanis, *Hirschbrunst*. Hispanis, *Turmas de tierra*. Gal-
lis, *Truffes*, siue *Truffles*.

TYBERA.



GENERA.

Duo in agro Romano re- *Matth.*
periuntur genera: quorū al-
teri cādida pulpa, alteri puīla
subest. Habent & alia genera,
sed ignobilia & esui ingrata.

FORMA.

Rorūda radices (si rectè ra *Idem.*
dices appellari debent) tube-
ra sunt, sed omnino inæqua-
les, nigro, ac scabro, putami-
ne, sine folijs, ac sine caule,
nullis quoque adnatis fibris,
insipida intus pulpa: cū alba
(ut prædiximus) tum etiā ni-
gra. * Ad Tybera etiam sunt
picci isti fungi qui vocātur fa-
uaginosi, q. in Germania Ver-
no tempore sunt in delitijs,
vulgo *Morchel* nominantur. *

LOCVS.

Abūdā Tuberib⁹ optimis *Idem.*
Hetruria. Atqui alijs in Italia
locis copiosa pueniūt sitien-
tibus locis, ac labulosis, fruti-
cosisque.

QUALITATES.

Nollam euidentem habent qualitatē, qui ergo ijs vruntur ad excipiēda *Gal. 2. de*
condimenta tanquam materiam habent, ceu alia qualitatē expertia. *alim. fac.*

VIRES.

Terrena magis, quam aquea sunt, omniq; prorsus sapore expertia: Atrabili- *Auicēn.*
liarios, & crassos gignunt humores, magis quam cætera ciborum genera, quo-
fit, ut frequenter deuorata apoplexiam, aut paralysim excitent. Sunt & conco-
cū contumacia, & ventriculū agrauant. Experiantur magnatibus in cœnis, *Matth.*
belliariorum vice: quin etiam ijs, qui putant venerem ijs deuoratis cum pipere
tritari.

APPENDIX.

Tubera re vera, radices non sunt. Nullas enim fibras adnatas habent, nec sa-
ta vnquam proueniunt, nec etiam terræ cohærent, itaque terræ callum potius
sunt appellanda, & in fungorum potius, quam radicum genere recensenda.

SMILAX hortensis, Græcis, Σμίλαξ κηπάρα, ὁ χορὸς ἀβία. Mauritan. Lubia. Italis, *Smilace delli borri*, & *fagiuolo Turchesco*. Germanis, *Welsch Bonen* / *Wundbonen* / *Sprengel Bonen*. Hispanis, *Feyones*. Gallis, *Fasolz de Tarquie*, & *Faines peintes*.

SMILAX HORTENSIS.

G E N E R A.

Matth.

Varia *Smilacis hortensis* habentur genera (Phaseoli hortensis sunt seminum diversitate differētes) quidam enim candidi, alij rubescētes, nonnulli melini, plerique diversis, varijsque maculis infecti, reperiuntur.

F O R M A.

Matth.

Horū planta tota ferè facie vulgaribus fasilis persimilis viâtur, peculiariter autè differt in siliquarum & seminū magnitudine, quæ omnia in hortensibus maiora, latioraque spectantur, differunt etiam caule. Hortensium enim planta sarbores scandit, *smilacis* asperæ modo, itaq; sequaci sarmentorum, clauicularumq; reptatu, testudines, atregias, pergulas, & tabernacula conuectit.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S.


Aucen.

Excalfaciunt semina, & humectant ordine primo.

V I R E S.

Matth.

Semina in cibum sumpta magis inflât, & ventriculo laborem faciunt, quia vulgares fasilis, copiosiusque semen generant, & venerem stimulant, præterimque cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur, quod quidem longè valentius præstant, si ex lacte bubulo pingui elixentur: cornicula dum tenerima sunt, elixa perbelle in accarijs veniunt, alnum emolliunt, & pectus dilatant.



APHACA, Græcis, ἀράρα. Arabibus, Aphaki, Apaki, siue Albikia. Italis, Aphaca.
Germanis, Wilde Wicken & Vogels Wicken. Gallis, Vesse sauvage.

A P H A C A.



F O R M A.

Folijs est tenuibus, siliquis DIOSC.
lenticulæ maioribus, in quib⁹
terna, quaternave semina ni-
gra continentur.

L O C V S.

Nascitur non solum spon- Matth.
te inter segetes, sed etiã à qui-
busdam seritur ad columbarũ
faginam.

Q U A L I T A T E S.

Semen viciæ modo amarũ Idem.
est, & terrenæ essentia, ideo-
quæ obsterforia est facultatis,
adstringendi quoque vim ha-
bet.

V I R E S.

Seminis farina vino suba- DIOSC.
cta, illinitur vtiliter ad serpen-
tium, & quadrupedum quo-
rumcunq; morsum: melle ex-
cepta, & illita, lentigines, va-

ros, & cætera cutis vitia delet: torrefactum semen, stomachi, aluique fluxiones
sistit, si frefum lentis more decoquatur, sed melancholicos humores gignit.

V I C I A.

VICIA, Græcis, Βίχιον. Italis, Veccia. Germanis, Bickett. Gallis, Vesse.

FORMA.

Match.

Folia mittit aphacæ angustiora, in acutum desinentia, corniculis oblongis, teretibus, nigro semine stipatis, Orobi magnitudine: caulem edit bicubitalem, qui claviculis è ramusculorū summitatibus prodeuntibus, segetibus sese implicat.

LOCVS.

Idem.

Oritur sponte in aruis inter segetes, & feritur quoq; ad columbarum, aliorumque volucrum saginam.

QUALITATES.


Idem.

Excalfacit, & siccit, mundat, abstergit, & adstringit.

VIRES.

Non differt ab Aphacæ, peculiariter autem vrinam ciet, & tabidos iuuat, si ex prisana frequenter sumatur.

VICIA.



PORRVM.

PORRVM, Græcis, Πράσον. Mauritanis, *Curat*, seu *Kurat*. Italis, *Porro*. Germanis, *Lauch*. Hispanis, *Puerro*. Gallis, *Porreau*.

P O R R V M.

G E N E R A.

Duum est generum: capitatum, *Matth.* Græcis, κεφαλωδὺν dicitur, & Scitile.

F O R M A C A P I T A T I.

Capitatum folijs prouenit alio *Matth.* latioribus, longioribusque, carinatis, & in acumen desinentibus. Ceruix illi longa, bulbosâq; , candicans, crassiori capite, numerosis radicibus, ipsiq; tenuibus, & capillatis: tunicis quoque numerosis conglomerato. Bimum in caulem prosilit capæ modo, longum, cauumque, floribus in cacumine in orbem congestis, semine nigro, capacco similis.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Corpus excalfacit, crassos humores extenuat, glutinososq; incidit. *Gal. 6. de alim. facul.* Inflât, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit.

D I O S C.

V I R E S.

Vrinam ciet, aluum mouet, oculorum aciem hebetat, menses pellit, sed lædit exulceratam vesicam, renésque, cum ptisana verò coctum, esu, pectoris vitia extrahit. Coma in

D I O S C.

aqua maris, & aceto cocta, in defecssionibus ad præclusiones, & duritias vuluæ vtilis est. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet, quare cum aceto, & thure, sanguinis profluvia sistit. Venerem stimulat. valet contra omnia thoracis vitia: arteriam esu purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit, stomacho aduersatur, succus cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Semen veteres sanguinis reiectiones cohibet, duarum drachmarum pondere cum æquali baccarum myrti quantitate potum. Illinuntur decocta folia ad tumentes, dolorificasq; hæmorrhoidas. *Matth.* Eadem mellē subacta illinuntur ad venenosorum omnium ictus: caput cum ceruice ex melledelictum præstat ad omnia pectoris, & arteriæ vitia. sumitur sub cineribus tostum, ad fungorum yenenâ, Idem crapulam, & ebrietatem discutit.

Matth. PORRVM sectile, Græcis, Πέαςον τρυπτόν. Italis, Porro minore. Germanis, Schnittlauch/ sine Fleischlauch.

PORRVM SECTILE.

FORMA.


Idem. Non differt à Capitato, nisi quod capite sit tenuiore, ac etiam ceruice.

LOCVS.

Idem. Seritur in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.


Idem. Ea omnia præstare valet, quibus capitatum pollere diximus.



AMPELO-

AMPELOPRASVM, Græcis, ἀμπελόπρασον. Mauritanis, Nabati. Italis, Porro saluatico, & Porandello. Germanis, Wilderlauch. Hispanis, Ajos, & Puerros de las vinhas. Gallis, Porree de Chians, siue Porreau sauuage.

AMPELOPRASVM.



FORMA.

Ampeloprasum porri faci. *Matth.* em representat, sed folijs, ceruice, capiteq; longè minoribus, & ad mandendum durius, acriusque.

LOCVS.

Oritur sponte in Vinetis, *idem.* vnde illi nomen, secus fepes, & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Acrius, & siccius satiuo habetur, attenuat, & crassa incidit, & obstructions aperit, & prouocat vrinam. *Gal. li. 6. simp. me.*

VIREs.

Stomacho magis quàm do- *DIOSC.* mesticum aduersatur, plus autem excalfacit, & vrinas, & menses vehementius ciet. Estur vtiliter, atque etiam illinitur ad serpentium morsus.

Lentos, crassosque humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa *Gal. libid.* obstructione liberat.

CÆPA, Græcis Κεράμυρον. Arabibus, Basil, seu Bassal. Italis, Cipolla. Germanis, Zwiebel. Hispanis, Cebolba. Gallis, Fiboule, & Oignons.

GENERA.

C A E P A

Theoph.
Matth.

Ceparum genera plura, diuersaq; habentur (vt Theophrastus est autor.) Atqui nos de quatuor tantum generibus scribemus, nempe vulgari, communiq; Sectili, Fissili, & Ascalonico.

FORMA VULGARIS.

Matth.

Cepæ folijs proueniunt longis, fistulatis, teretib; & acuminatis: caule verò cubitali, maioriq; tubæ faciē præferēte, inani ac fragili, in cuius summitate, flores exēūt in globum sese stipantes, è quibus semē oritur nigrum, porraceo simile. Radice nititur bulbosa, sessili, rapi rotūdi instar, & inferiori parte fibrata, sed etiam in his notantur differentie. Forma enim alię maiores, alię minores, quædam longæ, quædam rotundæ, quædā verò sessiles proueniunt. Sicut colore rubentes, & subrubētes alix, quædam virides, & albæ nonnullę. Quin etiam sapore, vel acerrime, vel mediocriter acres, aut nihil ferè acedinis habentes.

LOCVS.

Idem.

Serūtur, trāspantāturq; in hortis.

QUALITATES.

Gal. 7.

simp. me.

Cepa exalfacit ordine quarto: Escentia autem eius potius est crassarū partium. Porro si succum eius exprimas, quod reliquū est, terreæ admodum est substantiæ, eiusq; calidæ, at succus aqueæ, æreæq; calidioris.

Diosc.

Longa longè acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & crūdā quàm coctā, omnes tamen mordent, flatus gignant, appetentiam inuitant, sitim mouent, attenuant & expurgant.

VIREs.

Diosc.


Cepa repurgata à putaminibus, & in oleo coniecta, & pro balano subdita, hæmorrhoides, reliquosq; excretionum exitus referat. Succus ex melle illitus, oculorum hebetudinibus, genis, nuceulis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, menses suppressos pellit. Naribus infusus caput purgat, vitilignes sanat, in sole illitus. In auribus sonitum & grauitatem emendat. In alopecijs illitus, capillos reuocat. Largiore cibo deuorata cepa, capitis dolores excutit, coctā vehemētius vrinam pellit. Elixæ cum vuis pafsis, & fico tubercula admota concoquit, & celerrimè rumpit: ubi cineribus tosta, belleq; macerata, datur vtiliter ex melle aut saccharo deuoranda anhelosis, asthmaticis, & tussientibus. Eiusdē squama sub feruenti cinere tosta diuturnum capitis dolorem sedat, vbi frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem introductur superasperso rosaceo & laurino oleo, succidaq; addita lana, quæ toram operiat aurem. Succus cum acerrimo aceto mistus, sanguinem è naribus manantem sistit, ijs immisus.

Matth.



CÆPA sectilis, Græcis, Κεράμιον τμητὸν. Italis, Cipolle settiuole. Germanis, Matth.
Schmittwibel.

CÆPA SECTILIS.



FORMA.

Folijs exit, caule, floribus, *Idem.*
& semine, vulgaris cæpæ si-
milibus, sed longè minori-
bus, tenuioribûsque. Bul-
bis verd, ac ceruice, oblon-
gis, tenuibus, & minimè ca-
pitatis, ob idque germinatio
tota in folijs, sæpiûsq; reton-
detur, vt porrum.

LOCVS.

Seritur in hortis ad obso- *Idem.*
nia, & condimenta paranda.

QUALITATES,
ET VIRES.

Hisdem pollet facultatibus, *Idem.*
quibus vulgaris cæpa dota-
tur.

CÆPA fissilis, Græcis, Κεμμυρα γλίσδα. Hetruscis, Cipolle malige. Germanis, Schleißwibel.

CÆPA FISSILIS.

F O R M A.


Matth. Facie tota Ascaloniam refert, nisi quod omnibus suis partibus major spectatur. Bulbi plures ab vna tantum radicum coma oriuntur, longa, tenuique ceruice nitescentes, Ascaloniæ modo, sed a credine differentes.

L O C U S.

Idem. Habentur passim in hortis, in Hetruria.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Ea omnia possunt, quæ & cætera genera.



CÆPA

CÆPA Ascalonia, Græcis, Κρόμμυς ἀσκαλώνιον. Italis, Scalogna. Germanis, *Aschlauch*.

CÆPA ASCALONIA.

F O R M A.

Folijs pronenit tenuibus, *Matth.* longis, teretibus, fistulosis, in acutum desinentibus; ceruice pariter tenui, bulbis numerosis, ab imo radicum cespice prodeuntibus, paulò nucis auellanae maioribus, parui fici faciem representantibus, sapore admodum acri, haud tamen ingrato.

L O C U S.

Seruntur Ascaloniae Cæpæ *Idem.* in hortis ad ciborum condimenta.

Q U A L I T A T E S.

Exalfaciunt, & siccant: in- *Idem.* cidunt, aperiunt, prouocant, deiiciunt.

V I R E S.

Non solum ea omnia præ- *Idem.* stare possunt, quæ cætera cæparum genera, sed cibi appetentiam faciunt, vermes intestinorum necant, & caput non adeo lædunt.

ALLIVM, Græcis, *Σκίροδος*, Pœnis, *Chaum*, & *Cairin*. Italis, *Aglia*, & *Aio*. Ger. *manis*, *Knoblauch*. Hispanis, *Ayos*. Gallis, *Ail*, & *Aux*.

ALLIVM.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Satium, & Sylvestre. Huius plura sunt genera, nēpe *Ophioscorodon*, *Elaphoscorodon*: Vrsinum, & *Anguinum* alterum.

F O R M A.

DIOSC. Satium folijs provenit porro similibus, minoribus tamen, ceruice lōga, capite bulbofo, quod pluribus coagmentatur nucleis, siue spicis, sapore acri, sed ori non ingrato, quod autē in Aegypto provenit singulari, vt porrum capite cōstat, candido, ac minus acre. Sylvestre *οφιοσκορδον*, Græcis vocatum, singulari capite cōstat nullis diuisum nucleis, satiuoq; longē minus, sed odore, saporeq; non absimili. folijs angustioribus, gracili caule, in cuius cacumine flos emicat purpureus, & semen subsequitur nigrum. Huic simile ferē est, quod *ελαφιοσκορδον*, Græci vocant, id est ceruinum Allium. De cæteris inferius dicitur.

Matth.

L O C V S.


Matth. Satium in hortis, & campis feritur. Sylvestre verò in collibus, & montibus sponte provenit.

Q U A L I T A T E S.

DIOSC. Vis illi acris est, morder, excernit, digerit, pellit, aperit, incidit, **Gal. 7.** prouocat, excalfacitq; & siccat ordine quarto. **fimp. me. facul.**

V I R E S.

Gal. li. 12. Aluum turbat, flatu discutit, coli dolores minuit, vbi à flatu prouenerint. Sitim gignit, oculorum aciem hebetat. Latas ventris tineaes esu abigit, vrinam ciet. Prodest, contra viperæ, & peculiariter hæmorrhoidis icturnum, ita vt non aliud magis, si cum vino assumatur: præter quoq; contra rabiosorum morsus, tam illitū, quam potum, vocem clarificat, veterem ruisin coctum, crudū vel lenit: Ex origani decocto potum, pediculos, & lendes necat, vitiligines, lichenas, lentigines, manantia capitis vlcera, lepras, & furfures, cum melle, & thure eximit, cum thure, tædaq; decoctum dentium dolorem mulcet in ore detentum. Coma feruefiat, & in defensionibus addita, menses, & secundas extrahit, Hydropicis quoque est vtile, & præserim Timpanite laborantibus.



ALLIUM anguinum, alpinum &c. Græcè, ὄφιοσκόροδος, vel ὀφιοσκόροδος. Italis, *Aglis* serpentino, aliquib. *Victorialis* longa. Germ. *Neunhelm* / *Matferknoblauch* / *Siegwurz* Weible.

ALLIUM ANGVINVM.

FORMA.

Folia profert lilio conual- *Matth.* lio ferè similia, angustiora tamen, & nigris maculis respersa; quin etiam caulis iisdem inficitur notis, Dracūculi maioris modo, quo factum est, vt à nobis *allium Anguinum* fuerit appellatum: Cervice nititur longa radice bulbosa, inuolūcris, vt in croco circumtecta, numerosis inferna parte fibris, vulgaris allij odore, saporeq; prædita.


LOCVS.

Nascitur in Montibus ex- *Idem.* cellis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit, & siccatur perin- *Idem.* de ac *allium* agreste, & suis in facultatibus illi per omnia simile existit.

* Superstitiosi appendent radicem pecoribus quocunque casu excæcatis, & visum hinc ipsis reddi sibi persuasum habent. *



Plin. fibr. ALLIVM-VRVINUM, Italis, *aglio degli Orsi*. Germanis, *Bär / & Hundts Knob*.
 29. cap. 6. *lauch / Kampen / Kempfen / & Kamseren*.
in fine.

ALLIVM VRVINUM.

FORMA.

Matth.

Folijs exit laris, minoris
 plantaginis ferè æqualibus,
 frequenter striatis, caulibus
 angulosis, in quorum summi-
 tate flores sunt in umbellæ fe-
 rè modū se diffundentes: Ra-
 dice nititur bulbosa, spicata-
 que, lilij albi modo, depen-
 dentibus ima sede capilla-
 mentis.

LOCVS.


Idem.

Nascitur in collibus, in syl-
 uis, & aliquando inter sege-
 tes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.


Ea omnia præstare posse
 creditur, quæ cæteris agre-
 stium alliorum generibus as-
 signantur.



SCORODO.

SCORODOPRASVM, Græcis, Σκородοπρασον. Italis, Agliporro. Germanis, Aertknoblauch. Gallis, Ail porreau.

SCORODOPRASVM.



FORMA.

Magnitudine porrum & Dioscori
quat, folijs, ceruice, & capite
quoque similibus.

LOCVS.

Nascitur sponte in prato Matth.
rum, agrorumq; marginibus,
& propter sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Scorodoprasum, sicut gu- Galen. 7.
stu, & odore mediam allij, & simp. me.
porri qualitatem possidet, ita
& vires. Coctum porri mo- Dioscori
do, dulcescit, & in olerum vi-
cem transit.

SINAPT.

SINAPI, Græcis, *Σίνυσι*. Hetruscis, *Senape*. Italis quibusdam, *Senauro*. Martitanis, *Cardel*, & *Chardel*. Germanis, *Senff*. Hispanis, *Mofaza*. Gallis, *Senecue*.

S I N A P I.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, quorum vnum rapaceam frõdem exprimit: alterum gracili est folio: tertium verò *Eruca* folio laciniatur.

F O R M A P R I M I.

Plin. 19. cap. 8. Quod rapi folijs prouenit cæteris maius, domesticũ est: caulem mittit vegetum, subhirsutum, à quo ramusculi superiore parte crescunt, in quibus semẽ subrufum in corniculis prouenit, acerrimo sapore, ac etiam olfactu infestũ.

L O C V S.

Matth. Seritur in hortis passim ab olitoribus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. simp. me. Calefacit, & siccit ordine quarto.

V I R E S.

Diosc. Ad extenuandum, incidendum, detergendum, extrahendumq; efficax est. Manditur ad eliciendam capitis pituitã, contra veterem, callosamque arteriẽ scabritiem. Succus ex aqua, & melle vtiliter gargarizatur: tritum, & naribus ad motum sternutamenta ciet: fœminas vuluæ strangulatũ oppressas excitat; illinitur auxilio magno lethargicis, derafo capite, cum ficis admistum, donec rubescat locus: quin etiam eodem modo ad ischiadicos dolores. Additur in emplastris extrahentibus, scabiẽmque extenuantibus, magno sanè vsu. Seminis farina aceto subacta, illinitur ad serpentium, & scorpionum ictus, pota verò fungorum venenis auxiliatur, illinitur & hydropicis ex impubis pueri vrina, sordities omnes corporis abstergit, cuti natium conciliat nitorem. Datur quoque vtiliter suspiriosis, & asthmaricis.

Matth.



SINAPI alterum, Græcis, Σίνωσι ἑρэгov. Italis, *Senape*, sine *Senauro saluatico*.
German. Gelber Senff.

SINAPI ALTERVM.

FORMA.


Folia habet tenuiora, plura *Matth.*
ex vno ramusculo prodeun-
tia, caulem rectum, firmum,
asperum, scabrum, hirsutum-
que, à medio ramosum: cor-
niculis numerosis, atque hir-
sutis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, in *Idem*.
campestribus, & inter rude-
ra.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare potest *Idem*.
femen, quæ satiuo sinapi assi-
gnantur.



SINAPI

SINAPI tertium. *Italica, Senape bianca, siue Rocchetta.* Gallis, *Moustarde blanche, & douce.*

SINAPI TERTIVM.

FORMA.


Matth.

Folijs exit sylvestri crucæ
similibus, frequenter lacinia-
tis, ramis tenuibus, in caulis
summitate exsertibus, in qui-
bus vtrinque siliquulae spectan-
tur, albo intus semine, non a-
deo, ut in alijs generibus acri.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Cum non sit, ut in cæteris
generibus, eius semen acre,
non adeo, ut illa excalfacit, &
siccat. Itaque & si ad omnia
utile habeatur, ad quæ cætera
genera, imbecillius tamē est.
Atqui semen peculiariter in
vinum mustum coniectum,
diutius eius dulcedinem tue-
tur, atque eam deficere pro-
hibet.



NASTUR

NASTURTIVM, Græcis, *Κάδευον*. Mauritanis, *Narf*, *Alchaf*, seu *Narf*. Italis, *Nasturtio*, & *Agreito*. Germanis, *Gartentref*. Hispanis, *Nasturtio*, & *Malpica*. Gallis, *Cresson de iardini*, & *Nasturt*.

NASTURTIVM.



F O R M A.

Herba est tenuis, folijs parvis, laciniatis, caule tenui, sesquipedali, flore albo, semine in rubeum nigricante, folliculis orbiculatis, squamosisq; incluso Thlaspi modo, acris sapore. *Matth.*

L O C V S.

Seritur passim in hortis, & *Idem*. vsurpatur ad ciborum condimenta, & intinctus, & venit quoque alijs cum herbis in acetarijs.

Q U A L I T A T E S.

Semen adurentis facultatis particeps est, exalfacit, & *simp. me.* fliccat ordine quarto, folia viridia multò inferiora semine sunt, adeo vt mordacitas eorū moderata sit. Attenuat, mūdat, aperit, prouocat, incidit, vrit, & resoluit. *Matth.*

V I R E S.

Stomacho aduersatur, alidiosum turbat, ventris tineas excutit, lienem minuit, partus exanimat. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: sorbitionibus incoctum pulmonum vitia extrahit: serpentium venenis potum resistit, arqueas suffitu fugat, capillorum defluvia cohibet, coxendicibus commodè exacetuillinitur. Animum exacuit. Succus dentium dolores mulcet, si calidus in aure dolentis lateris fuerit instillatus, semen denariorū decem pondo ex aqua potum, bilem subducit, capitis vitia purgat, & visum acuit. *Matth.*

THLASPI, Græcis, Θλάσσι. Barbaris, *Nasturtium tectorum*. Italis, *Thlasi*.
Germ. *Besentkraut*. Hisp. *Paniqueño de flor blanco*. Gallis, *Senne sauvage*.

T H L A S P I.

G E N E R A.

Matth.

Quatuor Thlaspi obseruamus genera, vt ex eorum imaginibus hic seriatim appictis patebit.

F O R M A.

Diosc.

Primum folijs est angustis, digitali lōgitudine, in terram versis, subpinguibus, in cacumine diuisis, cauliculo tenui binum dodrantum, non sine adnascantibus ramis, fructu circa ipsum torum, ab extremo in latius se pandente: semine Nasturtij vasis incluso, lenticulę effigie, nisi quod infringitur, vnde nomen accepit. flos illi albicat.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in semitis, sepibus, & fossis, quin etiam inter rudera, & in vetustis ædificiorum muris, & tectis.

Q U A L I T A T E S.

Galen.

Semen habet & ipsum facultatem acrem. Excalfacit, exiccat, attenuat, viti-

Matth.

extrahit, prouocat, expurgat, & incidit perinde ac Nasturtij semen.

V I R E S.

Diosc.

Semen bilem vtrinque extrahit acetabuli mensura potum: prodest ischiadicis infusum: potum sanguinem educit: internas suppurationes rumpit, menses ciet, sed fœrum enecat. Additur in antidotis, ideoque in theriacam ingreditur.

Matth.



THLASPI secundum, Scorodothlaspi, Græcis, Θλάσι ἑτερον. Italis, *Thlaspi maggiore*.

THLASPI II. SIVE ALTERVM.

FORMA.

Folijs exit alteri maioribus, *Matth.* latioribusque, prope caulem diuisis, & per ambitum serratis, caule firmo, ramosoque, filiquis latioribus in cacumine diuisis, pressisq; in quibus semen minutum continetur, aureo colore.

LOCVS.

Nascitur in agrorum mar- *Idem.* ginibus, & inter segetes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen minus mordet, mi- *Idem.* nusque longè calefacit, & siccat, atque etiam cetera minus præstat, quàm alterius.



Y

THLASPI

THLASPI tertium, Saxatile. Italis, *Thlaspi della terza specie.*

THLASPI III.

FORMA.

Folijsprouenit à radice numerosis, oblongis, subalbicantibusq; minime gustatua-cutis, caulibus, & ramis renui-bus, tenuibusque folliculis circumquaq; stipatis, in quibus semen Thlaspi simile acerrimi gustus.

LOCVS.

Nascitur locis saxosis, & asperis.

QUALITATES, ET VIRES.


Excalfacit, & siccat perinde ac aliagenera, & cætera quoque præstat, sed non adeo vehementer.



THLASPI

THLASPI quartum, siue Creticum, Cappadociumue. Italis, *Thlassi della quarta specie.*

THLASPI IIII.



FORMA.

Folia profert longa, angusta, raraque in caule ramoso, * nā inferiora latiora sunt & nonnihil crenata. Flosculi in fastigijs ramulorum dilute purpurascens vmbellas cōstituant, quibus succedunt folliculi parui vt primi thlaspios, in quibus semen. *

LOCVS.

In Pannonia superiore nascitur in incultis locis, & in collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen cum acerrimo habeatur sapore pariter calefacit, & siccat, & ea omnia prestare potest, quæ primi generis Thlaspi adscribuntur.

BURSA pastoris, Italis, & Officinis eodem nomine appellatur, quin etiam sanguinaria aliquibus, non nullis herba cancri, & alijs crispula quoque vocatur. Germanis, *Seckeltraut* / & *Tescheltraut*. Gallis, *Bourse à Pasteur*.

BURSA PASTORIS.

FORMA.

Matth.

Caules edit teretes, sesquidodrantales, ramis tenuibus in summitate emergentibus, folia eius prima verbenacæ proxima spectantur, sed quæ in caule sunt Thlaspi æmula sunt. radicem habet tenuem, candidamque: flores edit in summis ramulis albos, è quibus pressæ oriuntur siliquæ, cordis ferè imaginem referentes, semine intus paruo, ac minuto.

LOCVS.

Idem.

Nascitur ferè vbique, præfertimq; secus vias, in antiquis ædificiorum parietibus, in hortis, & vineis, & inter rudera.

QUALITATES.

Idem.

Est hæc planta ex refrigerantium, & adstringentium genere.




VIRES.

Idem.

Prodest attrita, & illita cum inflammationibus, tū etiam sacris ignibus, decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturq; eius decoctum ad dysenteriam, & cruentas excreationes, herbæ succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. sistit mensum abundantiam. si in eius, & persicariæ decocto infideant mulieres. Esturq; ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata, quàm admodum additur in emplastris, quæ ad capitis vulnera parantur. in calceos coniecta, & nudis pedibus pressa auriginem tollit.

ARABIS, siue Draba, Græcis, *Αραβίς*, & *Δραβή*. Italis, *Draba*. Barbaris, *Nasturtium Orientale*. Germanis, *Türkisch Kress*.

ARABIS, SIVE DRABA.



F O R M A.

Ad cubiti altitudinem aspidiosc. surgit, tenues spargens ramos, & ex utroque latere folia, lepidij æmula, sed molliora, & candidiora, in cacumine verò sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem.

L O C U S.

Nascitur in campestribus, Matth. & agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S.

Insignis est acrimoniæ, & Serap. Nasturtio per omnia similis, itaque valenter excalfacit, & siccatur.

V I R E S.

Herba cum ptisana coquitur ad pituitosa pectoris vitia: semen aridum pro pipere obsonijs admiscetur.

* ARABIS à quibusdam dicta Pianta.

F O R M A.

Eradice valida, & longissima, colore subalbida & sapore non minus acri quam Nasturtiū, caules promit complures ultra humanam longitudinem, graciles ramen & circa summitates in aliquot ramulos dinaricatos, qui non umbellam efformant, sed sine ordine nascuntur sustinentes flosculos copiosos luteolos, ex quaternis folijs compositos, ex quibus semen relinquitur oblongis strictisque siliquis inclusum, tenue, fuluum, acre. Folia vestiunt totam stirpem oblonga, acuminata, crenata per oras, & circa fastigia caulium quæ prodeunt longe inæqualiore ambitu laciniata spectantur.

L O C U S.

Habetur in hortis, & forte alicubi sponte nascitur.



Q U A L I T A T E S , E T V I R E S .

Acredo ipsius manifesta qualitate & viribus cum Arabi convenire illi cuius prodit.*

IRIO Latinis. Græcis verò Εἰρίσιμος. Italis, *Erisimo*, & *Irione*. Germanis, *He-
derich* / & *Wilder Senff* / *Schnödsenff* / *Schluszenff* / & *Steinsenff*. Hispanis,
Rinchon. Gallis, *Velar*, siue *Torcelle*.

IRIO, SIVE ERISIMVM.



GENERA.

Duo eius habentur gene- *Matth.*
ra, foliorū magnitudine diffe-
rentia.

FORMA.

Folij exit Erucae syluestris, *Diosc.*
cauliculis in lori modum len-
tis, & obsequiosis: floribus lu-
teis: filiquis in cacumine gra-
cilibus, acuminatisq;, in qui-
bus semen reconditur exigu-
um vrentis gustus.

LOCVS.

Oritur iuxta vrbes, rudera, *Matth.*
arque hortos, quin etiam in
plateis, & ædificiorum arcis.

QUALITATES.

Acrimonia poilet, vt Na- *Galen. 6.*
sturtium, & Sinapi. *simp. me.*

V I R E S.

Contra thoracis effluxiones efficax est, & purulenta extussentibus auxilia-
tur, regio morbo, & coxendicibus prodest, bibitur etiam vtiliter contra dele-
teria pharmaca: illinitur ex aqua, aut melle cæcis carcinomatibus, parotidibus,
mammarum duritijs, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & ex-
calfacit.

VVLGARIS Irio, Italis, *Irio*, o vero *Erisimo commune*.

IRIO ALTER VVLGARIS.

FORMA.


Matth. Folia mittit hortensis Eru-
cæ, caules lentos, flexilesque,
ramis in summitate tenuibus:
rotundis, acutis, tenuibusque
corniculis vndique stipatis,
sursum spectantibus, in qui-
bus semen cōcluditur minu-
tum, flauo colore.

LOCVS.

Idem. Prouenit, vt alter, iuxta vr-
bes, rudera, hortosque.

QUALITATES,
ET VIRES.


Idem præstat eius semen,
quod alteri quoque adscribi-
tur, peculiariter auté sesqui-
drachmæ pondere, ex ovo sor-
bili, deuoratum tribus conti-
nuis diebus, seminis proflu-
uium cohibet, & ex vino renum calculos pellit.



PIPER,

PIPER, Græcis, Πίπερι. Mauritanis, Fulfel, & Fulful. Italis, Pepe, & Peuero. Germanis, Pfeffer. Hispanis, Pimienta. Gallis, Poyure.

P I P E R.



G E N E R A.

Plura Piperis sunt genera, nem- *Matth.*
pe nigrum, albū, longum, Aethio-
picum, & quod vocant Itali Indi-
cum.

F O R M A.

Seritur Piperis planta, quod rep- *Idem.*
pat clematidis alterius modo, pro-
pe proceras plantas, super quas re-
pit ad fastigium vsque, folijs raris,
citrei mali effigie, sed minoribus,
gustu aliquantulum acribus. Fru-
ctum profert racemosum, vuarum
modo, sed minorem, perpetuo vi-
rentem donec siccetur, & plenam
maturitatem consequatur, quæ
conficitur Ianuario mense, radice
niritur pusilla. Huic nigri piperis
plantæ, persimilis omnino est, quæ
Piper album gignit.

L O C V S.

Piperis prouentum maximum *Idem.*
habetur in Malauar locis mariti-
mis, quæ à Comorin ad Cananor
vsq; pertingunt: quin etiam in Ma-
lache maritimis; & in insulis, quæ
circa lauam sunt: vnde per mare
Erythræum ad nos comporta-
tur.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Excalfacit, & siccatur valenter, in- *DIOSC.*
cidit, attenuat, concoquit, proto- *Matth.*
cat, distrahit, discutit, & abstergit,

febrium horroribus tam potum, quàm illitum subuenit: serpentium moribus auxiliatur,
parrus extrahit: tussi, omnibusque pectoris vitijs à pituita exortis, tum in potu, tum in ecle-
gmate succurrit: cum melle vtiliter anginis illinitur: tormina discutit, cum recentibus lauri
folijs haustum: cum vua passa manducatum pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur,
dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuvat: strumas cum pice discutit, & vi-
telligines cum nitro emaculat. Integra grana quinq; numero quotidie deuorata, ijs auxili- *Matth.*
antur, qui ventriculi dolore, tum ex statu, tum cruditatibus exorto, laborant.

C E N S V R A.

Delusi sunt antiqui omnes, quod crediderint ex eadem planta prouenire nigrum Piper, *Matth.*
& longum, siquidem alia valde diuersa planta piper longum mittit, quod in Begala nasci-
tur.

PIPER Æthiopicum. Italis, Pepe d'Ethiopia.

PIPER ÆTHIOPICVM.

FORMA.

Matib.

Pronenit hoc Piperis genus in filiquis nigris racematim exeuntibus, pisorum, aut phaseolorum similibus, semine intus, nigri piperis baccis paulo minore, ac pertinaciter filiquis inhærente.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in Æthiopia, unde nomen inuenit apud Arabes.


QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, & siccat vehementer, attenuat, incidit, prouocat, aperit, digerit, resoluit.

VIRES.

Vruntur eo Æthiopes ad dentium dolores.



CENSURA.

Manifestè cæcutiunt, qui Æthiopum Piper Carpesium esse contendunt.

INDICVM

INDICVM PIPER huc Siliquastrum. Italis, *Pepe cornuto*, aut *Pepe d'India*. Germanis, *Indianisch Pfeffer* / & *Schootenpfeffer*. Gallis, *Poyure de Inde*.

PIPER INDICVM.



F O R M A.

Folij exit hortensis solani *Marth.* maioribus, oblongioribusque, caule sesquicubitali, viridi, ramis compluribus brachiato, geniculatoque. Floribus candicantibus, è quibus vaginæ oriuntur corniculorum speciem referentes, viridi primum colore, & deinde coralliorum modo rubescente, pellucido, gustu acerrimo, adèd vt piper omne sua ingenti acredine superet. In his semen concluditur minutum, colore subalbicante, eiusdem protinus gustus.

L O C V S.

Seritur in hortis, & ficti- *Idem.* libus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & siccat excess. *Idem.* su quarto. Ideoque valenter vrit, & exulcerat corpus admodum recens.

V I R E S.

Recentia corniculata tusa, & illita Ichiadicos iuuant, siquidem locum ex-
tunt.

C E N S V R A.

Non desunt doctissimi viri, qui hoc piperis genus Cardamomum faciunt, manifesto tamen errore.

* *SILIQVASTRI* varietas triplex. * *Siliquastrum rotundum.* † *Cordatum,*
 ° *longum.*


*SILIQVASTRI TRI-
 PLEX VARIETAS.*

F O R M A.

Non admodum discrepat à præcedente nisi fructu. Est enim caule quadrangulo, sesquipedali, folijs Solani aut *Perficariæ*, nigrioribus, floribus candidis, pusillis Solani, exiguis foliolis, quorum centrum tenet asteriscus herbicus exiguus, deinde siliqua succrescit nitido virore & lætore, per maturitatem rubra & miniata, aut purpurea, quæ in alia planta longior & minus crassa, acuminatiorq; spectatur, in alia rursus multo breuior, turbinata, cordis effigie, interdum etiam exacte rotunda. Omnes eodem semine prægnantes deprehenduntur.

L O C U S.

Affertur cum priori ex *Goa* & *Calecutijs* oris in *Europâ*, ubi in hortis fictilibusq; vasis colitur, sic enim commodius transferri & hyeme, quæ huic inimica est, sub rectum deferri potest.



Q U A L I T A T E S.

Excalfacit vehementer ac pariter resiccat, ad quartum vtriusque qualitatis ordinem accedens.


V I R E S.

Utilitas & usus vnus & idem sôla figura discrepantium huiusmodi generum ad duros & frigidos tumores. Cutis fædationes delere ex melle illita produntur. Inscula & condimenta colore croceo & gustu piperis cômendat, sed abstinendum à nimio usu, nam malignû & venenosum quid obtinet, quo iocineri alijsque visceribus incommodat.*

CARYOPHYLLVS, Græcis, Καρυόφυλλον. Mauritanis, Persis, Turcis, Indis, Calafur. Hetruscis, Garofani. Italis verò cæteris, Garofoli. Germanis, Negelint. Hispanis, Clausos de espetia, siue Clauellos. Gallis, Girophles.

CARYOPHYLLI.

F O R M A.



Arbor, quæ Caryophillos profert, lauri faciem refert, folijs tamē angustioribus salicis, aut persicæ mali similibus, sensim per ambitū sinuatis, multis prædita ramis, floribus numerosis in primis cædids, deinde virescētibus, postremo verò rufescentibus, vsq; adeo odoratis, vt reliquos flores odoris suauitate superent, è quibus caryophylli proueniunt, qui nil aliud sunt, quā rudimentum fructus. Flores enim qui quaternis foliolis cōstant, huic fructus rudimento infidet, fibris numerosis refertus, perinde ferè ac Myrti flores. Proueniunt caryophylli in extremis ramulis. Myrti modo. Ad hæc pediculi, quibus caryophylli nituntur ij sunt, qui officinis vulgari idiomate appellantur Fusti. Nascitur autē arbor ipsa sponte ex decidentibus caryophyllis. Adolefcit intra octennium, perduratq; in centesimum annum vsq;.

L O C V S.

Nascitur magno prouentū tantum in Moluccis Insulis. Nam quāuis in Zeilan, & nonnullis alijs Indiæ locis proueniat arbor, nusquā tamen fructum edit, præterquā in Moluccis. Excutiuntur ibi flagellis, emundato prius circa arborem solo.

Q U A L I T A T E S.

Caryophylli calidi, & sicci sunt

ordine propemodum tertio, odorati, acres, subamari, non siue leuicula adstrictione. Itaq; roborant, aperiunt, incidunt, attenuant, digeruntq;.

V I R E S.

In cibis deuorati ventriculi, iocinoris, cordis, & capitis affectibus auxiliantur. In puluerem hausti ex vino austero & cydoniorum malorū succo, vomitiones cohibent, cœliacos iuuant, nauſeam remouent, & cibi appetentiā reuocant, roborantq; cum ventriculū, tum etiā caput. Frigefactum iecur belle excalfaciunt, olfacti auxiliantur animi deliquijs, mansiq; anhelitum cōmendant, conferunt comitialibus, resolutis, cōuulsis, stupidis, & veternoſis. cōcoctiōnem adiuvant, alui fluores torrefacti cohibent. Illinuntur quoq; per quā vtiliter cum mastice, rhoe, corallijs, & punicæ arboris floribus, ad ventriculi imbecillitatem. Exacuunt præterea oculorum aciem, & caligines tollunt, quinetiā nubeculas, & argemas in tenuissimū puluerem triti, & oculis inditi. Adduntur in Antidotis, & in fassis, qui ventriculo, & capiti roborandoparantur,

CARYO-

CARYOPHILLI flores domestici, nonnullis *Vetonicum*. *Italis*, *Garofori*, & *Garofoli*. *Germanis*, *Gräßblum*, *sive* *Reglinblum*. *Gallis*, *Ocillerz*, *sive* *Gros-floes*.

G E N E R A.

Math.

Varia sunt horum florum genera, colore, & foliorum stipatu differentia. Alij enim maiores sunt, alij minores, alij coccineo colore rutilant, alij saturata purpurantent, alij candido, alij carneo colore gaudent. Sunt, & versicolores nonnulli albo, rubroque colore mistim respersi, quin etiam spontè nascentes habentur cum rufescentes, tum albicantes.

F O R M A.

Idem.

Planta folijs est *Tragopogoni* modo longis, brevioribus tamen, carnosioribus, pinguioribusque, incurvis, & in acutum desinentibus: Caules edit numerosos, geniculatos, læves, cubitales, tribus, quatuorve in summitate adnatis, in quorum cacumina teres, longiusculusque calyx spectatur superiore parte serræ modo denticulatus, è quo flos speciosissimus oritur caryophyllorum odore præditus. Atqui flores in omni genere omnes serè stipantur numerosa foliorum serie, perinde ac rosa.

L O C V S.

Idem.

Seruntur à mulieribus, columtæque in scabulis, aut capillis ligneis transpositi, sæpiusque irrigati, super fenestras, ac etiam in hortos.

Q U A L I T A T E S.

Celida, siccaque pollere facultate hosce flores iudicio esse potest odoris fragantia, & huiusmodi amarulentia quædam.

V I R E S.

Idem.

Qui purpureo colore nitent præstant ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiam, paralytim, & convulsionem, ex *Betonica*, aut amaraci decocto poti. Ascrvantur siccharo, perinde ac rosæ, non solum ad prædicta omnia vires, sed etiam aduersus venena, venenosorumque animalium ictus. Dantur contra pestilentia contagia. Id quod *valentius* operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor unciarum pondere, ubi morbus inuaserit, liberat,



CARYOPHILLI sylvestres. Italis, *Garofani*, & *Garofoli saluaticchi*. Germanis, *Donnerneglin*. Gallis, *Armoiries*, & *Oeilletz sauuage*.

CARYOPHILLI FLORES
SYLVESTRES.



F O R M A.

Folijis, caulibus, floribusque *Matth.* exeunt altilibus similibus, sed longè minoribus, tenuioribusque, floribus cum rufescentibus, tum etiam albis, nullo tamen odore præditis.

L O C U S.

Proueniunt spontè locis in-*Idem.* cultis, & aridis, atque saxosis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Præstantij quoque ad ea om-*Idem.* nia, ad quæ atiles præstare diximus, verum longè remissius operantur.

H Y D R O-

HYDROPIPER Græcis, Ὑδροπέπερι. Italis, *Pepe aquatico, & Persicaria*. Germanis, *Wasserpfeffer / & Muckenfraut / & Schmersen*. Hispanis, *Hierua pexguiera, seu manchas*. Gallis, *Curage*.

**HYDROPIPER SEV
PERSICARIA.**

GENERA.

Matth. Duum est generum, alterum minus, alterum maius. Item alterum acri admodum sapore. Alterum verò omnis acridinis expers, & aspero tantum stringenti quæ gustu præditum.

FORMA MINORIS.

Diosc. Caulem edit geniculatum, solidū alis multis concavum. Folia menthæ maiora, molliora, candidioraq; gustu piperis acri, citra tamen ullam odoris gratiam. Fructum acrem, in surculis parvis, prope folia racematim coherentem.

QUALITATES.

Gal. 3. Calidum est sed non tantum, ut Piper. Incidit, extenuat, aperit, resoluit, exulcerat, discutit, & digerit.

VIRES.

Diosc. Folia cum semine illita, tumores, veteresq; duritias discutiunt, saggillata delent, quæ postquam iruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscuntur. *Matth.* Herba recens commodè thalamis sternitur, pulicibus necandis. Suillæ carnes salsæ, circumducta herba præservantur à tineis, & vermibus. Quare succus instillatus vermiculosis auribus, opem mirificam præstat.



PERSICARIA altera. Italis, *Persicaria magiore*. Germanis, *Flöhkraut*.

PERSICARIA ALTERA.



FORMA.

Eadem illi facies est, quæ *Matth.* alteri, nisi quod folia maiora sunt, & nigris maculis infecta, caules vegetiores humi accubantes, & racemi grandiores.

LOCVS.

Nascitur hæc non solum *idem.* humecto solo, sed etiam in sicco, in agrorum marginibus, & secus itinera.

QUALITATES ET VIRES.

Cum gustantibus manifestam relinquat adstrictionem: nec vlla sit acredine prædita, excalfacere perinde ac altera haud quaquam potest, sed potius refrigerare, ac siccare.

Z

PTAR.

PTARMICA, sine Sternutamentaria. Græcis, *Asperum*. Italis, *Ptarmica*. Germanis, *Dorant*/vel *Weisser spizer Meinfaren*.

PTARMICA.

F O R M A.

Matth.

Surculos habet tenues, sel-
quidodrantales, rotundos, &
circa eos folia oblonga, oleæ
modo atq; multa: & per ambi-
rum serrata. Flores mittit in
cacumine anthemidis figura,
minores tamen & umbilico
dilutiores. sapore aded acri, ut
non desint qui pyrethrum
eam faciant.

L O C U S.

Idem.

Nascitur sponte in monti-
bus, saxosis locis.

Q U A L I T A T E S


Ptarmicæ flores ciendæ
sternutationis vim obtinent,
est enim temperies eius cali-
da, & sicca, viridis etiamnum
ordine secundo, siccatæ ter-
tio.



V I R E S.

Folia cum floribus illita, siccillationes rapiunt. Flores sternutamentu-
cacissimè mouent.

PTARMICA ALTERA.



Sunt qui plantam, cuius hic
imago spectatur, Dioscoridis
Ptarmicam faciunt: sed re vera
falluntur.

PSEVDOSTRYTHIVM, quidam Theriacariam vocant. Germanis, *Stendtraut*.

PSEVDOSTRYTHIVM.

F O R M A.

Matth. Folia profert longa, subpinguia, caules multiplices, foliosque, in quorum summitate spicati prodeunt flores. Radice nititur candida, longa, digitali crassitudine, & raphani modo acri,

L O C V S.

Idem. Nascitur incultis locis, secus itinera, & in agrorū marginibus.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.


Idem. Radix excalfacit, & siccat ordine tertio. Incidit, attenuat, resoluit, aperit, digerit. Sunt etiam, qui eam præferant contra venenosorum animalium ictus, non modo vulneri admotam, sed etiam in potu sumptam. Quinetiam aduersus pestilentie contagia.



CYCLAMINVS, Græcis, Κυκλάμινος. Mauritanis, Buchomariën. Officinis, *Cyclamen*, *Panis porcinus*, & *Arthanita*. Italis, *Pan porcino*. Germanis, *Schweinbrot*, & *Erdöpfel*. Hispanis, *Pan de Puerco*. Gallis, *Cyclamen*, seu *Pain Porcin*.

CYCLAMINVS.

FORMA.



Folia habet hedere aduersa **Diosc.** parte purpurea, in quibus supra, infraq; albicant maculae, caules nudos palmari longitudine, floribus in eorū summitate purpureis, coronatis prominere quodam è medio apice, odoris iucundi, radice **Matth.** nigra sessili aliquantum lata, rapi ferè effigie.

LOCVS.

Nascitur vmbrosis locis, & **Diosc.** maximè sub arboribus, & in **Matth.** fructetis, secus itinera.

QUALITATES.

Varias vires obrinet, nam **Gal. li. 8.** abstergit, incidit, venarum o. **simp. me.** ra aperit, attrahit, digerit, de- **Matth.** tergit, & prouocat.

VIRES.

Radix tā hausta, quàm cli- **Mesues.** ftere infusa lentā pituitam mi **Diosc.** rificè detrahit. Coli cruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excremētis. Succus in errhinis additur ad expurgandū cerebrum. Finit enim diuturnos capitis dolores, ac etiā Hemicranios: resolutis opitulatur, ac omnib⁹

cerebri, & neruorū affectibus, à frigiditate abortis. Aqua è cyclamini radicib⁹ **Matth.** distillata si naribus sursum trahatur, fluentem inde sanguinem mirū in modum sistit. eadē pota sex vnciarū pondere, admista sacchari vncia, manantē è pectore, aut ventriculo, aut iocinore sanguinē mirificè cohibet. contusæ radices recentes illinuntur vt iliter scyrrhosis, durisq; tumorib. & strumis: additur quoq; succus cōmodè in vnguentis, quē ad splenis tumorē duritiemq; parant. affricta recēs radix hemorrhoidas eijcit, earundē succus aurib. instillar⁹ vnā cū rosaceo, aut vini modico, aurib. sonos, & surditatē tollit. Abdomini illit⁹ vētrē subducit, illita radix serpentū ictib⁹ auxiliatur. Eadē excanata, oleo replet, & addito cere momēto, cineri feruenti imponitur. Coquiturq; vnguentū ad perniones vtile.

* CYCLAMINVS longiusradicatus, Græcis, κυκλάμινος μακροῦ ῥιζος.


CYCLAMINVS MACRORRHIZOS.

FORMA.

Folijs prouenit alterius, hederaceis maculosis, & flores quoque similes promit colosfinos, radice verò differt, quæ infima parte rotunda quidem est, sed superius gracilescit & in longitudinem mire sursum versus protenditur.

LOCVS.

In monte Saleua Galliz, & alibi etiam inuenitur. *



DRACUNCULVS maior. Græcis, Δρακόνιον ἢ δρακονία μεγάλη. Arabibus, Luf, ſive Alluf. Officinis, *Serpentaria maior*. Italis, *Dragonæa*, & *Serpentaria maggiore*. Hiſpanis, *Taragontia*. Gallis, *Serpentine*.

DRACUNCULVS MAIOR.

G E N E R A.

Tria Dracunculi reperiuntur genera: Maior, Minor, Aquaticus.

F O R M A M A I O R I S.

Maior, caulē habet rectum, bicubitalem, lænem, baculi crassitudine, versicoloribus, serpentium maculis, purpureis tamen pluribus, folia rumicis sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit racemosum coloris primum cineracei per maturitatem verò crocei, in purpurā vergentis, radicem habet prægrandem, rotundam, candidam, tenui cortice obductam.

L O C V S.

Gignitur in vmbrosis, præsertim circum sepra.

Q U A L I T A T E S.

Quiddam Aro persimile obtinet, tum radice, tum folijs, verum acrius est, & amarior, ac proinde magis calfactoriæ, & subtilium partium, quin etiam leuiter adstringit.

V I R E S.

Radix cruda, coactæ delingitur ex melle vtiliter anhelosis, astmathicisq; quin etiam conuulsis, tussientibus & destillationibus obnoxijis: ex vino pota venerem stimulat, vlcera, quæ cacoëthe vocantur, & phagædenica expurgat, præsertim cum bryonia. fiunt collyria ex ea, & melle ad fistulas, & partus euocandos: illinitur cum melle efficaciter ad vitilignes: polypos, & carcinomata absumit. succus præstat ad oculorum nubeculas, albugines, atq; caligines. idem ex oleo infusus aurium doloribus medetur. á vipera feriri non posse affirmant, qui folia, aut radicem manibus affricuerit.

* C E N S V R A.

Peritiores omnes putant hanc Iconem esse ficturiam; & forsitan ex serpentaria aliqua conflatam. *

DRACUNCVLVS minor, Græcis, *Δρακοντία μικρά*. Italis, *Dragontea, & Serpentaria minore*. Germanis, *Klein Dratterwurk*. Gallis, *Petite Serpenteaire*.

DRACUNCVLVS MINOR.

F O R M A.

DIOSC. Folio constat hederaceo magno, candidis maculis insignito, caule recto, bicubitali, versicolore, purpureis maculis resperso, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule è vagina quadam externa parte herbacea, interna verò nigricanti purpura infecta, corniculi speciem præ se ferens exoritur, qui tandem fracto corniculo in racemi, vixve modum emergit, feruenti, ac mordaci gustu, radice nititur rotunda, bulbosa, acri, tenui libro obducta.

Matth.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in sepibus umbrosis.

Q U A L I T A T E S
E T V I R E S.

Idem. Iisdem pollet viribus, quibus maiorem pollere diximus. Peculiariter autem folia caseum à putredine defendunt, qui ijs inuoluitur. Estur radix cruda, coctave placentarum loco in conuiuijs cum multo melle in Balearibus insulis.



* DRACUNCULI folia nouella cum radice.

F O R M A.



Cognosci potest ex hac Icone varietas & mutatio foliorum radicumque Dracunculi. Dum enim plantæ adhuc nouellæ sunt, radicula ipsarum oblongæ aliquantum sunt vt Ari, folia primo exortu conuoluta prodeunt, simplicia, sine adnatis, mox appendices annectuntur geminæ, vbi ipsa pediculo coniunguntur, nec mutantur porro sed ætate subinde flaccidiora redduntur, donec eo ipso anno autumnii initio penitus cõcidant. Sed temporis processu auctæ radices protrudunt vere caules maculatos pluribus folijs donatos, initio quidem complicatis & non in plura diuisis, sed vt plurimum quasi tribus, quorum inferiora bina parua, medium grandius sit, composita, sed paulatim augetur horum numerus, inq; plures partes di-

uiduntur ipsa folia vbi fructus efformari incipit, vt ex præcedenti imagine apparet. Radicum aduulteriorum quoq; quibus pusilli fœtus copiose annalcuntur, diuersitas multiplex obseruari potest, interdum enim rotundæ, interdum oblongiores, interdum quadrangulæ propemodum inueniuntur. vel aliter etiam effigiatæ. *

DRACUNCULVS aquaticus. Italis, *Serpentaria aquatica*. Germanis, *Wasserwurk*.


DRACUNCULVS AQUATICVS.

FORMA.

Folijs exit corni arboris similibus, radice arundinacea, geniculata, longa, & Arimodo feruens. insuper ex geniculis ipsis numerosæ exeunt fibræ, quibus pertinaciter humi inhaeret: à radice folia prodeunt oblonga, è quorum exortu alia exurgunt longis pediculis nitentia, sed ijs grandiora, tenuiora que habentur, è quorum nonnullis, quæ conclusa sunt, fructus racematim enascitur. baccis per maturitatem rufescentibus, in quibus semen est nigrum, paruum, & oblongum, crasso quodam succo obductum.

LOCVS.

Nascitur in montanis locis, sed humectis, & palustribus.



FACULTATES, ET VIRES.

Non differt viribus ab Aro, & alijs Dracunculi generibus, sed facultate medicilliore habetur.

DRACUNCVLVS hortensis, Italis, Dragoncello, & Dragone. Gallis, Targon.
Germanis, Dragen/oder Dragonzell.

DRACUNCVLVS HORTENSIS.



FORMA.

Caules fundit numerosos, *Matth.* tenues, in quibus folia exeunt longa lini modo, acri-admodum gustu: radicibus cohaeret humi repentibus. floribus pusillis, albicantibus, racemosis semine superuacuo.

LOCVS.

Seritur in hortis ferè & *Idem.* mnibus.

QUALITATES ET VIRES.

Cum insigni acrimonia *Idem.* planta tota sit praedita, haud verendum est quin valenter excalfaciat, atque siccet, incidat, digerat, aperiat, & prouocet: mansa pituitam ciet: detrium dolores mulcet: concoctionem adiuuat, & vrinas mouet, Estur passim in acetarijs vnà cum lactucis, alijsq; oleribus.

OPHIO-

OPHIOGLOSSVM, Græcis, ὀφιογlossον. Italis, *Lingua serpentina*, Argentina, *serbherba Lucciola*. Germanis, *Natter Zünglin*. Gallis, *Herbe sans chousture*, *serpLangue de serpent*.

OPHIOGLOSSVM.

FORMA.

Matth. Vno tantum prouenit folio pingui, plantaginis aquatica quadantenus simili, nulla per medium excurrente costa: è cuius inferiore sinu, cauliculus exit, pallidam, serpentis modo, in summitate ligulam gerens, unde illi nomen.

LOCVS.

Idem. Nascitur in pratis. sed ocysimè deperit, cum tantum mense Maio perduret & appareat.

QUALITATES

Idem. Exiccat, citra insignem caliditatem.


VIRES.

Idem. Recentia folia vulnera mirifice glutinant, & enterocelas sanant. Maceratur in oleo, quo diutius insolato, vtuntur chirurgici commodissimè ad prædicta. Datur potanda ex aqua equiseti ad intrinseca vulnera auxiliatur sanguinem reiicientibus, pota ex aqua foliorum quercus albarum excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illinitur recens cum adipe gallinaceo ad vulnerum inflammationes.



ARVM. Græcis. *ἄρον*. Mauritanis. *Iaurus*, *sive Sara*. Siris. *Lupha*. Officinis. *Aron*
sive Serpentaria minor. Hetruscis. *Gigaro*. Germanis. *Klein Statterwur*. Aron,
 Deutscher Zunder. Hispanis. *Taro*. Gallis. *Vit de chien*.

ARVM.



CENSURA.

Duum est generum: maius, & *Matth.*
 minus.

FORMA.

Hederaceis provenit folijs, *Idem.*
 sed magnis, dracunculi magni-
 ribus, minimè dissectis, & solo-
 sis: caulem edit dodrantalem,
 è cuius fastigio erumpit folli-
 culus in acutum desinens, in
 quo fructus reconditur soli-
 dus, pistilli faciem referens, au-
 reo colore: in cuius infima par-
 te crocea quedam veluti semi-
 na spectantur: quæ deinde aci-
 nosa fiunt & per maturitatem
 rubescunt, botrûq; circa cau-
 lem efficiunt: frumenti Indici
 modo. Radix subest alba, bul-
 bosa, oblôga, acerrimi gustus.

QUALITATES.

Terrena essentia cõstat, sed *Gale. 8.*
 calida, proinde extergedi vim *simp. me.*
 possidet, verum nõ valentem,
 veluti draconium: est itaq; in
 exiccando, calefaciendoq; pri-
 mi ordinis. Abstergit, incidit, *Matth.*
 attenuat, digerit, & aperit.

VIRES.

Radix, semè, & folia dracunculi


culi vires habent. Priuatim autem radix ex simo bubulo podagris viliter illi-
 nitur. Decocta radix, melleque excepta, medetur pituitosis pectoris morbis.
 quare asthmaticos maximè iuvat. Datur elixa, vel ferventibus cineribus tosta
 ex amygdalino oleo viliter tussientibus. Id quod commodius præstat lac, in
 quo ipsa fuerit incocta. Elixia subijcitur oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus
 viliter illinitur. Radicis succus exedentia, & contumacia vlcera sanat: semen
 drachmæ pondere potum, menses, & secundas pellit.

CENSURA.

Nescio sanè qua ratione scripserit Galenus, Arum, quo degustato os totum
 exurit, & acerrimam sentitur, calidum, succumq; ordine tantum primo haberi.

PISTIL-


DISTILLVM referens Ariflos, & eius radix vegetior.



ARVM minus, Græcis, *ἄρον μινός*. Italis, *Gigaro minore*.

ARVM MINVS.

FORMA.



Folijs exit sagittæ imaginem *Matth.* præferentibus, caule recto, glabro, dodrantali, botrum in cacumine habenti, rubentibus baccis stipatum, in acutum desinentem: Radices sunt tenues, numerosasque, è quibus bulbosi quidam globuli fabarū magnitudine dependent, gustu per quam acerrimo.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

Idem.

QUALITATES ET
VIRE.

Excalfacit, & siccat ordine quarto: Ideoq; vrit, attenuat, incidit, & abstergit. Sunt qui radicū farina vtantur ad arceudos à suis mensis parasitos, & voraces lurcones; eandem delicatis cibis admiscen-

tes: nam vbi fauces occupauerit, tam vehementi, ac contumaci ardore afficit, ne post hac quicquam vorare queant, nisi lacte bubulo diutius gargarizato, aut recentii butyro sensim delincto.

BONVS

BONVS Henricus, Italis, *Herba infarinata*. Germ. *Schmerbelsine* Gut. *Heinrich*.

BONVS HENRICVS.

FORMA.

Matth. Planta candicat tota perinde ac si tenuissimo farinæ polline conserpta esset: quin etiam tactu, ad eò levis percipitur, ut vngue aliquo peruncta videatur: Folia habet Ari quadrantenus similia, caules plures, foliosos, in quorum fastigijs racemosi emergunt flores; Radicem habet vegetam, crassam, multifidamque: croceo colore, acuti lapathi modo: cuius speciem esse censemus.

LOCVS.

Idem. Nasclitur sponte ferè ubique in pagorum plateis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, siccit, aperit, abstergit, resoluit, & digerit.

VIRES.

Idem. Præfertur ad venenosorum animalium ictus: Radicis succus illitus, scabie sanat, & cutis maculas extergit, præsertim, si cum aceto misceatur.



ARISARVM, Græcis, *Asplagov*. Italis, *Arisaro*. Germ. *Klein Aron*.

ARISARVM.



F O R M A.

Folijis provenit Ari, longè *Matth.* tamen minoribus: cauliculum edit tenuem, in cuius summitate vaginula quædam oritur, altera parte diuisa, è qualigula tenuis, exigui germinis modo se se exerit, pallido colore. Radix illi oliuæ instar magna, oblonga, candicans, adnatis pluribus vbiq; emergentibus.

L O C V S.

Nascitur in collibus, & cam- *Idem.* pestribus.

Q U A L I T A T E S.

Acrius multò Arisarum, *Gal. 6.* quàm Arum est. *simp. me.*

V I R E S.

Radix illita, nomas sistit: si *Diosc.* unt collyria ex ea ad fistulas efficacia: illitu radice, genitale animalis cuiusq; in perniciem agitur.

Aa

ARI.

ARISARVM alterum: sine Pseudo arisarum. Italis, *Arisaro falso.*

ARISARVM ALTERVM.

F O R M A.

Matth.

Folia mittit longa, angusta, longis pediculis nitentia: radicem bulbosam, iuglandis magnitudine, numerosis vbiq; adnatis fibris, gustu etiam acri.

L O C V S.

Idem.

Nascitur frequens in agro Romano.


Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Excalfacit radix, siccatur, incidit, abstergit, digerit, & aperit.

* A P P E N D I X.

Non omnino segregari potest à speciebus Arisari cum gustata radix satis prodatur acridine suam, id quod ipsemet auctor fatetur paulo supra, in descriptione huius plantæ; licet idem pro falso Arisaro habeat.*



HASTV.

HASTVLA REGIA, Albicum, Asphodelus mas, Græcis, *Ασφodelos*. Mauritanis, Cheunce, Birnach, seu Axeras. Italis, Anfodillo. Germanis, Affodillwurk. Hispanis, Gamones, seu Gamonites. Gallis, Aprodiles.

HASTVLA REGIA, SEV ASPHODELYS.

FORMA.



Planta est à radicibus folio- *Matth.*
sa: folijs porraceis, carinatis,
caulé edit cubitalem, & sæpe
maiorē, insigniter leuem, flo-
res in cacumine albicantes, &
quandoq; melinos, numero-
sos, in stellę modum; è quibus
baccę proueniunt subrotun-
dę, herbacci coloris, semine
intus nigro triquetroq;: Ra-
dicibus nititur numerosis, ni-
gricantibus, bulbosis, oblon-
gis, virescēte intus pulpa, ima
parte vētricosis, & in tenuem
caudam desinentibus, succo-
lis: gustu acri, atq; amaro.

LOCVS.

Nascitur in montibus pin- *Idem.*
gui solo.

QUALITATES.

Radix extergentis, & discu- *Gal. 6.*
tientis est facultatis; vltę au- *simp. me.*
tem cinis calidior, & desiccā-
tior, subtiliorq; est, & ad dige-
rendum potentior.

VIRES.

Radices epotæ vrinæ, & *Diosc.*

mentes ducunt: auxiliantur à serpente demorsis trium drachmarum pondere
hantę, sed tota planta ex vino morsus illinire oportet. valent quoq; ad sordida,
& depascētia vlcera; mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercu-
la, forunculosq;. Radicis succus per se, prodest ad purulentas aures: in contrari-
am aurem infusus, dentium dolorem mitigat: cinis è radice illitus, pilos, capil-
losq; in alopecij replicat. oleum in excauatis radicibus feruēfactum, pernio-
nibus, & ambustis medetur: in auribus distillatum, surditati auxiliatur. Semen
in vino potum scolopendrę & scorpionum venenis mirum in modū resistit. *Matth.*
nuntur vtiliter radices in aceto decoctę lichenosis, scabiosisq;: crispantur quoq;
capilli abrafo capiti affricta sæpe radice, decoctę & illitę parotidas sanant.

* ASPHODELVS foemina siue luteus, *Iphyum* Theophrasti quorundam sententia, aut aliorum, *EriZambach* Arabum. Germ. Gelb Asphodillwurk.

ASPHODELVS FOEMINA.

F O R M A.

Folia multo angustiora quam albus, & Cypero ferè similia, striata saturatè virentia promittè radicibus multiplicib. longis, minus tuberosis, per laterales fibras sese vndiq; propagantibus, colore luteolis, Caulis hinc emergit cubiti altitudine, rectus, rotundus, in quo flores crebri lutei, fastigiati, stelliformes, gignunt semen nigrum triquetrum, subrotundis capitulis inclusum.

L o c u s.

Hortis est familiaris. Spontè natus quod sciam non reperitur.*



BULBVS

BULBUS vomitorius, Græcis, Βίλβος *vomitivós*. Mauritanis, Zir. Italis, Cipollacina.

BULBUS VOMITORIVS.

FORMA.

Folia habet esculento bul- **Diosc.**
bo multò latiora, & longiora,
radicem similem, nigro obdu-
ctam in uolucro.

LOCVS.

Nascitur cliuosis locis. **Matth.**

QUALITATES.


Calidioris est temperatu- **Gal. 8.**
rà, quàm bulbus esculentus. **simp. me.**

VIRES.

Radix mansa, aut decoctum **Diosc.**
eius potum, vesicæ malis me-
detur. vomitiones mouet.

* APPENDIX.

Videtur depinxisse autor
Bulbi Vomitorij loco ob odo-
ris, quem spirant flores, præ-
stantiam familiare Turcis di-
ctum Muscari, ideoq; hoci-
psum hic expressimus.*



SCILLA Græcis, Σκίλλα Arabibus, *Hassel, Hansel, Aschil, siue Alaschil.* Italia, *Squilla.* Germanis, *Meerzwibel.* Hispanis, *Cebolla albatrana.* Gallis, *Squille, cer-pentaire, siue Oignon marin.*

SCILLA.

FORMA.

Matth.

Bulbo nritur ingenti, subrubro, radicibus inferna sede numerosis: squamis crassis, lento succo prægnantibus, acri, & amaro, folia mittit aloes similia, caulem sesquicubitalem, læuem, & flores in summitate subpurpureos.

Locvs.

Idem.

Nascitur maritimo tractu.

QUALITATES.

Qualitatem admodum incidentem obtinet, non tamen admodum calidam, itaq; secundi ordinis exal-facientium fuerit: præstat autem, aut assam, aut elixam fumere, si enim virium illius vehementia exoluitur.


VIREs.

Diosc.

Interna scillæ pars in oleo feruefacta, rimis pedum vtiliter admouetur. decocta in aceto illinitur ad viperarum morsus: tosta, & odoratis medicamentis admista, haustaq; vrinam ciet, hydropicos, stomachicos, auriginosos, torminibus, & tussi vetere laborantes, suspiriosos, & reuomentes iuuat, tribus obolis ex melle sumpta, quin etiam comitialibus & resolutis auxiliatur. sed cauendus scil-

Pithago-ras.

læ vltus his, quorum intestina vlceribus afficiuntur. Scillinum quoq; acetum admirabilis est ad multa facultatis, si quis enim quotidie parum ebiberit, illi quidem faucium, orisq; partes nunquam male valebunt: os ventriculi bene-alebit: facile spiritum ducet: oculi acutissime cernent: flatu nullus in ventre excitabitur, & bene spirans, beneq; coloratus deget. hoc aceto qui vtitur cibum belle conficiet, etiam si licentiosius edat: nihil superuacui in corpore residebit, non flatu, non bilis, non cruditas, non stercus, non vrina, aliud lubrica omnino erit: Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, incipiens verò ac nouum perfecte discutit: ad podagras præterea, & ceteros articulares morbos, & ad iecoris, lienisq; duritias efficaciter facit.



CAPPARIS, Græcis, Κάππαρις. Arabibus, Cappar. Italis, Capparo. Germanis, Capren. Hispanis, Alchapparras. Gallis, Cappres.

CAPPARIS.

FORMA.

Aculeatus est frutex, qui in ter Diosc. ra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus habet in hami modum, aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, non nihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda. Radices spargit lignosas, grades, numerosasq;.

Locvs.

Tenui solo, asperisq; locis, in Idem. insulis, & iuxta rudera nascitur.

QUALITATES.

Radici cortex vincentem habet Gal. 7. qualitatem amaram, proxima acrem, deinde acerbam: quibus palam est, quod diuersis, & pugnantibus constet facultatibus. quippe abstergere, purgare, & incidere potest sua amaritudine, exalfacere vero, incidere, digerere, acrimonia: porro densare, constringere acerbitate.



terradici cortici fructus virium proportionem responderet, quin & folia, & caules, verum imbecillius operantur.

VIREs.

Fructus drachmis duabus in vino potus quadraginta diebus, lienem absumit, Diosc. & urinam pellit: bibitur vtilissime Ischiadicis, resolutis, conuulsisq;, menses ciet, & caput purgat: seminis, aut aridæ radici ex aceto decoctum; colluto ex eo ore, denique dolores mulcet. radicis cortex, vlcera vetera omnia, & sordida, callosaq; expurgat: lienosis, cum hordei farina vtiliter illinitur: cum aceto trita, albas viti ligines abstergit: Radix foliaq; intrita, strumas, ac duritias discutiunt, foliorum succus infusus aurium vermiculos enecat. Fructus in ciborum usum venit, sed parum alicui valet tam ad excitandam cibi appetentiam, & deradendam, deijciendamq; pituitam, quæ ventriculo inhæserit, & ad lienis, & icterici morbos.

* CAPPARIS Sylvestris seu Fabaginea vel Leguminosa, Pepleos quibusdam dicta, Auicennæ *Ardifugi vel Ardifrigi*. Rhafi *Andirian*. Alepi in Syria *Morgani*.

F O R M A.

Egregie virent huius plantę folia, Cappari similia sed minora & oblongiora, crassiuscula, bina vnico pediculo cauliculis teretibus, lenibusq; annexa & sibi inuicem opposita. Flores Capparibus conditis forma congruunt antequam aperiantur, foris herbidi, expansi vero albicant & intus rubent, è medio stamina lutea emergunt, his succedūt siliquę oblongę in quibus semina. Radix subest longa lignosaq;.


L O C U S.

Nobis peregrina est planta, nec nisi in hortis inuenienda. Sed Romę inter rudera sponte nasci perhibent.

V I R E S.

Vsurpatur ad vermes, tota enim planta grauis est odoris & saporis amari.*

CAPPARIS SYLVESTRIS.



LEPIDIVM, Græcis, *Λεπιδιον*. Mauritanis, *Saita regi*, *Hansab*, *Asceita regi*, siue *Scitharegi*. Italis, *Lepidio*, seu *Iberide*. Germanis, *Wilder Kress*. Hispanis, *Nasturtio montefino*. Gallis, *Passerage sauage*, siue *Nasturt sauage*.

LEPIDIVM.

FORMA.



Folia gerit nasturtij: vere *Diosc.* virétiora, caulem cubitalem, *Matth.* aut minorem, florem album, tenuemque. Semen circum summos tenuesque cauliculos in siliquis, nasturtij amulis, sed minoribus, minuto intus semine. Radicem albam, acri sapore.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, *sa- Democr.* xosis: in templorum areis, atque sepulchris, secus itinera, in ruderibus, & agrorum extremitatibus.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, magis *Matth.* quam nasturtiū extrahit, attrahit, incidit, attenuat, aperit, digerit, & vrit.

VIRES.

Præstat mirum in modū Ischiadicis, si cum Helenij radice, quarta parte ho- *Diosc.* zillinatur. Idem præstat contusa radix & cum salsa axungia illita, quaternis ho- *Democr.* ris. sed deinde in balneum descendere ægrum oportet, & locum cum oleo ungere; addita lana: herba licnosis admota prodest: eadem lepras eximit.

CENSURÆ.

Qui *Lepidium*, & *Iberidem* duas faciunt plantas, manifestè falluntur.

LEPIDIVM, Paulo Aeginetæ, & Plinio: posterioribus Græcis, *Aemidion*. Italis, *Piperite*, & *Peperella*. Gallis, *Passerage*, sine *Pojuree*. Germanis, *Pfeffer Kraut*.

FORMA.

Matth.

Caulibus cubitalibus fruticat, subalbicantibus: folijs lauri, maioribus tamē, robustis, floribus in cacumine spicatis, tenuibus, ac albicantibus. Radice alba, acerrimi gustu, perinde, ac folia, quę dentibus attrita os vniuersum accendunt.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, ac etiam quibusdam in locis sponte nascitur.

QUALITATES,
ET VIRE.

Idem.

Excalfacit & siccit vehementer, ac ea omnia potest, quę lepidium primum, cæterum longē valētius operatur.

LEPIDIVM.





RANVN-

RANUNCULVS, Græcis, *Βαρδαχον*. Italis, *Ranuncolo*, *sive Pie corbino*. Germanis, *Hanen Fuß*. Hispanis, *Terna belida*. Gallis, *Grenouillette*, *sive Basintz*.

RANUNCULVS.

G E N E R A.

Math. Sex nobis Ranūculi recensentur genera: de quibus inferius dicitur.

F O R M A.

Diosc. Folijs exit coriandrilatioribus, pinguibus, subalbidisq; floribus luteis, & interdū purpureis, caule gracili, cubitali: radice alba, exigua, amara, & ellebori modo fibrata.

L O C V S.

Idem. Nasctur in limitib. humidis.

Q U A L I T A T E S.


Gal. li. 6. Omnia facultatē vehementer acrem possident, adeò, vt cum dolore exulcerēt. Radix arefacta, sternutatorium est medicamētum, similiter alijs omnibus, quę vehemēter desiccant, & vt semel dicam, calida & sicca valde est, tum radix, tum vniuersa herba, adeò vt sua exiccatione, sicca radix dentes quoque frangat.

V I R E S.

Diosc. Folia, flores, & cauliculi recentes cuiuscunque generis, exulcerant illius, & crustas non sine dolore exciunt: quare scabros vngues eximunt: scabiē detrahunt, & stigmata delent: pensiles, & formicantes verrucas, alopeciasque paulisper illita, tollunt, repente decocto fouentur vtiliter perniones: sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus indita.

C E N S V R A.

Qui Ranunculum coronopum esse contendunt: ij sanè delirio agitantur.



RANUNCULUS SECUNDUS.

FORMA.

Ranunculus secundus, la-diosc.
nuginosior, hirsutior, quàm
primus est, longioribus cauli-
bus, & pluribus foliorum in-
cisuris.

Locvs.

Plurimus in Sardinia nasci- Idem.
tur, quàm acerrimus, quem
sylvestre apium appellant.

QUALITATES,
ET VIRES.

Apium risus quidā hoc ra- Matth.
nunculi genus appellauere,
quòd si herbā hanc, quispiam
in edulijs vorauerit, eius ner-
ui contrahantur, rictuque os
diducatur: vt grauissimi testan-
tur autōres, ita vt qui mortem
oppetunt, veluti ridentium fa-
cie intereant.

RANUNCV-



RANUNCULVS TERTIVS.

F O R M A.

Minoribus prouenit folijs,
floribus melinis: sed tota plan-
ta grauem spirat odorem.



RANV-

RANUNCULUS QUARTUS.

F O R M A.

Non est ab similibus tertio: fo DIOSC.
 lia tamen magis diuisa sunt: *Matth.*
 florem edit lactei candoris.
 Radices numerosas, fibrosas-
 que.

* L O C U S.

Nascitur in montibus, &
 in hortis, flores numerosiore
 folio luxuriant. *



RANUNCU-

RANUNCULVS quintus. Italis, *Pie di Gallo*. Germanis, *Drisfivurtz*. Gallis, *Piepou*.

RANUNCULVS QVINTVS.

F O R M A.


Matth. Foliamittitsecundi ferè similia, atque etiam hirtiora, radices albas, numerosas, elebori modo, inter quas medium occupat locum, tuberosa radix dependens, veluti ex funiculo, nucis iuglandis magnitudine, albicans rapido, sed acris, & exulcerans.

L O C V S.

Idem. Nascitur locis incultis, & secus itinera.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Excalfacit & siccat ordine quarto: vlcera, extrahit, incidit, digerit. Radix recens tusa & admota, vesicas excitat, quare ischiadicis vtiliter illinitur.



RANUNCULVS SEXTVS.

F O R M A.


Folia mittit anemonis primi similia : caules cubitales, striatos, flores in summitate magnos, aureo colore : radices numerosas, fibrosasq;.

L O C V S.

Nascitur in riguis, & hu- Idem.
meis locis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Cæteris minus est acris,
qua re minus exalfacit, &
siccat.



Bb

ANEMO-

ANEMONE, Græcis, *Ἀνεμώνη*. Italis, *Anemone*. Gallis, *Passe fleur*. Arabibus, *Iackaik*, *Alnahamen*, *Sakaik*, seu *Mamira*.

ANEMONE.

G E N E R A.

Matth. Plura habet genera, quorum quinque nos obseruauimus.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Folio prouenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulibus lanuginosis, renuib, striatisq; in quibus renuiora folia per interualla spectantur: floribus syluestris papaueris magnitudine, purpurascentibus, prominente umbilicotenus capitulo, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, perinde ac in papauere. Radix illi inest oleæ magnitudine, subrotunda, fibrataq; ac sapore acri.

L O C U S.

Idem. Oritur in aruis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Anemone omnes, acrem, *simp. me.* extergendi, attrahendi, & ora vasorum reserandi facultatem obuiant.

V I R E S.

Diosc. Succus cum foliorum, tum radice naribus infusus, caput purgat, commaducata radix pituitam trahit: decocta in passo, & illita, sanat oculorum inflammationes, cicatrices eorundem, & heberudines emendat: sordida ulcera abstergit. Folia, & caules, si cum prissana cocti edantur, lactis copiam præbent: & in vellere folia supposita, menstrua cient, & lepras illita eximunt.



ANEMONE secunda, Italis, Anemone secundo.

ANEMONE SECVNDA.



F O R M A.

Folijs provenit maioribus, *Matth.* frequentius laciniatis, cynoctoni aconiti modo; caulibus alterius similibus, sed aliquanto crassioribus, inanibus, & in rectum spectantibus, quibus flores insunt in summitate dilutiorē purpura nitescentes: capitulo circumquaq; comato: perinde, ac altera. Radicem habet breuem, rapunculi ferē figura, fibris adnatis multis: acris gustu.

L O C V S.

Nascitur locis cultis, & præ-*Idem.* fertim in arvis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Nihil suis in facultatibus à *Idem.* priore differt.

F O R M A.

Matth. Folijs est ranunculi primi
similibus, caulibus tenuibus,
sesquipalmaribus, rotundis,
in quorum cacumine flores
exerunt albi, ac diluta quadam
purpura nitescentes, inferiori
præsertim sede rosarum ma-
gnitudine, radicem habet fi-
bratam, actenuem.

L O C V S.

Idem. Nascitur in collibus.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Tota planta cæteris mitior
est, quare minus excalfacit, &
siccat.



ANEMO

ANEMONE QVARTA.


F O R M A.

Folia profert frequenter laciniata, flores in summitate caulis purpureos, radicem globosam, & parvam, fibris numerosis stipatam.

L O C V S.

Prouenit cultis locis.

Idem.



Bb 3


ANEMO-

* F O R M A.

Folijs prouenit ranunculi
ferè, sed tenerioribus, floribus
aureis, radice parua fabæ ma-
gnitudine.*


L O C V S.

Oritur cultis locis, & in aruis.



* ANEMO-

*ANEMONES diuersi flores.



Plurimæ species Anemones habentur aded vti ferè quibus peculiare depingat ab alio nõ obseruatas. Ideo non putauì superuacaneum fore, si reliquis, quas coactus fui subdere depictis ab autore nec dum à me cõspectis, adiungerem corollarij vice rariores hosce flores, quorum A. litera insignitus candidus est, & medio luteus, B. Cæruleus, C. aureus, D. Purpureus variegatus venis subrubris, E. Coccineus. Eorum vero stirpes cum radice nondum videri mihi cõtigat.*

PULSATILLA. *Italis, Pulsatilla.* Germanis, *Rüchen Schell*, seu *Hacket Krant*. Gallis, *des coquerelles*.

PULSATILLA.

F O R M A.

Matth.

Cum primum erumpit folia mittit incana, & admodum hirsuta, minutim laciniata, sapore per quam acris: flores prodeunt anteaquam folia emergant purpurei, nigricantes, atque hirsuti, caule rotundum, tenuem atque incanum. Radix illi subest pedali longitudine, exesa chamæleonis albi modo, sapore potius subdulci, quam acris.

L O C V S.

Idem.

Prouenit locis incultis, aridis, & saxosis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Folia, caules, & flores cum acerrimo sint gustu, excalfaciunt, & siccant ordine quarto: incidunt, attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant, & exulcerant. Radix verò cum subdulcis sit, non longè aberrat à temperatis.

V I R E S.

Idem.

Sunt qui radicem maximè præferant contra pestilentia contagia, & pora venena, & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur, drachmarum duarum pondere, quare in antidotis additur. Aqua è folijs distillata, vulnera sanat, & pora sudorem prouocat,



*PULSATILLA lutea. Galté Virginica.


PULSATILLA LUTEA.

F O R M A.

Folijs provenit minus lacinjatis quidem, sed cætera præcedenti similibus, flos Maji medio luteus subrubens summo cauliculo insidet, quem subsequitur semen papposum, barbaturque.

L O C V S.

Gaudet montanis, & in Helvetia frequens est in monte Gothardi.*



Bb 5

ANAGAL-

ANAGALLIS, Græcis, *Anagallis*. Ital. *Anagallo*, Officinis, *Morsus Gallinae*. Germanis, *Sauch-Heil*. Hispanis, *Muruges*. Gallis, *Murgelline*, seu *Mouton*.

ANAGALLIS MAS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Mas alterum, alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Planta est parua, humi iacēs, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis; floribus phæniceis; & paruo, ac rotundo semine.

L O C U S.

Matth. Nasctur in hortis, culto, ac læto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Admodum extergentis est fœsimp. me. cultatis, habet etiam quendam calorem attractorium: vis etiam mitigandi illi inest.

V I R E S.

Inflamationes arcer: adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet: succus gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem injiciatur: argemas cum melle commendat: prodest contra viperarum morsus, iocinoris, & renum vitia si ex vino bibatur.



ANAGALLIS femina, Græcis, ἀναγallis θύαλος. Italis, Anagallo femi.

ANAGALLIS FOEMINA.



F O R M A.

Nihil ab altera differt, nisi floris colore, qui in hac cæruleus, in illa phæniceus spectatur.

L O C U S.

Nascitur cultis, & incultis locis. Et sæpe in hortis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ut forma similes sunt, ita facultatibus, & viribus: peculiariter autem hæc, procidentem sedem admota reprimat: altera verò euocat, ut quidam volunt.

*ANAGAL-

* ANAGALLIS Aquatica, Germanis, Wasserbungen/Wachbungen. Gallis, Berle.

ANAGALLIS AQUATICA.

G E N E R A.

Distingui possunt potissim. duo eius genera, quamvis plura sint strictissimis folijs ab huius differentia.

F O R M A.


Primum genus recto caule attollitur, folijs oblongis, carnosis, & leuiter in ambitu serratis vestito, ex quorum sinibus enascuntur ramuli copiosis flosculis purpurascensibus ornati, quibus succedit semē minutū exiguis folliculis inclusum, radix est fibrosa, vt aliarum herbarum palustrium. Alterum supinū est, & repit, folia habet rotundiora & flosculos eleganter caruleos.

L O C V S.

Inuenitur in palustribus, & riuis gaudet.

F A C U L T A T E S.

Apud veterinarios magno est in vsu discutiendis tumoribus & scabie equorum sananda: in acetarijs sumpta stomacacem emēdat, calculos rumpit, vtiam cit, fœtus mortuos pellit, & menses euocat. Cum aceto & butyro tosta & imposita, ac subinde renouata, tumoribus quibusuis & ignibus sacris prodest.*



Succisa, Officinis, *Morsus diaboli*. Italis, *Morso di diavolo*. Germanis, *Teuffels
Abbiß*.

SYCCISA, SEV MORSVS
DIABOLI.

F O R M A.



Folijs constat plantagini angustifolię similibus, leuio-
rib. ramen, caulibus sesquicu-
bitalibus, in quibus minora
sunt folia per ambitum den-
ticulata, flores edit scabiosę
similes. Radicem habet pol-
licarem, sed succisam, & vel-
uti demorsam, à qua complu-
res oriuntur fibrę, ellebori
modo. *Matth.*

L o c u s.

Prouenit locis incultis, sal-
tibus, ac dumeris. *Idem.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Herba trita & admota, *Idem.*
præsentaneo auxilio, carbun-
culis pestiferis medetur, aut
si vinum bibatur, in quo in-
cocta fuerit. Radix per se, aut
vinum in quo efferbuerit po-
tum, non modo vteri do-

res mulcet, sed pestilentię contagia superat. Gusu admodum amara est: quare
exalfacit & siccat.

H E D I-

HEDERA, Græcis, *Kiados*, Maurita. *Cassus*, Ital. *Hedera*, seu *Lella*. Germ. *Wanzen*
 siue *Baum Ephen* siue *Ebiß*. Hispan. *Hedera*, seu *Eda*. Gallis, *Lierre*.

G E N E R A.

H E D E R A.

Diosc. *Hedera* differentias multas in genere sortit: summas aut genere tres, nã altera cãdida, altera nigra, & tertia, q̃ *Helix* appellat. Nos aut alterã maiorẽ, alterã minorem appellamus.

Matth.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Maior, quã arboreã vocant, nõ solũ in syluis excellas arbores scãdit, sed etiã antiqua edificiã, vrbiũ menia, sepulchraq; adẽ occupat, vt tandẽ suo artiori cõplexu, ea oĩa diruat, & vnã cũ ijs collabat: folijs suo exortu puenit oblõgis, q̃ dein de tẽporis tractu triquetra euadũt, lenuia, crassa, robustaq; Florere incipit ad finẽ Autumni, floribus muscosis, pallescentibus, è quibus racemosi hyeme nascũtur corymbi, bacis ligustrinis maioribus.

L O C V S.

Idem. Nascit in syluis, in cãpis, in hortis, & edificiõrum muris.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Ex cõtrarijs cõposita est facta. *simp. me.* cultarib⁹, habet. n. quiddã adstringẽtis substãtiẽ, quã terrenã & frigidã esse, cõstat: habet & nõ nihil acris, quã calidã esse, vel gustus cõprobat: nec deest tertia: aqueã namq; substãtiã quandã tepidã detinet, si viridissimã in sicca enim exhalauit.



V I R E S.

Diosc. Recetia folia ex aceto decocta, aut cruda, cũ pane detrita, lienes sanãt. Foliorũ, & corymborũ succus narib. infusus, cũ melle, pituitã deponit: valet idẽ contra veteres capitis dolores, si cũ aceto, & rosaceo perfundat: purulentis, aut dolentib. aurib⁹, cũ oleo medet: bacce quinq; trite, & in malicorio, cũ rosaceo feruefacta, si instillet oleũ in contraria aure, dolorẽ dentiũ mitigat: corymbi triti, ac subditi, menses mouet. Instillatus succus, putrida tãdia nariũ, graueolentiaq; emẽdat: Lachryma pilothrũ est. Illira pediculos necat. Foliorũ succus ex vino austero potus, lienosos sanat: consuta recetia folia, in pilei formã, papulosis ulceratisq; infantĩũ caputibus, vtiliter imponuntur.

Matth.

HED-

HEDERA minor, Græcis, Κισσός ἐλάξ. Italis, *Hedera minore*.

HEDERA HELIX, SIVE MINOR.



FORMA.

Folio exit triquetro, ac ma *Matth.*
culofo: farmentis albicanti-
bus, ac lignosis. Hæc humi
repat, & saxis hæret: fructu
nullo neque flore.

LOCVS.

Prouenit aridis & saxosis *Idem.*
locis, circa sepes, & saxa gran-
diora.

QUALITATES,
ET VIRES.

Potest ea omnia, quæ ma- *Idem.*
ior: sed inefficacior tamen
est.

HED-

HEDERA terrestris, Græcis, *Klavis xegraû* ©. Italis, *Hedera terrestris*. Germanis, *Grundreben*/siue *Gundeirben*.

HEDERA TERRESTRIS.

FORMA.

Longo hæc reptatu humi serpit, quadrangularibus funiculis, e quibus folia prodeunt rotunda, crispa, subaspera, & per ambitum serrata, flores edit in purpura albicâtes, pusillos: Radicibus tenuibus, e funiculorû geniculis prodeuntibus. Plâta rota amara est.

LOCVS.


Nascitur in opacis, circa semitas, vrbium muros, & in hortis.

QUALITATES.


Amaro gustu tota plâta est, quare abstergere, extenuare, aperireq; facile poterit.

VIRES.

Additur in potionibus quæ ad viscerum internorum vulnera parantur: succus cum æruginemistus, instillatur vtiliter cuniculosis vlceribus: Fit e folijs recentibus oleum, ijs in eo maceratis, diuq; æstate insolatis, admirabilis sanè facultatis tormina, & cæteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum infusum.



• HEDERÆ TERRESTRIS species montana.



F O R M A.

Viticulos profert vulgari
breniores : hirsutioresque,
folia circinata rotunditatis,
maiora, flosculi quoq; paulu-
lum rubescunt, & grandiores
aliquantum sunt quam in ea
quæ passim nascitur.

L O C V S.

Nascitur in Thuringia locis
montosis & opacis.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

E sapore odoreq; validioribus,
conijci potest omnia
valentius prestare posse hanc,
quam quæ in planitie prouenit. *

Cc

CHELY.

CHELIDONIUM maius, Græcis, *χελιδονία*, *Kauroch*, seu *Memiram*. Italis, *Celidonia maggiore*. Germanis, *Schelfraut*. Hispanis, *Celiduenæ*, siue *Terna delas golundrinæ*. Gallis, *Chelidoine* seu *eschlere*.

CHELIDONIUM MAIUS.**FORMA.**

Diosc. Caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliosis; folijs ranunculi, mollioribus tamen, & colore cæsis: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte, succo rotta planta madet croceo: qui mordax, & acris est, subamarus, & grauirer olens. Radix superne singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa, in qua semen recluditur.

LOCVS.

Matth. Prouenit propter sepes, in scrobium ripis, secus vias, inter rudera, & in muris, & parietibus.

QUALITATES.

Gale. 8. Extergentis admodum, &
simp. me. calidæ facultatis est, succus eius, & ad acuendum visum, commodus est: utque in quibus crassum quiddam, quiddam in pupilla colligitur digestionem indigens.


VIREs.

Diosc. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlcenibus, quæ serpunt imposita cum vino. succus oculorum claritatem affert.



CHELIDONIUM minus, Græcis, Χελιδόνιον μικρόν. Arabibus, Memiten. Hetruscis, Fauoscello, seu Celidonia minore. German. Feigwurz/Blatter Kraut/ seu Pfaffenhödlin. Hisp. Scrofolaria menor. Gal. Couilos de Prestres, seu petite eschlere.

CHELIDONIUM MINUS.



FORMA.

Folijis prouenit hederæ mi- **DIOSC.**
noribus, rotundiorib⁹, tene-
ris ac subpinguib⁹, humi ac-
cubantibus, sine caule: Radi-
ces habet ex eodē callo com-
plices, pusillas, in granorum
tritici modū acernatim con-
gestas, quarum tres, aut qua-
tuor in longitudinē exeunt.
Flores fundit luteos, tenuib⁹ *Matth.*
pediculis nitentes: Breui de-
perditur tempore: vere enim
& nascitur, & arescit.

LOCVS.

Nascitur vliginoso solo, **DIOSC.**
iuxta aquas, stagna, & lacus.

QUALITATES.

Cum acrius sit maiore, illi- *Gal. 8.*
tum celeriter cutem exulce- *sim. me.*
rat, itaque hæc herba quarti
ordinis iam absoluti, tum in
calfaciendo, tum in siccan-
do fuerit.

VIRES.

Succus eius per nares pur- *Gale.*
gat, utpote admodum acer. **DIOSC.**
Pforas, & scabros vngues eij-

cit: Decoctum eius ex melle gargarizatum, caput purgat. Idem facit succus ē
radicibus expressus; omnia pectoris vitia decoctum extrahit.

CENSURA.

Amentium cuculla digni sunt, qui Chelidonium minus, Vergilij Amellum
esse contendunt.

APPENDIX.

Chelidonium minus tamen si Dioscoridi, & Galeno aded sit acre, vt admo-
tum corpori celeriter exulceret, quod facile de eo credendū est, quod in Græ-
cia prouenit: cum tamen Italicum nulla sit acredine præditum, calidis, ac sic-
cis qualitatibus penitus destituitur.

AQVILINA, siue aquilegia, Italis, *Aquileia*, *Celidonia maggiore*, seu *Celidonia seluatica*. Germanis, *Ächelen*. Gallis, *Anchoties*.

AQVILINA, SEV AQVILEIA.

FORMA.

Matth.

Planta est fruticosa, folijs maioris *Chelidoni*j quadantenus similibus, subalbicantibus, per ambitum diuisis: caules edit numerosos, tenues, sesquicubitales. Flores in cacumine emicant purpurei, aut candidi, aut lutei, in stellæ modum radiantes, quatuor inferiori sede corniculis, concavis, & sursum reflexis, è quibus capitula suboriuntur melanthij modo, quæ nigrum, pellucidumq; concludunt semen.

LOCVS.

Oritur in montibus, syluosis locis, & feritur in hortis.

QUALITATES ET VIRE.

Semen drachmæ pondere potum ex Cretico vino, & croci momento icteritiam sanat: sed ægros subinde in lecto sudare oportet.



* Aqu

* *AQUILEGIÆ* flores varij.

Non tantum color diuersitatem parit multifariam in floribus hisce, sed & figura discrepare ijdem quotidie depræhendantur. Nam fœtura non solum multiplici flores densiores & nitidiores stipantur, aut colorum distinctiones nonnunquam in diuersis nonnunquam in vnico flore variæ commendantur, sed & diuersas sortiuntur faciès interdum, siue naturæ lusu siue artificio quodam, vt inuersi * flores propemodum videantur, aut degenerant † sæpiusculè & strigosiores apparent, & tum quidem aut colore languidiorè & quasi dilutiore spectantur, aut prorsus virorem induunt. *

CARYOPHILLVS Indicus, Italis, *Garofano Indiano*. Germanis, *Goldfarb D.*
flein vel *Indianisch Neglin*.

CARYOPHILLVS INDICVS.

G E N E R A.

Duo habet genera: Ma-
 ius, & Minus.

F O R M A M A I O R I S.

Matth.

Planta est fruticosa, cau-
 libus bicubitalibus, & quan-
 doq; maioribus striatis, re-
 ctis, subrufescentibus, è
 quibus numerosa prodeunt
 folia, tanacetum amula, sed
 maiora, & magis diuisa: flo-
 res è calice oblongo toroso-
 que ac longo pediculo ni-
 tentes exeunt aurei, ma-
 gni, numerosis admodum
 stipatis folijs, odore mi-
 nus quam in altero gra-
 uolenti, semine tenui, ob-
 longo, nigro: Radix illi est
 brevis, multifidaq;.

L O C V S.

Seritur in hortis, colitur
 in fictilibus, & arculis, spe-
 ctaculi gratia.



Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem.

Excalfacit, & siccatur, quo fit, vt in medicum vsus venire possit. vbi abstergere, extenuare, digerere, ac referare sit opus.

CARYOPHYLLVS Indicus minor: Italis, *Garofano Indiano minore.*

CARYOPHYLLVS INDICVS MINOR.



FORMA.

Flore tantum à maiore distat, quippe qui in hoc genere minorum spectatur bino, ter-*Matth.*
noque foliorum stipamento: color illi inest aureus, subnigricansque, & leui quadam purpura adumbratus, aspectu admodum iucundo, adeo quod ex oloferico, quod velut vocamus, à natura facti videantur: sed odore sunt graui, & qui caput feriat.

LOCVS.

Visitur passim super fenestras in fistilibus, atque etiam in hortis.

QUALITATES ET VIRES.

Excalfacit, siccat, attenuat, incidit, & abstergit, ac aperit valentius, quàm maior.

Cc 4

AVRI-

AVRICVLA muris, Græcis, Μυρὸς ὀνόρ. Italis, Orecchia di topo. German. Mitter Mangoldt mit blawen Blummen. Hispanis, Oreja de ratton. Gallis, Orelge de ratte.

AVRICVLA MVRIS.

F O R M A.

Diosc. Planta est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imò rubentibus, & concavis, folijs angustis, oblongis, dorso acuto, ac elevato, nigricantibus, per intervalla assidue germinatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus, flosculo, vt anagallidis, cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata.

L O C V S.


Matth. Oritur in pratis, in campis, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Desiccatur ordine secundo:
simp. me. cæterum nullam evidentem caliditatem possidet.

V I R E S.

Diosc. Radix illita ægilopas sanat.



ISATIS

ISATIS domestica, siue Glattum, Græcis, *ισάν η̄νεπος*. Italis, *Guado domestico*. Germanis, *Weid*. Hispanis, *Pastel*. Gallis, *Gueda*, seu *Pastel*.

ISATIS DOMESTICA.



F O R M A.

Folia profert plantagini si- *Matth.*
milis, verum pinguiora, ni-
grioraque : caulis illi est bi-
cubitalis, floribus in summi-
tate numerosis, parvis, tenui-
busque, aureo colore.

L O C V S.

Seritur passim in campis ad *Idem*.
lanificia cæruleo colore infi-
cienda.

Q U A L I T A T E S.

Facultatis est valenter exic- *Gale. 7.*
cantis, nondum tamen mor- *simp. me.*
dientis: est etiam simul ama-
ra, atque adstringens.

V I R E S.

Illira folia tumores omnes *Diosc.*
discutiunt : cruenta vulnera
glutinant : sanguinis proflu-
via sistunt, ignem sacrum, ex-
edentia, putrescentia, ac ser-
pentia vlcera sanant.

Cc 5

ISATIS

ISATIS sylvestris, Græcis, *ισάνης άγία*. Italis, *Guado saluarico*. Germanis, *Wilde Weide*. Gallis, *Pastel sauvage*.

ISATIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia fert maiora, lactuæ proxima : caules tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes, in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum faciem referentes, in quibus semen: flore luteo, tenui.

L O C U S.

Matth. Nascitur in campestribus, incultis locis, & in pascuis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Manifestè iam acre quid-
simp. me. dam tum gustu tum actione præfert, proinde valentius quàm satiua desiccatur. atq; valentius humidis putredinibus resistit.


V I R E S.

DIOSC. Eadem quæ & supradicta præstat, potu, & illitu lienosis auxiliatur.



TELEPHIUM, Græcis, τηλεφίον. Italis, Faua grassa. Gallis, Reprise: Ioubarbe des vignes. Germanis, Knabenkraut, Wundkraut, Setthenne, Schmerwurzel.

TELEPHIUM SIVE FABARIA.



FORMA.

Folia promit portulacæ si- Diosc.
milia, quin etiam caules non
abfimiles; alas binas in singu-
lis foliorum geniculis, anne-
ctit. Ramuli à radice seni, se-
ptémve prodeunt, folijs re-
ferri cæruleis, crassis, lentis,
carnosis, flore luteo, aut can-
dido.

LOCVS.

Nascitur in cultis, & maxi- Idem.
mè inter vites. Quin etiam Matth.
saxosis locis, in tectis, & anti-
quis parietibus.

QUALITATES.

Telephium exiccantis, ex- Gal. 8.
tergentisq; est facultatis, non sim. me.
tamè insigniter calidæ: verum
in hoc forsità quispiam ipsum
primi esse ordinis censeat: de-
ficcat tamen secundo ordine
intenso, aut certe principio
tertij.

VIRES.

Telephij folia senis horis illita, vitiliginem sanant, sed postea locus hordea- Diosc.
cea farina illini debet: peruncta ex aceto in sole, idem quoq; præstant, sed vbi
inaruerunt, absterguntur.

APPENDIX.

Fabaria Telephij notas omnes habet. verùm de viribus dubitandum est.

* TELEPHIUM vel Crassula purpureo flore. Germanis, Knabenkraut
Weibse.

TELEPHIUM.

FORMA.

Parum discrepat ab altero; teneriores tamen sunt & magis rubent cauliculi. Folia quoq; non ita cærulea sunt, & flosculi suavi purpura rubent. Radice nitur paulo minore quam præcedens.


LOCVS.

Nascitur multis locis in Germania, præsertim montanis & opacis ad Rhenum.*



AGARICVM, Græcis, *Azazindr*. Maurit. *Garicum*. Italis, *Agarico*, & *fungo di larice*. Germ. *Dammen Schwamm*. Hisp. *Agarico*. Gall. *Agaric*.

AGARICVM.



si sic auxiliatur: si urina ægrè excernatur, si vuluæ strangulatus urgeat, si pallor in corpore adsit, drachmæ pondere dari solet. Tabidis ex passo, lienosis ex oxymelite vtiliter propinatur. Manliur ac postea deuoratur siccus vbi ventriculus cibi tenax non sit, & acidos mittat ructus: sanguinis reiectiones sistit tribus obolis ex aqua haustus: menses ciet; & vteri inflationibus medetur. Alium purgat, & vtramque bilem, & pituitam pellit: venenorum antidotum est. Serpentiū venenosorum moribus mirificè auxiliatur, tribus obolis ex vino sumptum. Verum agarici proprium est, cerebrum, neruos, & omnium sensuum organa expurgare, pulmones & pectus, à lentis, crassisque & putrescentibus excrementis detergere, atque contumacem materiam omnem in articulis existentem exoluere. Resolutis, stupidis, comitialibus, vertiginosis, diuturno capitis dolore affectis, omnibusque quibuscunque morbis ab infarctu proueniētib; mirum in modum auxiliatur. Recensetur quoque inter medicamenta, quæ ad cordis affectus prestare dicuntur.

GENERA.

Duo eius habentur genera, Mas alterum, alterum Formina.

FORMA.

Fungus est in Larice nascens, non Dioscotamen vna & eadem semper mole proueniens. Qui autem formina vocatur rotundior, cãdidior, friabilior, leuiorq; habetur, quin etiam primo gustu dulcis, mox amarus percipitur, & facie summa rimosus spectatur. Mas verò, qui rotundior habetur, cum compactior, durior, villosior, lignosiorq; sit, inutiles putatur.

LOCVS.

Nascitur plurimum in Tridenti- norum montium syluis, vbi larices arbores crescunt.

QUALITATES.

Is primo quidem gustu (vt prædiximus) dulcis, sed paulò post subamarus percipitur, acrimoniæ ac leuiculæ adstrictionis particeps, quin etiam laxa cõsistentia præditus, quibus omnibus palam est, quòd compositum sit ex aërea ac terrea substantia à caliditate extenuata. Hac itaque ratione & digerendi & calfaciendi vim habet, & crassitudinem incidendi, tum viscerum infarctus expurgandi.

VIRES.

Efficax est contra tormina & cruditates: prodest contusis & ab alto deuolutis: istericis, hydropicis, supspiroicis, iecinorosis, nephriticis mirificè auxiliatur: ietericis, hydropicis, supspiroicis, iecinorosis, nephriticis mirificè auxiliatur, tribus obolis ex vino sumptum. Verum agarici proprium est, cerebrum, neruos, & omnium sensuum organa expurgare, pulmones & pectus, à lentis, crassisque & putrescentibus excrementis detergere, atque contumacem materiam omnem in articulis existentem exoluere. Resolutis, stupidis, comitialibus, vertiginosis, diuturno capitis dolore affectis, omnibusque quibuscunque morbis ab infarctu proueniētib; mirum in modum auxiliatur. Recensetur quoque inter medicamenta, quæ ad cordis affectus prestare dicuntur.

RHABARBARVM, Italis, *Reobarbaro*.

RHABARBARVM.

FORMA.

Caule prouenit à radice breui, sed crasso, è quo circumquaque folia numerosa exeunt, ex angusta origine, in amplum desinètia, deorsumq; spectantia, lanugine quadam per ambitum obducta. Hæc dum adolescunt viridia, adulta verò lutea spectantur. E medio foliorum stipatu cauliculus assurgit, qui summo fastigio flores mittit cæruleos: odore acuto simul, & graui. Radix pedale longitudinem superat, colore ex rufo nigricante. Crassitudo radice non omnibus plantis eadem inest: verum quæ ad summam crassitudinem excreuerunt, humani cruris molem equare solent: numerosis adnatis vndiq; fibris. Interna pulpa aureo colore nitet, rubris quam plurimis intercurrentibus venis: succo madet copioso tum croceo, tū purpureo, qui suo lentore manus implicat, & colore inficit.

LOCVS.

Oritur in Traglodytica regione, quæ propriè Barbaria appellatur, vnde illi nomen: quinetiam, in Catai regno, eminentibus quibusdam montibus & saxosis, sunt qui scribant Rhabarbarum in India oriri.

QUALITATES.


Constat tum aquis, tum terrenis qualitatis, quæ adstringentem illi facultatem tribuit, quin etiam aëreis & igneis.

VIREs.

Omnis penitus noxa vacat: aded, vt quouis tempore dari possit non solum pueris ætate tenellis, sed & vtero gerentibus. Sinceri macerati dilutum, vbi abstersione, deiectione, & infusus liberatione sit opus, mirificè confert. Atqui vbi adstringere ac roborare oporteat, ipsa quidem in puluerem contritū exhiberi debet. Id quod vehemētius operatur, quod ignis fuerit coctum: Deiecit Rhabarbarum cum bilem, tum pituitam: eique propria faculas elidit, tergendī, roborandiq; cum ventriculum, tum etiam iecur: atq; eorum punctiones amouet. Sanguinem pellucidum reddit, obstructions aperit, & qui ab his proueniunt morbos, sanat. Idcirco ictericos, hydropicos, lienosos, ac diuturna febre laborantes iuuat. Datur vtiliter ab alto deuolutis drachmæ pondere addito Mumie, & rubie radice momento ex vino austero. Opitulatur singultientibus, ac dysentericis, præsertim illud, quod igni fuerit coctum.

* A P P E N D I X.

De pictura Rhabarbari ab autore expressa tanquam adhuc incerta, nihil habeo quod affirmare queam. *



GENTIANA, Græcis, Γερμαν. Atabibus; Gentiana, seu Genthiana. Italis, Gentiana. Germanis, Entianwur. Hispanis, Gentiana. Gallis, Gentianne.

GENTIANA.

GENERA.

Trium est generum. Maior. Diosc. Minor. Minima.

FORMA.

Maior folijs provenit partim proximè radicem plantagini similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen paulum dissectis: caule cauo, ac lævi, digiti crassitudine, geniculato, bicubitali: semine in calicibus lato, lævi, glumoso, satis ad sphondilij semen accedente. Radice longa, crassa, amara, subluteo colore.

LOCUS.

Nascitur in sublimium montium iugis, umbrosis, & vliginosis locis. Ac etiam in eorundem montium pratis, ac pascuis.

QUALITATES.

Radix efficax est, ubi extensione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione opus sit. Nec mirum si hæc possit, cum impense sit amara. Excalfacit ordine tertio, & siccat secundo.

VIRES.

Radix datur vitiliter drachmarum duarum pondere cum vino, pipere, & Ruta à serpente demorsis. Eiusdem succi drachma, laterum dolore affectis, & sublimi deturbatis, ruptis, & convulsis prodest: Epaticis, & stomachicis ex aqua pora subuenit. Radix collyrij modo subdita partus ejcit. Imposita, ut Lycium, vulneraria est, & ad cuniculosa vlcera vitilis. Id quod etiam facit succus. Radix vitiliginem abstergit. Aqua è radicibus distillata febres ab infarctu provenientes, mirificè pellit. ventris tineas necat, maculas qualescunque in facie delet.

* GENTIANA matoralia.

FORMA.


Puniceos gerit flores, folijs
 à priore parum differens nisi
 acuminatiora essent. radix in-
 uenitur nonnunquam bra-
 chiali crassitudine, duos pe-
 des longa in summo diuisa in
 caules prodeuntes, quorum
 aliquando tres, quatuor, quin
 que vel sex etiam enascuntur.

LOCVS.

Prodit in alpium iugis.

FACULTATES.

Aiunt soluerè & purgare
 vehementius priore.*



GENT.

GENTIANA minor, Græcis, Γεντιανή μικρά, siue *σαυρίτις* ♂. Italis, *Gentiana minor*. Officinis, *Cruciata*. Germ. *Creuswurk* / *Sperensich* / seu *Wädelgeer*.

GENTIANA MINOR.



FORMA.

Caule exit rotundo, genicu- *Matth.*
lato, dodrantali, ac etiam maio
re, in cacumine rufescente. fo-
lia in caule prodeunt è genicu-
lorum alis bina, paribus inter-
uallis distincta, oblonga, sub-
pinguia, vulgaris saponariæ æ-
mula, superioribusq; gentianæ
folijs similia. Flores, qui purpu-
reo sunt colore, summo caule
in orbem exeunt. Radix illi al-
ba, longa, locis pluribus in cru-
cis modum secta, amaro admo-
dum gustu.

LOCVS.

Nascitur secus itinera in mō-
ribus & locis non cultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix præstat contra pesti-
lentiæ contagia in antidotis ad-
dita. Eaque omnia potest, quæ
Gentiana maior.

Dd

GEN-

GENTIANA minima, Italis, Gentianella, & Pettimborsa. Germ. Lungenblum.

GENTIANA MINIMA.

FORMA.


Radicibus, provenit numerosis, tenuibus, albicantibus, per quam amaris. cauliculis lætis, humi accubantibus. floribus ex cæruleo purpurascens: minoris Gentianæ similis, per inde ac folijs.

LOCVS.

Nascitur in collibus, locis incultis, & in campestribus.

QUALITATES, ET
VIRE.

Parum viribus à Gentiana differt. Contusa radix, & ventri adhibita, teretes tineas necat. Exulceratas strumas sanat radicum siccarum pulvis inspersus: Cum melle autem illitus, cutis vitia quæcunque, & maculas abstergit.



ARISTO

ARISTOLOCHIA, malum terræ & venenum terræ, Plinio referente, Græcis, *Ἀριστολόχια*. Arabibus, *Zaraund*, *Mafmocta*, seu *Zaraud*. Hispanis, *Astronomia*. Gallis, *Sarrasine*, seu *Aristologie*.

ARISTOLOCHIA.

GENERA.

Trium est generum, Rotunda quæ *στρογγύλη*, longa, quæ *μακρά*, & tertia, quæ *κηματίς* dicitur.

FORMA ROTUNDÆ.

Rotunda, quæ femina vocatur, **Diosc.** folijs crescit hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia quadā, molibus subrotundis: multis ab vna radice germinibus, prelongisque palmitibus. Floribus subalbicantibus, **Mattb.** oblongis, ex paruo capitulo in auriculæ modum desinentibus, graucolentibusque, colore intus ex atro purpurascente, fructu viridi, rotundo, iuglandis magnitudine: Radice rotunda, tuberosa, niali quantitate, vegeta, ponderosa, buxæ intus colore, graui autem & amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, in pratibus, & in Apulia Monte Gargano.

QUALITATES.

Omnium generum subtilissima **Gal. 6.** est rotunda, & ad omnia efficacior. **simp. me.** Itaque in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotunda. Excalfacit ordine tertio inchoante, & siccat secundo. **Mesue.**

VIRE.

Rotunda omnibus venenis resistit, & venenosorum animalium morbis: eadem cum vino, pipere,

& myrtha pota drachmæ pondere menses, secundas, partus & cætera vuluarum onera eiicit: idem quoque subdita facit: singultribus, suspirijs, horroribus, laterum doloribus, lixosis & conuulsis ex aqua pota singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit, ossium squamas illitu adimit, vlcera putrida exest, sordida expurgat, eamque cum iride & melle replet: gingiuas & dentes extergit. Dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum humorum, statimque exortos curat: præstat & ad asthmaticos, podagricosque. Radix drachmæ pondere pota, pituitam eiicit, quare humida tussi, & asthmati etiam antiquo nō solum hausta, sed suffusa prodest. Ad hoc enim parantur ex ea pastilli hoc modo. Sumuntur aristolochiæ rotundæ, æripigmenti eiusque partes æquales, & excipiuntur oui vitello, & formantur inde pastilli. E quibus vnus incenditur. Et sumus per infundibulum per os sumitur.

CENSURA.

Errant, qui maiorem Fumariam Aristolochiæ rotundæ vice in vsu trahunt.

ARISTOLOCHIA longa, Græcis, ἀριστολόχια μακρά. Italis, *Aristolochia longa*.

ARISTOLOCHIA LONGA.

F O R M A.

Diosc. Longa, quæ mascula & dactylitis appellatur, folia mittit rotundæ latiora, longioraque caulibus tenuibus, sesquidodrantalibus. Floribus, ut in rotunda auricularem formam referentibus. aliquanto tamen maioribus. è quibus fructus enascuntur virides piri similitudinem referentes, in quibus semen: Radice nititur digiti crassitudine, dodrantis longitudine: buxæo intus colore, & amaro gustu.

L O C U S.


Matth. Vera provenit in Italia: sed tantum in Apulia & Calabria.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Minus tenuitatis obtinet, quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verum abstergendi, utque excalfaciendi vim possidet, minus quidem, quam rotunda abstergit, & digerit, sed non minus calefacit, imo forsitan plus quoque. Itaque in quibus usus est modice absterfionis commodior est longa, nempe in carnum exulcerationibus, & fermentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic rotundæ usus esse debet.


V I R E S.

Ad ea omnia præstat, ad quæ rotunda, peculiariter autem aduersus anguinæ venenosorum morsus, & venena, tum ex vino drachmæ pondere pota, tum quoque exterius illita. Menses, parvus, & secundas eijcit, pota cum pipere, & myrrha. Id quod etiam præstat subdita.



ARISTOLOCHIA longavulgaris vel maior, quibusdam Saracenicavet Cle-
maris. Aristolochia terria apud Plinium. Gallis, *Saragine*. Germ. *Ofterlucy*.

ARISTOLOCHIA LONGA VULGARIS.



FORMA.

Caules huius omnes rectè
assurgunt ad cubiti altitudi-
nem & altius nonnunquam in
quibus luteiflores, & fructus
turbinati, parui oui magnitu-
dine, semine intus lato, ad ex-
ortus foliorum accrescunt, quæ
pediculo annectuntur longio-
re, quam in reliquis speciebus
fieri solet, hederæ aut asari fo-
liis non absimilia, ampla, ve-
nosa. radix quam cæterorum
exilior, flava odorata, amara,
aromatica, acris, multipliciter
se sub terra serpendo propa-
gans.

LOCVS.

Passim nascitur in Italia &
Germania, copiose vero in vi-
neis Assariæ.

FACULTATES.

Eisdem vsus creditur præ-
stare, quæ rotunda quanquam
ignavus. Nec desunt qui tradant ea gravem febrem finire, sed nidore suditis
carbonibus febricitantem suffire præcipiunt & ita febri promittunt liberari.
Addunt vulneribus illitu mederi: cum cypero aut dracunculi semine, adiecto
melle narium carcinomatis resistere, in oleo decoctam & suillo adipe argenti-
um horrores discutere.*

* **PISTOLOCHIA**, Aristolochiz quartum genus apud Plinium, vel Polyanthos.

PISTOLOCHIA.

FORMA.

Plin.

Tenuior est quam proxime dicta, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quæ tam in rectum quam obliquum sparguntur. ipsa herba penè humi sternitur, foliaq; habet partim nullis partim brevissimis petiolis annexa. flos similis est prioribus, minor ramen est, & nigrior, vel potius magis rubens, interdum etiam ex herbaceo flavesceus, Semen fuscum in vasculis cœu lagenulis continetur.


LOCVS.

Prouenit locis siccioribus, saxosis & apricis.

FACULTATES.

Plin.


Conuulsis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua utilissima esse traditur. Semine pleuritici auxiliari, neruos confirmare & excalfacere putatur. *



DULCIS

DULCIS radix, Glycyrrhiza. Græcis, Γλυκύρριζα. Mauritanis, *Sus*. Italis, *Regoliana*. Officinis, *Liquiritia*. Germanis, *Ecetris* / *sive Süßholzw.* Hispanis, *Regalica*. Gallis, *Reclisse*, *sive Regalisse*, seu *Heculisse*.

DULCIS RADIX.



F O R M A.

Surculis fruticat bicubitali. **Diosc.** bus: folijs lentisici, densis, pinguibus, ac gummosis: floribus hyacinthinis: fructu platani fere simili, asperiore tamen, qui siliquas lentium modo habet, easq; fulvas & parvas. Radicibus est longis, sarmentosisq; buxæ colore, gustu dulci ac subacervo.

L O C U S.

Nascitur sponte in monte *Matth.* Gargano Apuliæ, & scribitur in hortis, & vinidariis.

Q U A L I T A T E S.

Familiaris est radici natura *Gal. 6.* nostræ temperaturæ, sed cum *simp. me.* adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quàm proximè accedens ad temperamentum. Abstergit, mun- *Matth.*

dat, lenigar, mulcetq; humorum acrimoniam.

V I R E S.

Radici succus in arteriæ scabritia efficax est, si linguæ subditus eliqueat. **Diosc.** estuanti stomacho, iocinori, thoraciq; conuenit. Sanat vesicæ scabiem, & renam dolores, cum passo potus. Idem sitim sedat, vulnera conglutinat illitus. Eiusdem farina pterygijs vtiliter adhibetur. Ardoribus viniæ mirificè auxiliatur. Mansa radix, præsertimq; recenter effossa, non solum sitim sedat, sed etiam famem, seruatq; vires diebus pluribus. Idem præstat concretus succus in ore contentus. Pectus, & pulmones iuuat, quare datur vtiliter suspiriosis, phthisicis, pleuriticis, & tussientibus.

* *GLYCYRRHIZA vulgaris.* forte Radix Scyricea apud Theophrastum. Germ.
Süßholz.


GLYCYRRHIZA VULGARIS.

FORMA.

Suffrutex est præcedenti Dioscorideo similis, virgæ emittens bicubitales & altiores, lignosas, semestres, folia quoq; in pediculo seriati sibi inuicem opponuntur subrotunda, glutinosaq; Flosculi in summitate purpurascetes post se relinquunt femina siliquis maiusculis inclusa, quæ non tam dense stipantur ut platani pillulam efformet, sed singulæ singulis pediculis adhærentia aliquanto spacio à se inuicem distant, radicibus propagatur sarmentosis, prælongis, dulci succo præditis, intus flavescentibus, & mire viuacibus.

LOCVS.

Seritur in hortis & alicubi sponte nascitur. Imprimis vero hac radice nobilis est ager Bambergensis.



QUALITATES.


Calore temperato humentiq; recens porissimum & succo abundans & moderata quadam absterfione naturæ conueniens & amica est, viscerumq; obstructions expedit.

FACULTATES.

Præstat omnia & potiora in super, quam suæ Glycyrrhizæ tribuunt Dioscorides & Galenus. Acres & sallos humores retundendo thoracis & trachæ viâ sanat, asperitates lenit & concoctionem iuuat.*

CENTAVRIUM magnum, Græcis, Κενταύριον μέγα. Aphris, Chantaurion kibir, seu Sacurion habre. Italis, Centaurea maggiore. Germanis, Rhenpontic. Hispanis, Rnipontic. Gallis, Rhepontico.

CENTAVRIUM MAGNUM.



F O R M A.

Folia pinnituglâdis, oblonga, viridi brassicarû colore, in ambitu serrata. Caulē ceu rumicis bicubitalē tricubitalēve, multis ab radice adnatis: in quib. capita sunt oblōga, papaveris magnitudine, Cnici figuratē quib. flos exit cæruleus, & semē Cnico simile, papposa la nugine circūstante. Radix est illi crassa, pōderosa, solida, tripedalis, rubeo succo pregnās, cū adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rufescens.

L O C U S.

Plurimū provenit, idq; præ- *Matth.* fās in Gargano Apulię mōte, quin etiā in Monte Baldo in Veronenſi agro, ac etiā in alijs nonnullis Italię mōribus, sed Apulo longē infirmius.

Q U A L I T A T E S.

Radix sicut gustu cōtrarias *Gal. li. 7.* qualitates, ita in vsu cōtrarios *simp. me.* effect^o demonstrat. Gustu itaq; acris, simulq; adstringēs apparet, cū lenicula quadam dulcedine. Lenit, trahit, aperit, roborat, adstringit, puocat, vul-

nera glutinat.

V I R E S.

Radix medetur ruptis, cōnulsis, pleuriticis, ægrē spirantibus, diuturnæ tussi, *Diosc.* sanguinemq; expuentib. duarum drachmarū pondere in aqua pota, si febris sit: sin aut in vino. Præstat & ad tormina, & vteri dolores: subdita, menses & partus extrahit. Tusa recens, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit. Carnes in ollis coalescūt, si tusa simul decoquatur. Datur vtiliter hydropicis, *Matth.* Ictericis, & Iecinorosis, tū vino macerata, tū in puluerē pota: Eiusdē succus vnicuique pondere haustus, ac etiam vulneri illitus, auxiliatur a serpente demorsis.

G E N S V R A.

Qui putāt Centaurij magni radicem legitimum esse Rhaponticū, magno in errore versantur.

CENTAVRIVM minus, Græcis, *Κενταύριον μικρόν*. Arabibus, *Chantaurion sege, & segir*, seu *katarion sages*. Italis, *Centaura minore*. Hetruscis, *Biondella*. Germanis, *Eausent gülden Kraut*/Fieberkraut/Erdegall/ sine Diberkraut. Hispanis, *Fel de tierra*. Gallis, *Repeyeret*, sine *Centaura pouler*.

CENTAVRIVM MINVS.

FORMA.

DIOSC. Herba est hyperico, aut Origano similis, caule anguloso, palmum excedente: floribus in umbellæ ferè modum comantibus, è puniceo in purpuram vergentibus, folijs oblongis ac parvis: semine tritico simili: radice pusilla, lævi, & superuacua.

LOCVS.

Nascitur in pratis, pascuis, & campestribus.

QUALITATES.

Gal. li. 7. Radix prorsus inefficax est, sed ramuli eius, & potissimum folia, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habes adstrictionis, atque ob huiusmodi temperamentum, admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis.

VIREs.


DIOSC. Herba recens tusa, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bilē, crassosq; humores per aluū ducit, si decocta deuoretur. Ius decocti conuenientissime ischiadicis infunditur. Succus cum melle mistus caliginē oculorum purgat. In vellere subditus, menses, & partus extrahit, haustus verò neruorum vitij medetur. Datur foliorum, & florum decoctum vtiliter potandum tertianarijs, quòd bilem per inferna deijciat. Idem, pariterque succus iocinoris, ac lienis, obstructions, & duritias tollit: alui tineas pellit, cum potus ex melle drachmæ pondere, cum umbilico illitus. Herba, comæq; decoctum, varos, alphas, lentigines, ac cæteras cutis infectiones exterit. Instillatur succus vermiculosis auribus, quin etiā illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera.

Matth.



* *CENTAVRIVM luteum, perfoliatum, vel diaphyllum.* Germanis, *Gelb Taufentgülden.*

CENTAVRIVM LVTEVM.



GENERA.

Duo sunt Centaurei lutei genera, hoc potiss. differentia, quodd alterū angustiora & non perfoliata folia habeat, alterū latiora & caulem vndique ambientia.

FORMA.

Herbula est pusilla, alterius Centaurij minoris magnitudine, folijs rotundis elegāter vestito cauliculo, qui per mediū ipsorum traicitur. Flores lutei sunt interdum pallidiores, interdum crocei magis, semina profert pusilla, in rotundis capsulis.

Locvs.

Nascitur in aruis, & nonnunquā in vetustis muris, præsertim in agro Bononiensi.

QUALITATES,
ET VIRES.

Quamvis eam amaritudinem non habeat quam Centaurium minus, amara tamen est euidenter, & ad vulnera valet.*

CHAMA-

CHAMÆLEONALBUS, Græcis, *Καμαυλέων λευκός*. Mauritanis, *Chameleon lente*, seu *Chamaliūm*. Italis, *Carlina*, & *Chameleone bianco*. Hispan. *Cardopinto*. Gal-
lis, *Carlina*, seu *Chameleon blanc*.

CHAMÆLEON ALBUS.

FORMA.


DIOSC. Folia habet sylibo, aut scolymolymosimilia, asperiora tamē, acutiora, ac nigro Chamæleo ne validiora. Caulē non promit, verūm ex medio spinas Echini marini, aut Cinaræ modo erigit. Flores emittit purpureos veluti papparum lanugines: semen cnico simile: radicem in lætis collibus, crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albā, aliquatenus odoratam, dulcem, & odore graui.

LOCVS.

Matth. Nasclitur in collibus, cum in lætis, tum in montosis locis, quin etiam in incultis, arido solo.

QUALITATES.

Gal. li. 2. Excalfacit ordine secundo
fimp. me. absoluto, siccat verò tercio.




VIRES.

DIOSC. Potaradix acetabuli mensura latis interaneorum tineas pellit. Hydropicis datur commodissime drachmæ pondere ex vino albo. Eiusdem decoctum potum vrinæ difficultatibus subuenit. Hausta in vino serpentium venenis resistit.

Matth. Enecatamen canes, sues, & mures. Vulgus radicem magnificat contra pestilentia contagia, si quotidie drachma deuoretur.

CHAMÆLEON niger, Græcis, Καμαλέον μέλας. Arabibus, Chameleon melamos. Italis, Chameleone nero. Germanis, Ebertwurk. Hispanis, Cardo pinto. Gallis, Chiardonette.

CHAMÆLEON NIGER.



FORMA.

Folij exit scolymo mino-
ribus, tenuioribus, & rubro
colore distinctis, caule do-
drantali, digitali crassitudine,
subrubro, & in umbella flo-
res spinosos, tenues, hyacin-
thino colore, versicolorésve.
Radice crassa, nigra, dēsa, in-
terdum exesa: quæ dissecta fla-
uescit, & cōmanducata mor-
det.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, Idem.
& in maritimis, siccis, & cli-
uosis locis.

QUALITATES.

Radix lethale quiddā ob-
tinet, detergit, digerit, & e-
mollit, siccatur ordine tertio,
& exalfacit secūdo absoluto.

VIRES.

Trita radix cum chalcanti exiguo, & axungia scabiem abigit: cocta in aceto,
addito sulphure, & bitumine impetigines, virilignesque sanat. Decoctum in
ore detentum, dentium dolorem mitigat, phagedænas tetraq; vlcera illitu sa-
nat.

CHAMÆ-

Matth.

Non defunt qui hanc plantam legitimum nigrum Chamæleonem esse contendunt, verum cum plures in ea (quantum video) desiderentur notæ, ego quidem, eorū sententiæ haud ita facile subscribam.

* APPENDIX.


Non differt à Chamæleonre albo, nisi quod in caulem creuerit.*



LABRVM

LABRUM Veneris, Græcis, *Δίλαξ*. Aphris, *Dilfacos*. Italis, *Cardo d'apani*, & *Diffuo*. Germanis, *Kartendistl*. Hispanis, *Cardencha*, seu *Cardo penteador*. Gal-
lis, *Cardon*, & *Carder*.

LABRUM VENERIS.



GENERA.

Duum est generum. Sati- *Matth.*
uum, & sylvestre.

FORMA.

Satiuum caulem habet al- *prosc.*
tum, spinis horridum, folijs
lactucæ, spinosis, binis, geni-
cula singula complectentib.
prælongis, bullisq; quibusdā
refertis, ipsisque pariter acu-
leatis, concavo alarum sinu cō-
nexu, in quo im-
ber aut ros asseruerur. In ca-
cumine caulium singula sur-
culis capitula, insunt oblōga,
echinata spinis, quæ arefacta
candida spectantur, dissecta-
que medullatenus vermicu-
los ostendunt.

LOCVS.

Seruntur in campis ab Ita- *Matth.*
lis multis in locis ad lanificia,
quin etiā & sponte nascūtur,
nonnullis in regionibus.

QUALITATES.

Radix exicat ordine secundo, atque nonnihil abstergit.

VIRES.

Tusa radix & vino decocta, vsque dum sit ceræ crassitudo, sedis rimas & si-
nus curat: sed ænea pyxide recondenda, pēnsilibus verrucis, & formicantibus
vuliter adhibetur. Capitulorū vermiculi in folliculo collo suspensi, produntur
quartanis febribus remedio esse. Expetuntur piscatoribus, quòd ijs hamis im-
positis, pisces hac esca mirum in modum alliciantur.

Gal. 6.
simp. me.

LABRUM

LABRVM Veneris alterum, iisdem appellatur nominibus, quibus primum appellari diximus.

F O R M A.

Matth.

Facie à priori parum admodum differt, sylvestrius tamé est, & spinis longè horridius. Echinata capitula fetis quoq; compluribus scatent, aculeis non adeò firmis, arque aduncis, vt in altero genere.

L O C U S.

Idem.


Nascitur sponte in campis, in agrorum, & scrobium aggeribus, secus itinera, & prope sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Non differt suis omnibus in facultatibus ab altero.

LABRVM VENERIS ALTERVM.




VIRGA

VIRGA pastoris, Italis, Virga di pastore, & dissaco minore.

Matth.

VIRGA PASTORIS.

F O R M A.



Folijs caule echinatis capi- *Idem.*
tulis, ac cæteris suis partibus
Veneris labrū æmularut, sed
omnibus gracilioribus, mino-
ribus, & infirmioribus capi-
tulis adeo paruisvt oliuæ ma-
gnitudinem vix æquent, te-
nuibus capillamentis refer-
tis.

L O C V S.

Prouenit vmbrosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis. * In hortis se-
mel sata vix potest iterum ex-
tirpari, ita è semine hinc inde
sparsa repullulat.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Non crediderim ego hanc *Idem.*
plantam à Veneris labro ad-
modum distare, imbecillioris
ramè esse facultatis haud ne-
gauërim.

SPINA alba Græcis, *ἄγρια ῥόνη*. Arabibus, *Bedeguar*. Italis, *Spina bianca*.

SPINA ALBA.

F O R M A.

Diosc. Folia fert albi Chamæleónis, angustiora tamen, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulē bicubitalem, & maiorem, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus & oblongū: flores purpurei, ex quibus semen gignitur Cnici modo, sed rotundius.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montibus, & syluosis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Radix desiccatoria est, &
simp. me. modicè adstringens: semen vero tenuis essentie, & calidæ facultatis habetur.

V I R E S

Diosc. Pota radix cæliacis, stomachicis, & ijs, qui cruenta extussiunt, efficax est: vnam citrurnoribus illinitur: Decoctum eius in ore detentum, & in collutionibus adhibitur, dentium dolores mulcet. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur.



* SPINA alba putata, alijs Echinopus, nonnullis Acanthium, vulgo Sphærocephalus, quibusdam Chamæleon niger, alijs Crocodilium, Ger. Wisemtnöyff.

G E N E R A.

Plurimum est generum, è quibus duo vulgatiore.

F O R M A.

Prior Sphærocephalus echinatum gerit capitulum flosculis candidis ceu stellulis è quorum singulis apices extant cærulei pulcre exornatum. Caulis altus folijs vestitur latis, aculeato ambitu horrentibus prona superficie ex albidis, supina ex atro virentibus. Radice nititur oblonga alba, quæ altero à satù anno lignescit. Semina in capitulis villosa dense stipantur, & ventorum flatu decussa passim se propagant.

L O C U S.

Habetur in hortis, & sponte nascitur saxosis & fluvij imminentibus collibus.

V I R E S.

Decoctum echinati capitis vna cum caule & seminibus, quæ admodum sunt amara, mirifice prodest in doloribus dentium.*




* SPINA alba putata flore cæruleo.

F O R M A.

Differt à priore, quod humilior sit, & candidiora proferat folia, quæ angustiora magisq; laciniata esse observantur. Flores in globulis cærulei elegantissimi disponuntur, summo cauli insidentibus, è quibus semen relinquitur ut in præcedente hirsutum, sed grandius.

L o c u s.

Peregrina cum sit planta non nisi in hortis quærenda erit.*



CAR-

CARDVVS, Scolimus. Græcè, Σκόλιμος. Arabibus, *Raxos, Harxos, siue Sacolomas.* Italis, *Cardo, Carciofo, & Archibiscio.* Germ. *Strobbildorn.* Hispanis, *Cardo de comer, seu Cardos.* Gallis, *Artechault, siue Carciophe.*

CARDVVS NON ACULEATVS.

G E N E R A.

Plura habentur genera. sed *Matth.* duum tantum hic meminisse sat fuerit, nepe satiui & spontè nascentis. satiui duo sunt genera: alterum aculeatum, & alterum sine aculeis.

F O R M A.

Qui aculeis caret, folia pro *Idem.* mit grandia per ambitum laciniata, auersa parte subalbicantia numerosaq; : caulem edit longum, foliosum, capite echinato, sine aculeis tamen. Et quadantenus pini cono simile.

L O C V S.

Seritur passim in hortis, & *Idem.* viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine secundo *Gal. 8.* completo, aut tertio incipi- *simp. me.* ente, & exicat secundo.

V I R E S.

Radix contusa, & illita, cum alarum graueolentiam, tum corporis rotius e- *Diosc.* mendat. Eadem decocta in vino bibita copiosam, foetidamq; vrinam ducit. Herba cum recens tenerescit, in olera asparagi modo transit. Melancholicum *Gal. lib. 2.* succum gignit carduus pro obsonio sumptus. Non solum foliorum carinas *de ali. fac.* mangonio elaboratas, albicantes tenerasq; , sed etiam caules vorant Itali cum sale, & pipere secundis mensis, sed fructus quoque tum crudos tum iusculis incoctos.

CARDVVS aculeatus, Græcis *Σκόρδος ἀνὰ θόδης*. Italis, *Cardo*. & *Cardiofoli-
noso*.

CARDVVS ACULEATUS.

FORMA.

Matth.

Folia gerit alterius magis
diuisa, magisq; laciniata, te-
nuibus circumdata spinis: cau-
lem quoque alteri similem,
striatum subalbicantem, in
cuius summitate echinatum,
aculeatumque extuberat ca-
put, flore hyacinthino: semi-
ne Cnici minore. Radice niti-
tur crassa, firma, non insuavi.

LOCVS.

Idem.

Colitur in hortis ad men-
sarium bellaria.

VIRES.

Idem.


Idem prestare potest, quod
alter.



*SCOLT.

*SCOLYMVS sylvestris. Germanis Schönharle.

CARDVVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Sylvestris Scolymus non alte assurgit, folijs aculeatis, caulibus duorum dodrantum altitudine, colore atro rubente, odore vinoso, in summitate crescunt capitula, in quibus semen & pappi albid.

LOCVS.

In Bohemia & alibi sponte nascitur.

VIREs.

A fœminis vsurpatur in sizio ad abluendos capillos qui flavescent inde & pulciores efficiuntur, & à pediculis & lendibus immunes redduntur.*

Ec 4

Porr-

POTERIVM, Græcis, Ποτόριον. Italis, Poterio.

POTERIVM.

F O R M A.

Diosc. Large fruticat, cortice obductū tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, tenuib⁹, tragacanthæ proximis, folijs parvis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris, semine superuacuo, sed gustu acuto, & odorato. Radices mittit binum, ternumve cubitorum, nervosas, & firmas, quæ proximè terram incisæ, succum fundunt gummi similem.

L O C U S.

Idem. Nascitur in aquosis, & collibus.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. simp. me. Desiccandi absq; morfu facultatem possidet, adeo, ut & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi.

V I R E S.


Radices tuzæ præcis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoq; earum, nervorum affectibus prodest.

ACAN-



ACANTHIVM, Græcis, ἀκανθίον. Italis, Acanthio.

ACANTHIVM.



FORMA.

Planta est albæ spinæ simi- Diosc.
lis, folijs extremo ambitu acu-
leatis, & araneosa lanugine
obductis, ex qua collecta, &
nera telas bomicinis similes
texunt.

Locvs.

Nascitur in montibus, & Matth.
locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia & radices ad remedia Diosc.
opistoroni vsurpantur in po-
tu.

Ec 5

ACAN-

ACANTHVS, Græcis, *ἄκανθος*. Italis, *Acantho*, siue *Branca Orfina*. Germanis, *Steyren Klaw*. Hispanis, *Ieruagiguanthe*, & *Branqua Virfina*. Gallis, *Branze Orfine*.

ACANTHVS.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet multò lactuca-
ceis latiora, & longiora, eru-
cæ diuifura, nigricantia, pin-
guia, læuia, caulem bicubita-
lem, digitali crassitudine, læ-
uem, prope verticē ex inter-
yallis circundatū foliolis, ceu
nucamenta quædam oblon-
ga referentibus, spinosis, è
quibus flos prodit albus; se-
men oblongum, luteum. Cap-
ut thyrsi specie. Radicibus
niritur longis, mucosis, ru-
bris, & glutinosiss.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in hortis, petro-
sis, & riguis.

Q U A L I T A T E S.

*Gal. li. 6.**simp. me.*

Folia quidem mediocriter
digerentem facultatem obti-
nēt. At radix exiccatoria est,
& leuiter incisoria, & tenuiū
partium.



V I R E S.

Radices vstis igni, & luxaris artubus illitæ subueniūt: potæ vrinam eient, sed
alium cohibent: ruptis, conuulsis, tabidis mirè profunt.

A P P E N D I X.

Tametſi Acanthus, qui noſtris in hortis ſeritur, folia ſpinofa non habeat,
non tamen ob id ſpurium id eſſe fuerit credendum. Siquidem (vt Plinius eſt
autor lib. & cap. 22.) duo Acanthi habentur genera, alterum criſpum acula-
tumque, alterum læue.

ANONIS sive Ononis, Græcis, *ὄνυξις*, sive *ἄνυξις*. Officinis, & Herbarijs, *Refla*
bois. Italis, *Ononide*, & *Bonsa*. Germa. *Stalltraut* seu *Harthechel*. Hispanis,
Catilber, & *Catibinos*. Gallis, *Eugrænes*, sive *Burgrundes*.

ANONIS, SIVE ONONIS.

FORMA.

Ramos habet fruticosos, *Diosc.*
 dodrantes, aut maiores, fre-
 quentibus geniculis cinctos,
 caulis alarū multis: folijs len-
 ticulæ tenuibus, pusillis: ad
 præteritis loti folia accedenti-
 bus, subhirsutis, non iniunc-
 tū olentibus. Rami acutiori-
 bus spinis, & veluti spiculis
 firmioribus, horrent. Radi-
 cem mittit candidam.

LOCVS.

Nascitur plurima in pratis, *Matth.*
 quin etiam in incultis locis.

QUALITATES.

Radix ex calfacit tertio qua *Gal. li. 7.*
 dantenus ordine: cortex eius *simp. me.*
 maximè est utilis, habes quip-
 piam & absterforium, & in-
 cisforium, proinde non tan-
 tum urinas prouocat, sed &
 lapides confringit.

VIR'ES.

Radix cortex ex vino potus, urinas ciēt, calculos comminuit, & vlcera *Diosc.*
 margines erodit. Radix ex posca decoctum collutione dentium dolores mul-
 cet. Decoctum eius potum hæmorrhoidas sanare creditur.

* *ONONIS lutea*, montana, Natrrix alijs.


F O R M A.

Eradice singulari, simplici, parua, lignosa, cauliculi furculosi oriuntur, dodrantaes, albicantes, ab imo vsq; ad summum folijs parvis, crassiusculis, ternis plerunque, oblongis, saluginosis vestiti. Flores in summis coliculis lutei pallescentes leguminum specie, è quibus siliquæ fiunt semine plenis, colore pullo. Herba tota est hirsuta & pinguis, odorata, sed hircinum quidam olet.

L O C U S.


Frequens Monspelij inter segetes & prope mare.*

ONONIS LUTEA.



CARDUUS

CARDVVS lacteus. Italis, *Scardacio bianco*, seu *Cardo del latte*. Germanorum *Officinis*, *Carduus diue Marie*, & *Carduus lactarius*. Germanis verò ipsi, *Unser Frauen Distel*. Gallis, *Chiardon de nostre Dame*.

CARDVVS LACTEVS.**FORMA.**

Folia fundit magna, pingua, per *Matth.* ambitum laciniata, ac tenuibus, acutisq; aculeis circumqua; stipitata: albicantibus vbiq; maculis: caulem proferit bicubitalē, & sæpe maiorem, spinis horrentem, brachiatum. Echinatis, aculeatisq; in summitate capitibus, qui æstate media florent cinaræ modo, floribus purpureis capillaceis. Semine Cnici minore, papposa lanugine obducta. Radice nititur, valida alte descendente, amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur spõte in campestribus, *Matth.* incultis locis, secus itinera, & agrorum marginibus.

QUALITATES.

Radix exalfacit, abstergit, aperit, prouocat, & attenuat. *Idem.*

VIRES.

Radix decoctum datur vtiliter potandū ad iocinoris, & vasorum infarctus, & remorantes vrinas, quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem menses elicit, tum potum, tum in desensionibus additum: Radicum siccarū puluis: propinatur ex ptissana cum fœniculi semine, & longo pipere ad lac augendum. Stillatitia foliorum aqua vruntur quidam ad lateris dolorem, valentiusq; id præstare aiunt, si cum seminis drachma propinetur.

TRAGACANTHA, Græcis, Τραγάκantha. Italis, *Tragacantha*. Arabibus, *Chitira*, *Chatech*, seu *Alchatad*. Germ. *Dragant*. Hispan. *Alquetira*.

TRAGACANTHA.

FORMA.

Diosc. Radice nititur lata, & summo cespite lignosa, unde surculos humiles, frequētes, robustos latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, & tenuia exoriūtur, quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiam *Tragacantha lachryma*, quæ vulnerata radice manat.

LOCVS.

Matth. Nascitur in Apulia in monte Gargano, ac etiam in alijs longinquis meridianisq; regionibus, unde ad nos comportatur lachryma.

QUALITATES.

Gal. 6. simp. me. *Tragacanthæ lachryma* similem gummi vim obtinet emplasticam quandam, quæ humorum acrimoniam obtundit, & sanè similiter illi desiccatur.




VIRES.

Lachryma cutis spiracula obstruit: additur in oculorum medicamentis: præstat & contra tussim, exasperatas fauces, rerufas voces, & cæteras destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquefcit: in passo madefacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolores, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi aluminis momento: quæ tosta fuerit dysentericis auxiliatur ex cydoniorum vino hausta. In summa ubi læuigare, obrundere, & reprimere opus est, præstantissimum semper fuerit medicamentum.

ERYNGIUM, Græcis, ἑρύγγιον. Italis, Iryngo. Germ. Brachen Distel/ſiue Mannstreu. Hispanis, Cardo corredor. Gallis, Paracaulis.

ERYNGIUM.



GENERA.

Tria ejus habentur genera. *Matth.*
Montanum, ſiue campeſtre. Marinum & planum.

FORMA.

Montanum folia fert Cardioscui, lata, per ambitum laciniosa, aspera, gustu aromatica, sed ubi adoleuit circa complures caulium eminentias in spinas aculeatur, in quorum summitatibus globosa capitula durarum, acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circumuallantur; quorum colos alias virides, alias albus interdum cæruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, & odorata.

LOCVS.

Nascitur in asperis, campestribus & in sabulosis pratis. *Matth.*

QUALITATES.

Caliditate quidem aut parum Gal. li. 7: aut nihil, quæ temperata sunt *simp. me.* superat, siccitatem verò in tenui essentia consistentem, non paruum obtinet.

VIREs.

Pota radix, menses & urinas pellit, tormina inflationesque discutit, contra iocinoris vitia, serpentium morsus, & hausta venena, vino pota prodest. Bibitur aduersus plurima cum seminis pastinacæ drachma. Appensa illitave tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite opisthotonicis, & comitialibus medetur. Eiusdem decoctum expedit iocinoris & lienis infarctus: valet aduersus rubetas, toxica, & aconita ex ranarum comestibulum iure pota, vel ex anserino, ubi ranæ non sint ad manus, valet & contra cordis affectus. Præstat quoque contra stranguriam, obstruōs renes, & vuluarum præclutiones. Illita ex melle infixæ corpori extrahit. Præsumpta crapulam arcet, & aluum sistit: Fit & renellis Iryngij folijs stillatitia aqua, ijs quàm maximè utilis, qui morbi Gallici viceribus laborant, si diutius quotidie ea vtantur in potu.

CENSURA.

Magno admodum tenentur errore, qui Eryngium Mauritanorum secacul esse contendunt, ERYN-

ERYNGIUM maritimum. Italis, *Iringio marino*.

ERYNGIUM MARINUM.

FORMA.

Matth. Folia edit. alterius longè latiora, circinata, & in ambitu aculeata, & cæsis resperfa colore. Caulem carnosiorum, crassiorum; atque striatum, capitulis cæruleis, maioribusque. Radices habet prælongas, teneras, ac molles digitali crassitudine.

LOCVS.

Idem. Nascitur in maritimis, non longè à littoribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus siccat, quàm altera, sed eandem possidet vires.



ERTH-

ERYNGIVM planum, siue lœue. Italis, *Iringoliscio*, & *Iringosenza spine*.

ERYNGIVM PLANVM.



F O R M A.

Folijis exit latis, oblongis, minimè laciniatis, in ambitu tamen serratis caulibus compluribus, ramosis: oblongis in summitate capitulis, ipsisque subasperis. Radice vegeta cæteris crassiore.

L O C V S.

Prouenit in Austria in Viennensi agro, campestribus locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Radix minus quàm cætera præscripta siccatur, minùsque ad omnia præstat.

Ff

ALOB,

ALOE, Græcis, *Αλόν*. *Aphris*, *Saber*, *Paber*, *sive Subar*. *Italīs*, *Alog*. Germanis, *Alepatick* / & *Bitter Aloes*. Hispanis, *Hierva babosa*. Gallis, *Aloes*.

F O R M A.

DIOSC. Folijis provenit scillæ similibus, pingibus, modicè latis, rotundis retrorsum pandis, quæ vtrinque obliquo longioribus intervallis striantur, & in mutilas spinas desinunt, caule antherico non dissimili, flore albo, ac purpureo, fructu hastulæ regię cognato: Tota planta grauius olet, & gustu est amarissima. Radice vnica cucupalo, in terram depacta.

L O C V S.

DIOSC. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus affertur. Nascitur, & in Asia, & Arabia in locis quibusdam maritimis & insulis. v. in Andro.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Est Aloe non simplicis naturæ, sed vt indicio est gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit quidem mediocriter, sed vehementer est amara: subducit & aluum: Exiccatur quoque, ordine tertio, excalfacit verò aut primo intenso, aut secundo exoluto. Repellit, digerit, extergit.

V I R E S.

DIOSC. Sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat drachmæ pondere ex aqua frigida. Deuorata cum resina, vel melle cocto, aluum soluit. cæteris medicamentis

admixta præstat vt minus stomachum lædant: sicca & inspersa vulnera glutinat, & vlcera cicatricem perducit cohibetque. Eadem peculiariter pudendorum vlcerebus medetur. Conchyliolata, & sedis rimas ex passo sanat: etiam cum frigiditate coniunctam. Deiectione priuatum scabram lippitudines, pruriginisque, in oculorum angulis permulcet: temporibus, & fronti ex aceto, & rosacco illita, capitis dolorem sedat: cum vino autem capillum fluentem continet. Vtile stomacho est medicamentum, vt si quid aliud. Infestissima est his, qui citra variatos humores, ex calida, siccaque, intemperie affliguntur: proximam ab his læsionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum frigiditate coniunctam. Deiectione non modo bilem, sed pituitam ipsam: Quotidianus eius vsus à moriferis morbis tueretur: sensus omnes, intellectumque, acuit: lecur ab infarctu purgat: hæmorrhoidibus, ac cæteris inflammationibus nocet (scilicet pota, non tamen exterius admota) ex aceto & felle bubulo vmbilico, venni que, illita, intestinorum animalia necat.


Gal. li. 6. simp. me. & 8. de com. me. sec. locos. Matth.



* *ALOE AMERICA. Italis, Aloe americana. Hispanis, Cardon, & Magney dellas Indiar. Valentinis. Fily agulla, Indis, Magne y & Metl.*

A L O E A M E R I C A.

F O R M A.



Folia promit alterius, multo maiora, quorum ambitum duri muniunt aculei, nigricantes, & fibris intus albis firmisque tota substantia plantæ contextitur, ut si euellatur aculeus qui in summo est, filamenta quædam robusta veluti acui appensa simul extrahantur: radices sparguntur in obliquum summa tellure in multam longitudinem, vnde soboles enascitur vniuersissima, quæ paucis annis crescit in arboream amplitudinem, ut palmæ caudex, non tamen apud nos attollitur, neque floret. Scribunt tamen aliqui in hortis Pisani vere, ex medio foliorum scapum elatum fuisse breuibz folijs & raris qui paucis diebus ad altitudinem vndecim cubitorum adoleuerit, & sparserit in cacumine circumquaque ramos veluti latam umbellam constituentes, in qua flores in æstate sursum spectantes, digiti longitudine, exterius herbacei intus pallidi, explicati in sex foliola, sine fructu deciderint, (hunc autem in India ferre Cyrinis Mali Punici similem indicarunt quidam) caulibus vero aduentante hyeme exaruerit instar Ferulæ.

L O C V S.

Nascitur copiose in Mexico, & nostri quoque horum participes facti sunt.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Folia abundant succo amaro & acri non tamen in Italia & apud nos tanta illi amaritudo, quanta in America regione, qui vlcera sanat, & contra viperarum morsus utilis est. Eorundem fumus per os ac nares haustus morbo Gallico medetur, sed ad eò vehemèter sudores mouet ut vires admodum debilitet. Præterea tradunt in India arborescere hanc plantam, ut ex ea trabes fiant, succum radici mellicum inesse, ex folijs confusis & maceratis extrahi linum, quo lintea texunt mollissima candidissimaq., & huiusmodi plura alia, quæ ex varijs autoribus passim cognosci possunt.*

ABSINTHIUM Græcis, *ἀλθύριον*. Mauritanis, *Absynthium*. Italis, *Affenzo*, & *Affentio*. Germanis, *Wermut*. Hispanis, *Affentios* siue *Alofna*. Gallis, *Alayne*, siue *Absnce*.

A B S I N T H I U M.

G E N E R A.

Matth.

Quatuor Absinthij nominantur genera: vulgare, Ponticū, Marinum, siue Seriphium, & Santonicum: Ponticum tamen à vulgari non diuidit Dioscorides. * Plura etiam habetur quæ apud alios Auctores picta & descripta inueniuntur. *

F O R M A V U L G A R I S.

Matth.

Caule exit ramoso, folijs incanis, amaris, multipliciter sectis artemisiæ modo, floribus melinib; paruis, semine rotundo racematim dependente: radice diuulsa, durâq;.

L O C V S.

Idem.

Prouenit ferè ubiq;: & feritur, & per se quoq; in hortis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.

simp. me.


Adstringentiam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergens, & roborans, & desiccans, ex acrimonia quoque constat, quod maiori portione calidum sit magis, quàm frigidum. Itaq; calidum fuerit excessu primo, & siccum tertio. Atqui succus, longè quam herba calidior est.

V I R E S.

DIOSC.

Bilem expurgat, vrinam cit, crampulam præsumptum arceat: cum fesceli, & Celtica nardo potū, inflationibus ventris, & stomachi doloribus auxiliatur: fastidia discutit & arquatos sanat, epoto quotidie eius diluto, aut decocto: Menses elicit tum haustum, tum ex melle suppositum. Bibitur vtiliter contra fungorum strangulationes ex aceto: ex vino sumptum aduersatur lixi, cicuræ, muris aranci, & marini draconis venenis. Illinitur ex melle ad fugillata, & oculorum caligines, quin etiam & ad purulentas aures. Admouetur iocinori præcordijsq; cum cerato ciprino, stomacho quoque diuturna valentudine laboranti, cum rosaceo: aquæ intercutem cum ficis, loliaceæ farina, & aceto, subuenit & lienosis. Præstat ad ea omnia vinum, quod ex eo paratur. Contumaciam in ventre pituitam oblatum nihil adiuar, nec eam, quæ in thorace, & pulmone continetur.

Galen.



* *ABSINTHIUM* Montanum. Germanis, *Bergwerthut*. Italis, *Assenzo montano*. Hispanis, *Alofena montesina*. Gallis, *Aluyne montaigne*.

ABSINTHIUM MON-
TANVM.



FORMA.

Vulgari absinthio tam radice, quam caulibus, nec non folijs floribúsq; prorsus simile est, sed exilius, ad summum duorum dodrantum altitudinem attingens, amaritudo illi, quæ priori, sed gratior, & minus terro abominabiliq; odore saporeq; commendatur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, pluribus in locis.*

ABSINTHIUM Ponticum, Græcis, *Asinthion pontikon*. Italis, *Affenzo Pontico*.

ABSINTHIUM PON-
TICVM.

FORMA.

Matth. Folijs, caulibus, floribus, semine, ac cæteris suis partibus, prouenit vulgari absinthio longè minoribus, vt ex appellatione huius imagine constat.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Ponto, vnde illi nomen: quineriam in Vngaria, & Bohemia.

QUALITATES.


Gal.li. ii. cap. 16. Meth. med. Quum duplex in omni absinthio facultas, & qualitas sit: vtrique in Pontico adstringendi qualitas non parua est, in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum ad iocinoris, & ventriculi inflammationes eligi præstat. Id autem est rum folio tum flore longè quam cætera absinthia minore. Odor quoque illi non modo non insuauis, verum etiam aromatum quid præferens, ac reliquis omnibus est sædus, quare hæc fugere conueniet, & Pontico semper vti.

V I R E S.

Fit & recentibus floribus, & saccharo simul contusis Antidotum ad hydrophem præstantissimum, cuius longo vsu per plures sanatos vidimus. Parandi ratio hæc est. Sumito florum vncias tres. Sacchari albi libram vnam, contundantur in mortario diligenter. Et deinde pyxide vitrea recondita insolentur per mensem.

ABSINTHIUM marinum, siue Seriphium. Græcis, Ἀλνθιον θαλάσσιον. Italis, *Assenzo marino*. Aquileiensibus, *Santonio*.

ABSINTHIUM MARINUM.



FORMA.

Folijs exit, quæ ad terram *Matth.* sunt, vulgari absinthio similibus, sed quæ in caulibus habentur, longè minoribus, caulibus gracilibus, minuto semine refertis, gustu amaro & odore graui.

LOCVS.

Nascitur in maritimis.

Idem.

QUALITATES.

Specie, & gustu absinthio *Gal. & simile est.* *sim. med.*

VIRE.

Folia per se, aut cum oriza *Diosc.* cocta interancorum animalia; & teretes tineas adiecto melle enecant: aluum leuiter laxigant. Id quod cum lenticula decocta pariter præ-

stant. Eius pabulo pecora maximè pinguescunt.

* ABSINTHII marini genera

A. Absinthij marini Autoris, flosculi, quos in fummo gerit, sublutei tenues, è quibus minutum semen. B. C. Folia eiusdem. D. E. Alia species folijs magis albis, simplicibus, indiuisis. F. Aliud, cum Autoris absinthio marino conueniens, sed magis dissectis folijs. G. aliud à perito rei herbariæ pharmacopæo Veronensi, Francisco Calceolario missum minoribus folijs, ferè quanta hic pinguntur. H. aliud, Bononiæ marinum dictum, folijs minus candidis, fassuginosis cum amaritudine, abundat seminibus paruis, cubitalis est planta, multos ramulos habens. Folia primum nascentia succulenta sunt & viridia ut solet marinis stirpibus euenire. *




† A. ABSIN-

†A. ABSINTHIUM Seriphium Ægyptium & Semen sanctum, Scheha Arabum. *Santonici species maiuscula, & longiusculis foliolis.

F O R M A E T

L O C V S .



† Ægyptium pumila est *Matth.* planta in Ægypto proveniens, folijs minutis Abrotani scemi-
na ferè similibus: surculis cõ-
pluribus gracilibus, breuibus,
ac foliosis, A. minuto semine,
gustu amaro non tamen ve-
hementer.

Semen sanctum planta est
admodum fruticosa, caulibus
& ramis numerosis refertis
minuto semine, oblongoq;,
racematim prodeunte anna-
riusculo gustu, odoreq; non
ingrato. *Folia pusilla sunt,
colore cinereo nostri Absin-
thij æmula. Nascitur in terra
sancta. * Affertur ex Alexan-
dria Ægypti, ac alijs meridio-
nalibus locis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Ægyptiũ ijs omnibus præ-
ditum est facultatibus quibus
& Italicum. Semen sanctum oblinitur passim Saccharo à pharmacopæis, da-
turque vtiliter infantibus & pueris ad intestinorum vermes.

F f 5


* ABSIN-

F O R M A.

Herba est fruticosa Absinthio pontico similis, maioribus tamen folijs candida lanugine pubescentibus, flosculos promit croceo rubore variegatos, è quibus semen paruum amarum acre oritur. tota planta amara est, & cum aromatica qualitate aliqua odorata.

L O C U S.

Nascitur Massiliæ in maritimis, petrosis, apud nos verò culturæ assuetum in hortis habetur.*



ABROTO-

ABROTONVM, Græcis, ἀβρότον. Mauritanis, Catsum, Kefum, seu Gaissum. Italis, Abrotano. Germanis, Stabwurk, siue Schofwurk, siue Gertwurk. Hisp. Abrotano, & Hierua Lombriguera. Gallis, Auron, & Garderobe.

ABROTONVM MAS.



G E N E R A.

Duum est generum, alterū *Matth.* mas, alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Sarmentosa est planta, cau- DIOSCO.
libus gracilibus veluti absinthium. Folia habet tenuia *Matth.*
numerosa, longiusculaq; o-
dore grani sed medicato: Flores mittit exiguos. semen minutum, rotundum, copiosum-
que, ramulos ferè totos comprehendens.

L O C U S.

Nascitur sponte in colli- *Idem.*
bus arido solo, ac etiam passim in hortis colitur.

Q U A L I T A T E S.

Calidum & siccum est or- Galen. 6.
dine tertio. Digerendi etiam, *simp. me.*
ac incidēdi vim quandam habet, rarefaciendi, & morden-
di: tenuium enim est partium.

V I R E S.

Semen crudum tritum, &
ex aqua feruefactum in potu
auxiliatur orthopnoicis con-

nulis, ruptis, ischiadicis, vrinæ angustijs, ac suppressis mensibus. Ex vino autem temporum exitialibus venenis, antidotum est. Horroribus ex oleo illinitur. Serpentes cum substratu tum nidore fugat: quin etiam cōtra eorum ictus potum ex vino prodest: priuatim efficax est contra scorpionum & phalangiorum ictus: oculorum inflammationibus cum pane aut cotoneo cocto commode illinitur. Tritum & cum hordeacea farina coctum, tubercula discutit.

* ABROTANVM fœmina, Chamæcyparissus. Germ. Garten Cypress. Italis, Abrotano femina, herba Camphorata, Santolina, Cipressina, Crespolina.

ABROTANVM FOEMINA.

FORMA.

Herba est fruticosa, lignosis ramis, folijs albis tenuibus minutissime diuisis, & quadruplici ordine, veluti paruis apicibus compositis, odore medicato, sapore amaro, flore aureo corymbaceo, in fastigijs furculorum longis pediculis insidente.

LOCVS.

Nascitur in campis & vineris, apud nos verò hortensis est.

QUALITATES, ET VIRES.

Easdem qualitates ac vires habet, quas Abrotañum mas, Ipsius semen in vsu est ad necandos vermes, si intra corpus sumatur.*



VERO.

VERONICA ita Germanorum Officinis vocata, Italis, *Veronica*. Germanis, *Ehrenpreis*, aut *Grundheyl*.

VERONICA.



univerſum diſcutit, præcipueque quæ in ceruice oriuntur. Datur vtiliter potandus foliorum pulvis drachmæ pondere cum ad peſtilentes febres, tum ipſa peſtilentia affectos cum theriacæ tribus obolis ex vino meracæ; ſed illico affectos ſudare oportet. Datur eadem potanda ex ſua ipſius ſtillatitia aqua contra tuſſim, & omnia pectoris, & pulmonum vitia; quin etiam tabidis, & ſuppuratis: aperit quoque iocinoris, & lienis obſtructiones: vterum, renes, & veſicam expurgat.

GENERA.

Duum eſt generum: Mas, *Matth.* & fœmina.

FORMA MARIS.

Mas caule exit dodrantali, aut minore, ruſcente, lanu- ginosoq; folijs oblongis, hu- mi accubantibus, nigricanti- bus, hirsutis, & in ambitu ſer- ratis: flores edit ſummis cau- libus dilutè purpureſcentes, & ſemen in ſiliquis loculi fa- ciem referentibus. Radice ni- titur renui, quæ in plures di- uaricatur fibras.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

QUALITATES.

Cum guſtu amara adſtrin- *Idem.* genſque manifeſtè appareat, calidæ & ſiccæ facultatis o- mnino fuerit.

VIREs.

Medetur cruentis vulneri- *Idem.* bus, quin etiam diuturnis vl- ceribus. tumores præterea in

VERONICA *femina*, Italis, *Veronica femina*. Germanis, *Chrenpreiß Wabbe*.

VERONICA FOEMINA.

FORMA.

Caulem edit lanuginosum, folia rotundiora minime denticulata, subpinguia, flores ex luteo purpurascens, semen orbicularis vasculis conclusum: radicem maris similem.


LOCVS.

Nascitur in inculto solo & asperis tractibus.

QUALITATES,

ET VIRES.


Non differt à mari, sed ad omnia imbecillior habetur.



Hysso-

HYSSOPVM. Græcis, *ἕσσωπος*. Arabibus, *Cyfe*, seu *Iabes*. Italis, *Hissopo*. Germ. *Cysof*, siue *Dyffop*. Hispanis, *Hissopo hierna*. Gallis, *Hissopo*.

H Y S S O P V M.



dio, sed & tenuium est partium. Aperit, digerit, abstergit, incidit, subducit.

V I R E S.

Decoctum eius cum ficis, melle, & rure potum peripneumonicis, diuturna tussi laborantibus, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis: ventris tinea enecat, cum ficis detritis viridibus deuoratum alvū subducit, sed vehementius addita iridis radice, cardamomo, aut irigone: Crassum enim humorem delinat: & præsertim decoctū ex oxymelite, colorem in corpore fouet. Minuitur hœmorrhœia, & hydropicis cum sicco & nitro: cum feruenti aqua impositum sugillata discutit. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione mulcet. Aduersatur *Matth.* serpentium moribus, cum sale & cumino admodum: Ex oleo illiū pediculis necat, & capitis puriginem tollit: comitiales iunet quouis modo sumptum. Discutit eius vsus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, menses, & vrinas ciet, & febrium horrores excutit, visum acuit. Præstat hæc omnia quoque montanum etiam efficacius.

G E N E R A.

Duum est generum: Hortense, & Montanum.

F O R M A.

Hortense frutex est surcu- *Matth.* lis numerosis ex vna radice pendentibus, lignosis, sesquipedalibus, folijs in vniuerso caule oblōgis duriusculis odoratis feruido, & amaro gustu: Flores edit spicatos in summis caulium partibus ceruleo colore: Radicem multifidam ac lignosam. Montanum surculis folijs floribus, & cæteris in vniuersum partib⁹ nihil ab hortensi differt, nisi quod hirsutius syluestriusque apparet, rudioribus folijs & asperioribus, & gustu amarioribus, nec vsq; adeo acrib. mitescit tamē in hortos translātū, sitq; hortensi per quā similitimum.

L O C V S.

Hortense seritur passim in *Matth.* hortis, & viridarijs. Montanū sponte in montib. prouenit.

Q U A L I T A T E S.

Desiccatur, & exalfacit ordine ter- *Galen. 8.*
fimp. me.
Matth.

GRATIOLA, quibusdam Gratia dei. Italis, *Gratiola*. Foroiulienſibus, *Stachca cauallu*.

GRATIOLA.

FORMA.

Matth. Planta eſt dodrantalis, caulibus quadrangularibus, folijs hyſſopi paulò latioribus, ac longioribus: floribus in purpura albicantibus, amaro admodum guſtu: quadam cū obſcura adſtriſtione.

LOCVS.


Idem. Naſcitur in pratis vliginoſis, & paluſtribus.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, ſiccatur, incidit, attenuat, aperit, deijcit, abſtergit, vulnera glutinat.

VIRES.

Aluum vehementer purgat, bilem pituitamq; deijcit: vulnera celeriter ſanat, ſi triſta ſuperponatur.



CENSURA.

Qui hanc plantam Meſuiſ Eupatorium eſſe contendunt, omnino errant.

STOECHAS, Diosc. *σίζας*. Galeno *Στόρυας*. Mauritanis, *Astochados*, *Astuhorados*, siue *Astuchudes*. Italis, *Stechade*, seu *Steca*. Officinis, *Strichados*. Germanis, *Enchastrant*. Hisp. *Tomani*, *Cantuello*, *Cantuesfo*. Gallis, *Stechados*.

S T O E C H A S.

F O R M A.

Planta est Lauendulae haud *Marth.* absimilis, folijs oblongis, crassius incanis, acervatim in vniuerso caule exeuntibus, scirculis pluribus, ab vno caule fruticantibus: lignosis, flores edit in spicatis, oblongisq; capitulis thymi modo, subcaeruleis, in quib. semen oritur melissophylli non absimile. Radix est illi lignosa ac multifida.

L O C V S.

Prouenit in Stœcadibus in- *Diosc.* sulis, & Massiliæ regione.

Q U A L I T A T E S.

Stœchadis quidem qualitas amara est. Et mediocriter *simp. me.* subadstringens. Cæterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, vnde sanè adstringit: & extenuata altera terrena copiosiore. à qua vtrique amara est: Ob vtrorumque verò conuenientiam, & coitum, refertur, extenuat, extergit, roboratq; tum viscera omnia, tum totius corporis habitum.

V I R E S.

Foliorum & capitulorum decoctum hysopi modo ad pectoris viria efficax *Diosc.* est. Antidori vtiliter miscetur. Deijcit tum pituitam, tum atram bilem. Cere- *Marth.* brum, nervos, & sensuū meatus mundat, ac roborat. Datur vtiliter contra qualescunq; frigidos morbos. Itaq; comitialib. cōueniens fuerit auxilium, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomenta, ac Laconica, quæ ex ipsius decocto, aut vapore fiunt, oclusos narium meatus aperiunt, neruorū, & articulorū cruciatus leniunt, ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinentum tamen ab ea biliosis est, præsertim, si eorum ventriculus sit bile refertus.

ORIGANVM, Græcis, *ὀρίανον*. Mauritanis, *Fandenigi*, *sive Fundenigi*, *sive Fondenegi*. Italis, *Origano*. Germanis, *Fremde* *Wolgethut*. Hispanis, *Oreganos*. Gallis, *Origan*, seu *Mariolaine bastarde*.

ORIGANVM.

GENERA.

DIOSC. Duo eius habentur genera, *Heracleoticum*, & *Onitis*.

FORMA PRIMI.

DIOSC. Folium habet hyssopo non dissimile, umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam: femine in summis virgis haudquaquam denso, amaraci modo spicato.

LOCVS.

Matth. Prouenit in Creta, & Cypro: & alijs *Ægei maris* insulis.

QUALITATES.

Galen. 8. *Heracleoticum* efficacius
simp. me. est onitide, omnes verò incidendi, extenuandi, calefaciendi facultatem possidet, hacq; tertio excessu, obtrinent.



VIRES.

Decoctum cum vino potum demorfos à serpente sanat: Qui autem cicutam aut mæconium hauerunt, ijs ex passio: si verò gypsum, aut ephemerum, ex aceto-mulso propinatur: ruptis, conuulsis, hydropicis cum sicu esui datur. Aridum acetabuli mensura potum, in aqua mulsa, atros humores per alium extrahit, menses ciet & rufsi cum melle delinctum medetur. ad pruriginem, pforam, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest: herba autem substratu serpentes fugat.

ORIGANVM ONITIS, Græcis, *origanos ôpinos*. Italis, *Origano onite*.

ORIGANVM ONITIS.

FORMA.

Câddiorem est folio, & hyf- diosc.
fopo similis: fermen veluti
coniunctos corymbos habet.

LOCVS.

Nascitur in Creta, & alijs *Marth.*
nonnullis Aegæi maris insulis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vis ei origani Heracleoti- diosc.
ei, sed ad omnia minus effi-
cax.



Gg 2


*ORIGA-

F O R M A.

Similimum est Oniti ab Autore depicto, sed nō idem. ab Origano vulgari, cui⁹ icon sequitur, nō multum differt, nisi quod habeat multas, pulcras & oblongas quasi spicas, purpureas. caulis etiam totus purpurascit, semē gignit rufum, pusillum, vt reliqua Origanigenera.

L O C V S.


Crescit in Gallia, prope Monspellium. *



ORIGA-

ORIGANVM vulgare, Italis, *Origano nostrano*. Germanis, *Wolgemut*.

ORIGANVM VVLGARE.



censeo quàm sylvestre Origanum, vt quidam credidere. Huic enim flores candidi sunt, non purpurei.

F O R M A.

Folia mittit amaraci maiora, subhirsutaq; , caules complures pilosos, flores in summitate purpureos in umbellæ multifiidæ modû, radice summa tellure vagante.

L O C V S.

Nascitur inculto solo secus *idem*. itinera, in collibus, & apricis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit quidẽ, quod gustu *Idem*. ita subacris sentiatur, & ficcår quoque similiter, sed haud strenuè. Aperit, digerit, incidit, & resoluit, sed longè mirius quàm præscripta origani genera.

C E N S V R A.

Hanc plantam Pseudooriganum magis appellandum

TRAGORIGANVM, Græcis, τραγορίγανος. Italis, Tragorigano.

TRAGORIGANVM.

FORMA.

Diosc. Tenuis est frutex folio & ramulis syluestri serpyllō simili, quanquam in lætiori solo latioribus folijs inueniatur. atque glutinosis: floribus in summis caulibus subpurpureis.

LOCVS.

Idem. Prouenit copiosum in Cilicia, in Creta, in Chio, Cooque, & apud Smyrnas.

QUALITATES.


Idem. Excalfacit, aperit, attenuat, urinam ciet.

VIRES.

Idem. Decoctum potum bilem eijcit. Bibitur ex aceto vtiliter lienosis, & ex vino contra ixiæ venena. Menses trahit, peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate datur. Grata, ac mitis eius potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti imbecilloque præbetur: item si maritima iactatione nausæ, & æstus præcordiorum excitetur. Tumores verò cum hordeacea farina illita discutit.



PVLEGIUM, Græcis, *Γαλγαν*. Mauritanis, *Alnam*, *Alnegem*, seu *Alnegem*. Italis, *Puleggio*. Germanis, *Poley*. Hispanis, *Poleo*. Gallis, *Pulege*, & *Poulier*.

PVLEGIUM.**FORMA.**

Herba est humi repēs, ser- **DIOSC.**
pylli modo: caulibus dodran-
talibus gracilibus; folijs ama-
raci æmulis, paulò tamē maio-
rib⁹ oblōgiorib⁹q;: flores in
toto caule ad summum vsq;,
per intervalla, propè foliorū
exortū, verticillatim enascun-
tur, colore purpureo langue-
scente. Radix illi gracilis, & ca-
pillosa summo cespite vagāte.

LOCVS.

Nascitur humectis, & vli- **MATH.**
ginosis locis.

QUALITATES.

Cū acre, & subamarum **Galen. 6.**
sit, valde tum excāfacit, tum **simp. me.**
extenuat. Porro quod abūdē
excāfaciat, magnū est signū,
quod illitum rubificat, & ex-
ulcerat quoq;: si diutius tole-
reretur. Quod verò extenuet
satis indicat, cū humida, cras-
sa, & lenta ex thorace & pul-
mone excreatu facilia reddat,
mensēq; moueat.

VIRE.

Potum menstrua, secundas, ac partus eiicit, pulmonis vitia ex melle, & aloe
potum extrahit, & conuulsis auxiliatur: Nauseas, stomachi erosiones ex posca
permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimè contra ser-
pentium morsus, defectos animo recreat cum aceto naribus admotum. Are-
facti cinis gingiuas corroborat. cum cerato varos extinguit. Lienosis cum sale
vtiliter allinitur. Decoctum eius ablutas prurigines mitigat: conuersas vuluas
carrigit, ac eiusdem inflationes, duritiasque in desessionibus mirificè iuuat.
Decoctum potum vrinas ciet: ictericos, & hydropicos curat: capitis, & ner-
uorum affectibus ex frigiditate prognatis succurrit: visum acuit.

DICTAMNVM, Græcis, Δίκταμνος. Arabib. *Mescairemsir*. *Anegen araba*, sine Bari. Italis, *Dittamo di Candia*. Germanis, *Wilder Polcy*. Hispanis, *Dittamo*. Gallis, *Ditamo Real*.

DICTAMNVM CRETENSE.

FORMA.

DIOSC. Cretensis herba est pulegio similis, maioribus tamen Theoph. folijs, quæ tomento quodam libr. 9. de spissa lanugine pubescunt. Rami bisto. 1. tenuioribus, in quorū Vir. l. 12. summis partibus flores exeunt Aeneid. purpurei. Et deinde semen. Rara hæc herba est.

LOCVS.

Theoph. Nascitur in Creta Insula in ibidem. vno tantum loco, ipsoque admodum exiguo.

QUALITATES.

Galen. 6. Tenuiore essentia constat, simp. me. quam pulegiū. cætera illi si- DIOSC. mile. Sed efficacius multo.


VIRES.

DIOSC. Defunctos partus extrahit, non modò potum, sed appositum quoque aut suffitum: succus per se illitus, aut cum hordeacea farina, purgandi vim habet. Herba impectos pedibus, reliquorū corpore aculeos illitu extrahit: valet ad lienis dolorem. Radix eius gustu calefacit, partus accelerat. Succus ex vino potus, auxiliatur à serpente demotis. Tanta herbæ facultas est, ut olfacta abigat feras, quæ venenato ictu seuiant, appensaq; conceptum exanimet: vulneribus ferro illatis, & venenatis ictibus infusus succus, præsentaneum est auxilium.



DICTAMNVM album, Italis, *Dittama bianco*. Germanis, *Gemeiner Diptam-*
Gallis, Diptam bastarde.

DICTAMNVM ALBUM.



F O R M A.

Planta est insignis, spectare *Matth.*
 que pulchritudinis, folijs fra-
 xini adeo similibus, vřa qui-
 budam chamamelia: hoc est
 infima fraxinus appellari so-
 leat. Caulem gerit sesquicu-
 bitalem, rotundum, in cuius
 cacumine flores exeunt pur-
 purei, citrei mali amulos. O-
 dore quadā cum graueolen-
 tia, acuto, nō tamen iniuncun-
 do. Radice nititur diuaticata
 & sæpè singulari, albicante
 tenui intūs marrice, dum re-
 cens est hircum olente, flores
 in triquetras siliquas abeunt,
 scabro exterius cortice, in
 quibus semen.

L O C V S.

Nascitur in collibus, cliuo- *Idem.*
 fis, & saxosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix cuius est vsus amara
 est: excalfacit: attenuat, ape-
 rit & abstergit.

V I R E S.

Valet radix aduersus vene- *Idem.*
 na, & venenosorum animalium.

umidus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra
 frigidos vteri morbos, nam & menses, & secundas, & emortuum foetū educit,
 tum supposita, tum cum pulegio suffusa, tum ex vino meraco duarū drachma-
 rum pondere pota. valet quoq; ad alui torsiones, & ad eijciendos renū calcu-
 los. Additur quoq; vtiliter in portionibus internorū vulnerum. Datur comitia-
 libus, & in alijs cerebri affectibus. Prestat contra pestilentiz contagia, quoquo
 modo sumatur. In summa ad multa radix utilis est: Siliquæ & flores contactu
 pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exuleerant.

C E N S V R A.

Qui album Dictamnium Dioscoridis Tragium esse contendunt, delirio pro-
 caldubio afficiuntur.

PSEUDODICTAMNUM, Græcis, *Pseudodiktamnion*. Italis, *Dittamo falso*.

PSEUDODICTAMNUM

F O R M A.

Matth.

Caulibus exit dodrantalibus, lanuginosis albicantibusque, è quibus folia erumpunt ex interuallis bina, subrotunda, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores exeunt purpurei verticillatique vt in apiastro, & marrubio: sapore pulegij, sed minus acri.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in Creta exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.

simp. me. Pseudodictamnium ad omnia imbecillius dictamno habetur.

V I R E S.

Minus dictamno acre gustu sentitur: eisdem tamen effectus præbet, sed inefficacius multo.



SALVIA

SALVIA Græcis, *Ἐλεβορά*. Mauritanis, *Aelisfacos*, seu *Elisfacos*. Italis, *Salvia*. Germanis, *Salbey*. Hispanis, *Salvia*, & *salua*. Gallis, *Saulges*.

SALVIA.

GENERA.

Duum est generum, *Alte-Theophorum* quidē vrbānum, alterum *li. 6. ca. 2.* sylvestre, quod *sphacelus ap. de histo. plant.*

FORMA VRBANÆ.

Frutex est ramosus, longus, *Diosc.* virgas habens quadrangulas *Matth.* & canas, folia menthæ, maiora, longioraq; asperiora, crassiora, & quæ sensim attritorum quasi indumentorum scabritiem referant, hirsuta, subalbida, odore per quā iucundo sed graui. Flores gignit in *Diosc.* summis caulibus purpureos, sylvestris homini æmulos, & semen quoq; simile. Radice nititur lignosa, fibrosa;.

LOCVS.

Colitur passim in hortis, & *Diosc.* sponte quoq; per se nascitur, *Matth.* arido, & aspero solo.

QUALITATES.

Euidenter calefacit, & *le. Gal. 6.* niter adstringit. *simp. me.*

VIRES.

Menses cit, & vrinas, decoctum foliorum, ramorumq; potum, & partus ex *Diosc.* trahit. Auxiliatur quoq; pastinacæ marinæ icribus: capillos denigrat: vulne- *Matth.* rum sanguinem cohibet, terra vlcera purgat. Foliorum ramorumq; ex vino decoctum fortē testium pruritum tollit. Folia ab utero gerentibus denora- *Actius.* ta, conceptum roborant ac retinent, si eadem fluidæ, laxaq; fuerint, succi hemina cum sale pota, prolificas reddit mulieres, si quarto à secubito die bibatur, & viris deinde semisceant. Datur succus cyathorum duorum mensura vitiliter potandus sanguinem expuentibus. Præstat salvia ad omnes capitis pimitosos affectus, omnēq; articulorum dolores, tam in potionibus, quā in fomentis.

SALVIA.



SALVIA minor, Græcis, Σφάνελος. Italis, *Salvia minore*.

SALVIA MINOR.

FORMA.

Folia habet alterius angustiora, & postrema parte auriculata, caules quoq; tenuiores, cætera verò similia sunt.

LOCVS.


Nascitur spontè in Hispania, & Gallia Narbonensi, exolutis locis. Et scribitur quoque in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Ea omnia præstare valet, quæ *Salvia* maior.

* *SALVIA* CRETICA
BACCIFERA.

In Creta nascitur *Salvia* quædam longe tenerior nostrate, lanuginosiorque & candidior, odore quoque præstat & facultatibus, denique hoc peculiare habet ut globuli quidam rotundi gallarum instar illi adnascantur, quibus vesci solent incolæ cum pane.*



MENTHA,

MENTHA, Græcis, ἡ μέντα. Arabibus, Nahanaba. Germanis; Minz. Hispanis, Hierua buena, & Ortelana. Gallis, Mente.

MENTHA.

GENERA.

Duum est generum sativa, *Matth.* & sylvestris. Atqui sativa duum quoq; generum est, alterum maius, alterum minus.

FORMA MAIORIS.

Planta est odorata, folijs sal- *Matth.* uia minoribus, per ambitum denticulatis, caulibus numerosis, floribus in summitate spicatis, subpurpureis, pilosisque, viua admodum est, nante in hortis semel tantum sata, tam restibuli fertilitate durat, vt vix in posterum extirpari possit.

LOCVS.

Seritur passim in hortis. *Idem.*

QUALITATES.

Gustu est acris, calidaq; fa- *Gal. 6.* cultate prædita, ex tertio qua- *simp. me.* dantenus excalfacientium ordine, sed minus excalfacit quam calamintha. Habet & in se quiddā amarum, & acerbum: substantia est tenuium partium. Adstringit quoque *Diosc.* ac siccatur.

VIRES.

Succus ex ætæo potus sanguinem sistit: teretes ventris tineas necat: venem stimulat. Terni rami cum acidi mali punici succo poti, singultus, vomitiones, choleraq; sedant: Folia cum farina hordeacea illita, suppuraciones discutunt. Mammæ item tensas, aut lacte turgentes compescit. Cum sale canum, morfib; illinitur: vuluæ antè coitum admota, conceptionem impedit. Lac coire non patitur in ventriculo, si folia lacti immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarè gratiam habet. Aqua stillaritia è tota menthæ planta puerperarum mammis cum linteolis admota lactis concretionem inhihet, animum olfactu excitat, vlcera manantia in infantium capitibus mirè sanat.



MENTHA altera, Italica, Menta minore, siue Menta gentile.

M E N T H A A L T E R A.

F O R M A.


Marth. Folijs exir breuioribus angustioribusque : caulibus rubentibus, floribus quoque rubentioribus : eximio odore.

L O C V S.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridarijs.

**Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.**

Idem. Ea omnia potest, quibus alteram prestare diximus.



M E N T H A.

MENTHASTRUM; siue Mentha sylvestris, Græcis, *ῥέγιον* & *ῥέγιον*. Italis, *Mentastro*. Germanis, *Wildt Rung*. Gallis, *Mente cheuahne*.

MENTHASTRUM, SIVE
MENTHA SYL-
VESTRIS.



Instillatur succus vermiculosis auribus. Item tum potus, tum restibus illitus nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur potus, regio morbo affectis: strumosos illitus iunat: ex aceto potus ventris animalia pellit: Folia tam pota quàm illita, præstant aduersus venenosorum ictus.

FORMA.

Folia profert menthe longè maiora, hirsutiora, ac candidiora: caules cubitales, & flores spicatos, colore subpurpureo, tenuibus vndeque pilis: bene quoque olet.

LOCVS.

Nascitur plerunque vligi- no solo: & propè riuos aquarum.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, adstringit, incidit, & aperit.

VIREs.

Suffiti vapor fecundas à partu purgat. Datur eius decoctum vili ter anhelosis, & ægrè spirantibus, quin etiam mulcendis torminibus qui à flatu oriuntur. Substratū, vel accensum serpentes fugat.

MENTHA

MENTHA Græca, Italis, *Menta Græca*, siue *Salvia Romana*, siue *Herba di Santa Maria*: Nonnullis *Lassulata*. Gallis, *Coch.* Germanis, *Unser Frauen Wüning*.

MENTHA GRÆCA.

FORMA.

Matth.

Folijs exit saluiaz longioribus latioribusque betonicæ faciem quadatenus referentibus, circumquaq; serratis: caulibus cubitalibus: nonnunquam maioribus: in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, melino colore. Planta est in vniuersum amara, non tamen vehementer, subadstringens, & grauiter odorata.

LOCVS.

Idem.

Habetur satis copiosa in hortis.

QUALITATES.

Excalfacit, siccat, aperit, roborat, abstergit, & prouocat.

VIRES.


Idem.

Auxiliatur vterinis affectibus: frige factum iecur excalfacit, & vasorum obstructions aperit: illinitur ex irino, aut nardino oleo lienosis, & ex vino feruifacitæ urinæ suppressionibus: Lentigines, alphas, & alias cutis seditates emaculat, illitus noctibus succus: idem Lumbricos enecat: ventriculum roborat: haustus, quàm illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tam substrum, quàm suffitu serpentes abigit, & eorum venenis resistit, quin etiam infarctus expedit, & caput roborat.



CALAMINTHA, Græcis, Καλαμίνθα. Arabibus, & Officinis, *Calamentum*. Italus, *Calamento*. Ethruscis, *Nipotella*. Germanis, *Wilder-Poley*. Hispanis, *Neuada*. Gallis, *Poullio sauvage*.

CALAMINTHA.



habet. corpori autem exterius admora, primum quidē valde excalfacit, & mordicat, cutemq; laniat, postremo etiam exulcerat.

V I R E S.

Foliorum, florumq; decoctū porum: menses, & vrinas pellit, ruptis, conuulsis, egrē spirantibus, torminibus, horroribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat: ex vino præsumpta venenis resistit. Tineas, cæteraq; interiorū animalia, cū sale, & melle pota enecat. Elephāticis esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. folia detrita, & ex vellere supposita, menses eliciunt: partus enecant: Accensa aut substrata, serpentes fugant: Ex vino cocta, & illita, nigris cicatricibus candorem reddunt: succus vtiliter instillatur vermiculosis auribus.

Hh

CALA.

G E N E R A.

Trium est generum: Prima *Dioscori* quam nepetā Latini vocant, Montana altera, & altera menthastro cognata.

F O R M A P R I MÆ.

Folijs oritur pulegio maioribus, subrotundis, hirsutis, per ambitum leuiter serratis, caulibus cubitalibus, angulosis, foliosisq; atq; pilosis. Flores edit exiguos, purpurascētes, qui à medio caule vsq; ad summum, vt in pulegio erumpunt, at in cacumine copiosiores habentur. Radices tenues, multifidasq;.

L O C V S.

Nascitur in inculto solo, in *Idem*. apricis, collibus, secus itinera & sepes.

Q U A L I T A T E S.

Essentia est tenui, & calida, *Gal. li. 7.* siccaq; réperie, ex tertio quodammodo ordine. Horum manifesta sunt inditia partim gustu apparentia, partim experientia cognita: Gustu siquidē acris, & palam calida est, ac paululum omnino subamari

Diosc.

CALAMINTHA montana, Græcis, Καλαμίνθα ὄρειν. Italis, Calamento, *sive* *Nepotella montana*. Officinis, *Calamentum montanum*. Germanis, Bergminz.

CALAMINTHA MONTANA.

FORMA.


DIOSC. Folia habet ocimi, incana, furculos, & caules angulosos, & purpureum florem.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in Montibus.

QUALITATES, ET
VIRE.

DIOSC. Paribus cum nepera tum
qualitatibus, tum viribus præ-
stat.



CALA.

CALAMINTHA aquatica. Italis, *Calamento aquatico.* Græcis, *Καραμίνδα ἁερυ-*
δης. Germanis, *Wassermünz* / *Wasserpoley* / *Groschmünz.*

CALAMINTHA AQUATICA.

FORMA.

Menthaestro cognata est, fo- **DIOSC.**
 lijs oblongioribus hirsutisq;
 caule, & ramis maioribus,
 quam superior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem.*
 asperis, & aquosis locis.

**FACULTATES, ET
 VIRES.**

Suis in viribus, & faculta-
 ribus, cæteris inefficacior est.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Gatta-
 riam herbam tertiam cala-
 minthæ speciem esse contem-
 dunt.



HERBA gattaria, Italis, *Herbagatta*. Germanis, *Nept Zam Ragentrant*.
HERBA GATTARIA.

F O R M A.

Muth. Planta est vulgaris notitiæ, folia mittens apiastri, aut vriticæ æmula, sed incana, & minora, caules edit quadrangulos, bicubitales, ramos numerosos, & pariter in canos, flores albos circa caules, at qui in summitatibus exeunt, spicati spectantur: Radices habet multifidas: odor vniuersæ plantæ acutus, caput feriens.

L O C V S.

Idem. Nascitur in campestribus, & in agrorum marginibus.

Q U A L I T A T E S.

Feruido quidem gustu herba est, cum amaritudine haud obscura, exalfacit, & siccacalaminthæ modo.



V I R E S.

Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, ac vteri morbos, à pituita gentos, menses elicit tam pota, quàm in deflctionibus addita. herbæ vsus steriles prolificas facit, vbi causa fuerit ab humida frigidaq; intemperie: succus manibus inditus, pituitam valenter trahit, & visum acuit: In summa vbi exalfacere opus sit, Gattaria plurimum præstat.

THYMVM, Græcis, Θύμος. Mauritanis, Hæset. Italis, Timo. Germanis, Thym-
schet Quendel. Hispanis, Tomilho salsero. Gallis, Tim, seu Mariolaine de Angle-
terre.

THYMVM.



GENERA.

Duum est generum: Can- Theoph.
didum & nigrum. lib. 6. c. 2.
de plant.

FORMA.

hist.

Surculosus est frutex, ex- DIOSC.
libus folijs, multis, & angu-
stis circumdatus: capitulis in
cacumine flore purpurascen-
te refertis.

LOCVS.

Gracili solo & petroso pro- Idem.
uenit.

QUALITATES.

Thymum incidit, & exal- Gale. 6.
facit manifestè. simp. mo.

VIRES.

Cum sale, & aceto, pitui- DIOSC.
tam per aluum detrahit. De-
cocti ius prodest Orthopnoi-
cis, & anhelatoribus: tincas

ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit. urinas ciet. Ex melle delinctum
faciles reddit excreationes. Recentes tumores discutit cum aceto illitum: con-
cretum sanguinem dissolvit: peniles verrucas tollit. Ischiadicis illitum cum
vino, & polenta subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest.

SATVREIA, Græcis, Θύβρα. Italis, Coniella, Sauoreggi, seu Satareia.

SATVREIA.

G E N E R A.

Matth. Duo eius sunt genera, Alterum quidem thymæ cognatum, Alterum vero fruticosius, & maioribus folijs.

F O R M A P R I O R I S.

Diosc. Thymo tota ferè facie similis est, minoribus tamen folijs, & caulibus, & tota planta tenerior, spicam deferit florum plenam coloris herbacei. Aut in purpuram languescens.

Matth.

L O C V S.


Idem. Gignitur in apricis, aspero, & arido solo, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Paulus. Tymbra sylvestris eadem, quæ thymum præstat: Hortensis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum usum gratior, & accommodatior habetur.

V I R E S.

Diosc. Eadem potest, quæ thymum, si modo consimili sumpritetur.



SATVREIA altera. Italis, Coniella, seu Sauoreggia maggiore, seu Penicella. Germanis, Pfeffertraut/Klester Zsop/Saturon.

SATVREIA ALTERA.

FORMA.



Ramis multis fruticat, rotundis, atque lignosis, folijs thymo maioribus, subasperis, quæ circum sarculos plura simul per interualla erumpunt: è quorum exortu spicati quidam processus, foliolis quibusdam cæteris longè minoribus stipati prodeunt, è quibus flores exeunt parui, ac subpurpurei. Radice nititur multifida.

LOCVS.

Non solum feritur in hortis, sed sponte per se nascitur in apricis collibus, & in torrentium alueis.

QUALITATES.

Thymo suis in qualitatibus Idem. similis est, proinde excalfacit, attenuat, aperit, incidit, digerit, & aperit.

VIRES.

Vitis ab altera non differt, Thymi enim facultatibus omnibus refer- Idem. uat.

SERPIELLUM, Græcis, *Ἐριλλός*. Mauric. *Hemen*. Italis, *Serpillo*, seu *serpello*. Germanis, *Quendel*. Hispanis, *Serpollio*, seu *serpam*. Gallis, *Serpules*.

S E R P I L L U M.

G E N E R A.

DIOSC. Duum est generum, Hortense alterum : Alterum sylvestre, & huius quoque duo sunt genera.

F O R M A H O R T E N S I S.

DIOSC. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, odore sampsuchi, floribus subpurpureis in spicatis capitulis: gustu admodum acri. Non serpit humi, sed ad palmi altitudinem increfcit.

Plinius.


L O C U S.

Matth. Seritur in hortis non solum ad coronas, sed ad ciborum quoq; vsum.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Vsq; adeo excalfacit, vt & menses, & vrina moueat: est simp. me. autem & gustu admodum acre. Excalfacit, exiccat, digerit, incidit, & aperit.

Matth.




V I R E S.

Menses potu, & vrinam ciet: Torminibus, ruptis, vulsisque auxiliatur: adversus serpentes, potu illiruve prodest. Diurnos capitis dolores mulcerum rosaceo, & aceto fincipiti illirum, verno sos iuuat: succus cruentos vomitus sedat, drachmarum quatuor pondere ex aceto potus. Additur belle inciborum condimentis.

SERPILLVM syluestre, Græcis, Ερπυλλας ἄγριος. Italis, Serpollo, seu Serpillo salu-
sico.

SERPILLVM ALTERVM.



GENERA.

Aliud satureiatum, hoc est *Theoph.*
satureiæ odore : aliud citrea- *lib. 6. c. 7.*
tum, quod citrei mali odorem *de plant.*
resipiat. *hist.*

FORMA.

Ramulos, quod zigis appel- *Diosc.*
latur, edit tenues, furculosos; *Matth.*
folijs refertos longioribus,
durioribus, angustis. Flores
iucundè olent. Quod verò ci-
treum malum resipit, latius
prouenit, humi repens, leuio-
ribus folijs in girum sese vnà
cum ramusculis diffundenti-
bus.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & mon- *Idem.*
tibus apricis.

QUALITATES, ET
VIREs.

Omnia genera paribus pol- *Idem.*
lent facultatibus, verum ta-
men syluestre ad omnia valen-
tius habetur.

Hh 5

AMA-

AMARACVS, Græcis, Σάμφορον, ἁμάρακος. Italis, & Officinis, *Maiorana*, Etruscis, *Perfa*. Arabibus, *Merzenius*, seu *Morsanguis*. Germanis, *Meyeran*. Hispanis, *Maiorana*. Gallis, *Maroue*, seu *Mariolaine*.

G E N E R A.

A M A R A C V S.

Matth. Duum est generū maius, q̃ vulgò cognitū est: & minus, quod tenuifolium vocatur.

F O R M A M A I O R I S.


Idem. Herba est ramosa: caulibus tenuibus obsequiosis, folijs oblongis incanis, pilosisq; cauliculos circūquaq; vestientibus, flores edit in summis caulibus spicatos, herbacei coloris, compactili squamarum congerie, vt in origano: è quibus minutum oritur semē. Radicem habet lignosam, ac multifidam, seritur semine, furculo ac viuiracide.

L O C V S.

Idem. Colitur in hortis, & scitilibus: In Ægypto autē, Cipro, & Cizico spontè prouenit.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Tenuium est partium, ac
simp. me. digerentis facultatis. Desiccatur enim & exalfacit ordine tertio. Planta est odorata tota, & in medicamentis ad plura admodum utilis. Digerit, attenuit, aperit, & roborat.




V I R E S.

Diosc. Succus decocti potus conuenit hydropicis iam incipientibus, & ijs, quorū rinæ difficultas, & tormina excruciant: folia ex melle illita sugillata delēt. Menfes trahunt ex pello subdita: illinuntur scorpionum ictibus, additis sale, & aceto. luxatis, tumoribusq; cerato excepta imponuntur: profunt ad oculorum inflammationes cum hordeaceæ farinæ polline illita. Præstat amaracus ad omnes frigidos capitis, & neruorum affectus, tam illita, quàm pota: foliorum succus naribus infusus pituitam à capite trahit, & cerebrum roborat: valet ad pectoris vitia. stomacho utilis est, tum pota tum illita herba: iocinorosos, & lienosos iuuat: confert ad vteri flatus ac cæteros eiusdem frigidos morbos.

Matth.

AMARACVS tenuifolia, Græcis, Σάμψνον, & ἀμάρακος λεπτοφυλλος. Italis,
 Maiorana gentile. Etruscis, Persa gentile.

AMARACVS TENVIFOLIA.



FORMA.

Amaracustenuifolia, folijs, *Matth.*
 cauliculis, floribusq; exit te-
 nuioribus, & odore longè præ-
 stantiori.

LOCVS.

Colitur à mulieribus Italis *Idem.*
 in fictilibus, & in hortis.

FACULTATES, ET
VIRE.

Ea omnia præstare potest, *Idem.*
 de quibus in altero diximus
 genere.

SER-

SERTVLA Campana, Græcis, *Melilotos*. Arabibus, *Alchimel melueb*. Italis, *Meliloto*. Hispanis, *Corona de Rei*. Germanis, *Ziger Kraut*.

MELILOTVS SIVE SERTVLA CAMPANA.

FORMA.

DIOSC. Planta est cubitalis, statim à radice fruticosa, ramis exilibus, folio trifolio proximis, floribus melinis, parvis, siliquis repandis, numerosis, pluribus, è ramusculorum cacuminibus dependentibus, in quibus semen concluditur minutum, subrotundum, odoris non ingrati, cuius est vsus.

LOCVS.

DIOSC. Nasceitur in Campania circa Nolam, quin etiam in Cizico, & Calcedone.

QUALITATES.

Galen. 6. Mistæ facultatis est: habet
sim. me. enim quiddā adstringens, sed
& digerit, & concoquit. Copiosior enim in ea est substantia calida quam frigida.

VIREs.

DIOSC. Inflammationem omnem emollit, præsertim, quæ in oculis, vtero, sede, & testibus erumpunt, si ex passo cocta illinatur, addito oui luteo affato. Recentes meliceridas per se cum aqua & vlcera in capite manantia, illita cum cretachia, vino aut galla sanat: Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat: Doloribus aurium mitigandis, cruda ex passo instillatur: In aceto aut rosaceo calefacta capitis dolorem lenit.

CENSURA.

Cum veræ legitimæq; meliloti semen, cuius debet esse vsus, ad nos non deferatur: nonnullis sylvestris loti flores, quidam cuiusdam aurei Trifolij ipsius vice vsurpant, sed neuter tamen meliloti vim possidet.



MARVM, Græcis, Μάρων. Italis, Maro.

MARVM.



FORMA.

Surculosa est planta: flore Diosc.
origani, odoratiore, folijs
multo candidioribus.

LOCVS.

Nascitur in Cizico; & iuxta Diosc.
Magnesium copiosissima. Gale.

QUALITATES.

Herba est parùm acris, a Galen. l.
maraverò plurimum. de Anti.

VIRES.

Vim habet sisymbrio con- Diosc.
similem: substringit enim &
modicè calefacit: qua de cau-
sa illita serpentia vlcera sistit,
& in calidas illitiones addi-
tur.

RVTA,

RUTA, Græcis, *Πήγανος*. Mauritanis, *Sedeb*, seu *Sedab*. Italis, *Ruta*. Germanis, *Kauten*, seu *Weinraut*. Hispanis, *Aruda*. Gallis, *Rut*.

RUTA.

G E N E R A.

Matth. Satiua altera, altera verò sylvestris, quæ duplex habetur. Montana, & quæ peculiariter Harmola dicitur.

F O R M A S A T I V A.

Idem. Planta est perpetuo virens, folijs crassiusculis, subpinguibus, ex angusta origine in latitudinem sese pandentibus; colore saturate viridi. Ramos mittit copiosos, furculososque, flores in summitate luteos, hyperici æmulos, è quibus capitula oriuntur quadruplici apice coronata, in quibus pusillum continetur semen nigro colore.

L O C U S.

Matth. Seritur in hortis, apricis gaudet, & siccis, terraq; maximè lateritia.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Excalfacit ordine tertio: est
simp. me. autem non solum gustu acrised amaro. itaq; digerit atque incidit crassos lentosque humores. Est & tenuium partium.



V I R E S.

Diosc. Vrinam ciet: menstrua pellit. Lethalium medicamentorum antidotum est, & præsertim semen potum: folia cum iuglande, & sicu præsumpta, inefficaces venenorum vires reddunt, & pestilentie contagia superant. Contra serpentes, eodem modo sumere conuenit. Sumpta genituram extinguit, cum anetho sicco decocta tormina sedat: Pota ex oleo feruefacta, ventris tineas excutit: Hydropicis vtiliter cum sicu illinitur: Deuorata visum acuit. Succus in malicorio calefactus aurium doloribus efficaciter infunditur. Trita, & indita sanguinem è naribus fluentem sistit: Mansa ceparum & aliorum acrimoniam domat.

RUTA

RUTA sylvestris, Græcis, Πήγανος ἄγρια. Italis, Ruta saluatica. Germanis, Wilderauten.

RUTA SYLVESTRIS.



FORMA.

Folijs, caulibus, ramis, floribus *Marth.* & capitulis hortensi similis est, sed folijs gracilioribus, caudice verò crassiori, lignoso, ac firmo, acriori quidem, & amariori gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus saxosis, & *Idem.* apricis.

QUALITATES.

Ex quarto est ordine excalfaciens *Gala.* tium. Itaq; hortensi valentius admodum operatur. *sim. me.*

VIRE'S.

Si copiosius estur interficit: si colligatur dum florem promit, cutem inflat, *Diosc.* & rubore cum pruritu vehementi inficit. Itaque perunctis manibus, & facie, eam colligere oportet. Semen eius porum contra intestina vitia efficax est. In antidota commodè additur. Prodest comitialibus & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat, & utpote noxia herba cibis abdicatur.

RUTA

RUTA sylvestris altera, Græcis, Πήγανον ἄγριον, ἢ ἀγρίον. Arabibus, Harmel.
Italīs, Ruta saluatica secunda.

RUTA SYLVESTRIS HARMOLA.

F O R M A.


Diosc. Frutex est, qui ab radice plures emittit caules folijs multo, quàm alterius rute longioribus, tenerioribusque, odore graui, floribus candidis, è quibus capirula summis ramis oriuntur, satiuæ rutæ maiora, tenuibus quibusdam foliolis, ipsisque acutis circumquaq; stipata. in quibus triangulum occluditur semen; subruso colore & amaro gustu.

L O C U S.

Diosc. Prouenit in Cappadocia, & Galatia Asiæ finitima, in collibus, & læto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Vis eius tenuium est partium, & calida tertio abscessu: Ideo crassos humores secat, & digerit, & vrinam ciet.



V I R E S.

Diosc. Semen cum melle, vino, croco, & foeniculi succo, ac gallinæ felle, tertium
Matth. contra retusam oculorum aciem: cætera cum sylvestri ruta paria habet.

GALEGA, siue Ruta capraria. Ethruscis, *Lauanese*. Germ. *Geißkrauten*.

GALEGA SIVE RUTA CAPRARIA.

FORMA.

Caulem mittit sesquicubitalem, ramosum, folia è ramis vtrinq; prodeunt dena vnde nave ab vno pediculo emergètia, oblonga, subpinguiaq; flores in summitate purpurascens, è quibus siliquæ oriuntur semen continentes.

LOCVS.

Prouenit passim secus itinera, in scrobium aggeribus, & lato solo.

QUALITATES, ET VIRES.

Vis illi maxima contra pestilentiā: plurimos enim huiusce plantæ vsu præseruatos scimus: mirificè quoq; valet aduersus lethalia venena omnia, & contra ferarum omnium venenosos ictus, in quem vsum succum bibendum iubent. & herbam ipsam

vulneri admovent. Datur succus ad cochlearis mensuram necandis intestinorum vermibus. Datur idem vtiliter in principio pestilentia affectis, aut eius decoctum, ex aceto paratum, addita theriaca, & Armenio bolo. verum à potu sudare ægrum oportet. idem præstat ad pestilentes febres in quibus exanthemata, siue maculæ cutaneæ quas pestechias vocant, emerferint. Quæ quidem omnia, sua ipsius speciali dote planta hæc præstat.

MOLY, Græcis, Μῶλυ. Italis, Moli.

F O R M A.

M O L Y.


Diosc. Folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, magnitudine violæ purpureæ æmulum lactei coloris: caulem cæcidum quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod alij speciem referat: Radix parva bulbosa.

L O C U S.

Plin. Nascitur circa Pheneum, & in Cilene Archadiæ.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Contraheñtis est facultatis. Mirum in modum valet ad vuluæ apertiones, si trita cum Irino vnguento in passo subijciatur.



PANA.

PANACES Heracleum, Græcis, *πάνακες ἡρακλείου*. Arabibus, *Steusir*, *siue Ieusir*. Italis, *Panace Heradio*. Huius lachryma, Græcis, *ὕψοπαράξ*. Latinis, *Opopanax*. Officinis, *Opopanacum*. Italis, *Opopanaco*. Hispanis, *Opoponaque*.

PANACES HERACLEVM.



F O R M A.

Folijs est asperis ad terram ia- **Diosc.**
cēribus, herbacei coloris, mul-
tum ad ficulnea accedentibus,
in ambitu quinq; partito diui-
fis. caule vt ferulæ altissimo, la-
nugine quadam canescente.
folijs etiam minutoribus re-
fertus: muscarijs ceu anethi in
cacumine: luteis floribus, & fe-
mine subamari gustus.

L O C V S.

Nascitur in Cyrene Lybiæ, *Idem.*
& Macedonia.

Q U A L I T A T E S.

Opopanax ipse ad plurimos
est vsus aptissimus, vt potè ex- **Galen. 8.**
calfaciens, emolliens, digerēs: *simp. me.*
excalfacit ordine tertio, & sic-
cat secundo. Cortex radices,
exiccatorium simul & excalfa-
torium est medicamentum,
sed minus quàm succus; quin
& nonnullam habet extergen-
di facultatem: fructus calidus
& ipse est, ac mensibus mouen-
dis accommodum.

V I R E S.

Opopanax conuenit febrium horroribus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, **Diosc.**
torminibus, & vrinæ stillicidijs: bibitur ex vino aut aqua mulsa contra vesicæ
scabiem: Menses trahit, vteri inflationes, duritiasq; ex melle dilutus discutit.
Ichiadicis vtiliter illinitur. carbunculos rumpit: cauis dentium inditus dolo-
rem mulcet. Illinitur commodissimè vnà cum pice mistum rabidarum bestia-
rum moribus: concisa radix, subpositaq; partus extrahit: Ad vetera vlcera effi-
cax est. Ex melle illita nudata ossa carne circumuestit. Semen cum Absinthio
potum menses pellit, cum aristolochia præstat ad venenosorum animalium i-
ctus: & bibitur in vino contra vuluæ strangulatus.

PANACES Asclepium, Græcis, πᾶνῶν ἀσκήσιον. Italis, Panace Asclepio.

PANACES ASCLEPIUM.

F O R M A.

Diosc. Caulē emittit tenuem, geniculatum, circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cacumine umbella habetur, ubi flores emicant aurei, acris gustus, & odorati. Radix parua est, tenuis, & amara.

L O C U S.


Matth. Prouenit in montibus apicis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Minus est calidum, quàm simp. me. heracleum.

V I R E S.


Diosc. Flores & semina ex melle illita, contra vlcera, phagedenas, & tubercula auxiliarem vim habent: bibuntur aduersus serpentium morsus ex vino, & illinuntur ex oleo.



PANAX

PANAX chironium, Græcis *πάναξ*, siue *πάναξ χείρων*. Italis, *Panace chironio*.
Herbarijs quibusdam flos solis. Germ. *Heyden Jfop*.

PANAX CHIRONIVM SIVE FLOS SOLIS.



FORMA.

Folium habet amaraco si- Diosc.
mle. flos aureus, radix parua,
siue tenuis, quæ non altè de-
mittitur: gustu acri. Flos au- Matth.
tem solis, quem panacem chi-
ronium nonnulli faciunt, sur-
culos mittit ab radice nume-
rosos, tenues lignososque, in
quibus folia sunt oblonga hyf-
sopi ferè æmula, cõcomitan-
tibus minoribus foliolis cu-
mulatim prodeuntibus: flo-
rem pentaphylli, aureum, sed
maiores. Radicem item li-
gnosam adstringenti gustu, mi-
nimè acri.

L O C V S.

Nascitur flos solis in mon- Matth.
tibus, & collibus apricis. Chi- Diosc.
ronium verò panax in Pelio
monte.

FACULTATES.

Panaces chironium, facul- Gal. 3.
tatem Asclepij similem ha- simp. me.
bet.

V I R E S.

Pota panacis chironij radix serpentium venenis resistit: illita coma eadem Diosc.
præstat. Solaris verò floris vis conglutinandis vulneribus ac sanguinis fluxioni Matth.
cohibendæ admodum efficax est. sanat quoq; tum oris, tum pudendorum vlce-
ra. Datur quoq; vtiliter ad cruenta spura, & ad dysenteriam, cum radicibus con-
tritius. In summa, vbi agglutinare, cohibere, roborare sit opus, ea omnia perin-
de præstat, ac omnia symphitorum genera.

C E N S V R A.

Falluntur qui solis florem chironium esse panacem putant, cum autem pa-
naces chironium, Asclepij vires habeat, & excalfaciat, & radicem habeat acrem
non video cur ijs subscribere queam.

* *PANAX chironium minus*, Flos solis minor, Græcis ἡλιάσθριμος λεπτύφυλλος.

PANAX CHIRONIUM MINUS.

F O R M A.

Non discrepat forma à præcedente, sed magnitudine sola, & foliorum angustia.

L O C U S.

Nascitur in locis incultis apricis, omnemque cultum respuit ut prior.*



*HELL

**HELIANTHEMUM Peruvianum*. Flos Solis. Sol Indicus. Germanis, Sonnenblum.

HELIANTHEMUM PERUVIANVM.

F O R M A.

Semestrium herbarum omnium facile maxima est, si excipias, quæ pedamento egent. Caulis fere brachium æquat crassitudine, pedes vero vixenos longitudine superat. Huic folia lata, crenata, in mucronem collecta vegeti adiungunt pediculi. Fastigio insidet capitulum strobilo simile. Sed rotundius latiusque quod in florem tandem explicatur amplissimum, stellato umbone, folijs oblongis aurei coloris ceu radijs cincto, quæ ubi decidere post se relinquunt semen ordine dispositum in alucolis ceu apurafauis.

L O C V S.

Nascitur in Peru & nunc in multis hortis etiam apud nos inuenitur.

Q U A L I T A T E S.


In secundi gradus sine calida putatur & sicca in eiusdem principio.

V I R E S.

Multa æstimationis est ad glutinanda vulnera eius gummi & vniuersa plantavim diureticam sortita est, atq; ad expellendos calculos efficacem.*

*HELIANTHEMON PERUVIANVM Proliferum.

Differt à priore multitudine florum. Maximus enim in fastigio summo flos expansus, numerosa sobole inferius annata circundatur, id quod interdum naturæ luxu, interdum industria fieri solet.*



LIGVSTICVM, Græcis, *Ανθισάνον*. Italis, *Ligustico*. Germanorum vulgo, *Wilder Diptam*, & *Kostfümmich*; alijs *wilder Galgan*.

LIGVSTICVM.



F O R M A.

Cauliculum fert anethige- **Diosc.**
nicularum, tenuem, & in cir-
cuitu folia ferrulæ campanæ
molliora, odorata prope ver-
ticem graciliora, & longè ma-
gis diuisa: in cacumine musca-
rium, in quo semen dependet
nigrum, solidum, & oblon-
gum, sceniculo proximum, a-
cre, & aroma olés. Radix can-
dida, & odorata, Heracleotici
panacis similis.

L O C V S.

Gignitur in altissimis, aspe- **Idem.**
risq; montibus, ac vmbrosis,
maximè circa fluenta.

Q U A L I T A T E S.

Radix & semen ex genere *Gal. li. 7.*
excalfacientium sunt, adeò vt *simp. me.*
vrinas cieant, menses prouo-
cent, & flatus discutiant.

V I R E S.

Radicis, seminisq; vis, excalfactoria est, & concoquens: prodest ad intesti- **Diosc.**
nos dolores, & ventriculi inflationes, præstat contra serpentium ictus, vrinas
& menses potu trahit. Idem præstat apposita radix.

LIGUSTICVM alterum, Italis, Ligustico falso.

LIGUSTICVM ALTERVM.

FORMA.

Matth.

Caule exit ferulaceo, alis frequentibus, è quibus rami disparibus exeunt interuallis: folijs quinque ex vno petiolo prodeuntibus, per ambitum serratis, Muscarijs fœniculi similibus: semine quoq; simili, sed longiore, crassioreque: Radice nititur vegetiore, exterius subnigra, acuto simul, & subamaro gustu, odoris nō iniucundi.

LOCVS.

Idem.

Gignitur in altis mōtibus: apicis tractibus.

QUALITATES,
ET VIRES.


Idem.

Radicis & seminis vis ex-calfactoria est: flatus pellit, frigefacta viscera iuuat, & vrinam mirificè ciet.



PASTINACA domestica, Græcis, Σταφυλινόν. Arabib. *Iezar*, *Gezar*, seu *Giezar*, Italis, *Pastinaca domestica*. Germanis, *Pasteneu*, seu *Pastinachen*. Hispanis, *Cañoria blanca*. Gallis, *Pasterades*.

PASTINACA DOMESTICA.



GENERA.

Duum est generum, alterum domesticum, alterum agreste.

FORMA.

Domestica caule exit crasso, striato, folijs Elaphobosci maioribus, pluribus utrinque ex vno pediculo prodeuntib. terebinthi modo, subasperis, & per ambitum denticulatis, umbellas magnas in summitate gerit, floribus melinis, semine forniculi maiore, acuto, & amariuscule gustu, odoratoq;. Radicem habet crassam, teneram, albam, odoratamq;, non sine adnatis. *Matth.*

LOCVS.

Seritur passim ab olitoribus in hortis, sumiturque frequenter in cibis. *Matth.*

QUALITATES.

Pastinaca sativa imbecillior, sylvestris ad omnia potentior est; vrinas mouet, & menses prouocat, tum herba quidem tota, tum maximè se-

menacradix. Habet porro etiam absterforium quippiam.

VIRE S.

Semen potum vel admotum, menstrua mouet, atque eos iuuat, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateris dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Prodest & serpentium moribus, nam id præsumentes serpentium ictu non affici tradunt. Conceptus adiuvat. Radix vrinam pellit, venerè stimulat, partus admora cijs, folia trita, & cum melle imposita, phagedænas vlcerum purgant. Atqui hæc omnia sylvestri inefficacior, & in cibo aptior.

PASTINACA sylvestris, Græcis, Σταφυλίη ἀγροῦ. Italis, Pastinaca saluatica.
Germanis, Wild Möhren.

PASTINACA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Diosc. Folia habet gingidij latiora subamara, caulem rectum, scabrum, umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam. Radix illi est dodrantalis digiti crassitudine odorata, quæ cocta manditur. Semē habet pilosum, acre, & odoratum.

Matth.

L O C U S.

Matth. Prouenit campestri, ac læto solo, locis præsertim incultis, & in collibus amœnis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Ad omnia potentior est, **simp. me.** quàm satiua, magis enim aperit, & magis abstergit.


V I R E S.

Diosc. Præstat omnia quæ domestica, sed longè quidem valentius operatur.



CAROTA, Italis, *Carota*, & *Carotola*. Germanis, *Rot und weisse Möhren*.

C A R O T A.



G E N E R A.

Duum est generum, alterū *Matth.* radice rubra, alterum alba.

F O R M A.

Folia, caules, rami, umbellæ, flores, ac semen, sylvestris DIOSC.
Pastinacæ per omnia similia sunt. Radix in vno genere purpurea, ac cruenta habetur, in altero alba, napi ferè similis, sapore subdulci, odore nō insuavi.

L O C V S.

Seruntur ab olitoribus passim in hortis in ciborum usu. *Matth.*

Q U A L I T A T E S.

Semen & radices, pares cū *Idem*. domestica pastinaca facultates habent.

V I R E S.

Non valde distant suis in viribus à domestica Pastinaca. In cibis sumpta radix inflat, & concoctu non adeò facilis est. Rubra coquitur in aqua, & deinde tessellatim inciditur, & in acetarijs cum pipere estur. Alba verò rapi, aut napi modo in carniū iure coquitur.

SESELI Massiliense, Græcis, *Σέσελι*. Arabibus, *Sesalios*. Barbaris, *Sifileos*. Officinis, *Siler montanum*. Germanis, *Steinbrech*. Gallis, *Sermontain*.

SESELI MASSILIENSE.

GENERA.

DIOSC. Quatuor Seseli genera numerantur, Massiliense, Creticum, Æthiopicum, Peloponnesense.

FORMA MASSILIENSIS.

DIOSC. Folia habet fœniculi similia, crassiora tamē, caulem vegetiorem, umbellam anethi, in qua semen prouenit oblongum, angulosum, degustanti statim acre. Radicē gerit longam, iucundi odoris.

LOCVS.

Matth. Nascitur in altis montibus.

QUALITATES.

Galen. 8. Radix, atque etiā semen simp. me. vsq; aded exalfacit, vt admodum urinā mouere queat, sed & medicamentum est tenuium partium.



VIRES.

DIOSC. Semen & Radix potu stranguriæ & orthopneæ medetur, suffocationib. mulierum, & comitialibus profunt, menses, & partus trahunt; tussim veterem sanant. Semen cum vino potum concoquit, & tormina discutit. Epialis febribus vile, contra perfrictiones in itineribus cum pipere, & vino bibitur. Datur in potu capris, ac cæteris pecudibus, quo facilius suos fœtus enigrantur.

*SESELI Massiliense nonnullorum. Gallis herbarijs Fœniculum tortuosum vocatum.

SESELI MASSILIENSE
NONNVLLORVM.

F O R M A.

Tota ferè candida est herba, folia cinerea sunt, exigua & valde diuisa, flores singuli folijs quinis constant, & coniuncti vmbellam purpurascens efficiunt, radice nititur longa admodum, sapore tamen ignauo præditam. Semen gignit subamarum, calidum manifestè.

L O C V S.

Crescit in agro Monspe-
sulano.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Nō inepte pro Seseli Mas-
siliense vsurpatur.*



SESELI

SESELI Æthiopicum, Græcis, Σέσελι αἰθιοπικόν. Italis, Sefeli Ethiopico.

F O R M A.

SESELI ÆTHIOPICVM.

Diosc. Folia habet hederæ maiora, & ad periclymeni modum oblonga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus (seu spitamæ longitudine) capitulo anethi, semine tritici modo denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratio-re, & acriore, multum suauis.

L O C V S.

Matth. Nascitur in apricis montibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Nulla qualitarum & virium cum altero intercedit differentia, nisi quòd cum Æthiopicum acrius sit, valentius sua expedit munia.




*SESELI

*SESELI *Aethiopicum* vulgare, *Cerucellum*, *Ceruaria*, *Elaphoboscus*, Germanis, Weiß Hirschwurz.

SESELI *ÆTHIOPICVM* VVLG ARE.

F O R M A.



Folia habet oblonga magis quam rotunda, crenata subtus cæsa, annexa pediculis suis vni costæ nervosæ infima parte circumdante caulem è radice crassa pilosâque, intus candida, amari saporis, prodeuntem diuisumq; in ramos plurimos umbellas albis floribus sustinentes, è quibus oritur semen cartilagineum, album, amarum.

L O C V S.

Nascitur in frutetis montium.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Eadem illi ascribunt quidam, quæ Diosc. *Aethiopico* suo. Imprimis vero ad colicos dolores ipsius radix commendatur.*

Kk

SESELI

SESELI Peloponnesse, Græcis, Σέσλην πελοποννήσου. Italis, Sefeli Peloponese.

SESELI PELOPONNENSE.

FORMA.

Diosc. Folia mittit cicutæ latiora, & crassiora, caulē supra Maffiliensis magnitudinem ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius odoratū & carnosius pendet.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in asperis, riguis, & collibus, & in Ida monte, & etiamnum in Insulis.

QUALITATES, ET
VIRES.


Eadem præstare potest, quæ
& cætera genera.



ANISVM, Græcis, *ἄνισος*. Mauritanis, *Aneisum*, siue *Anexissum*. Italis, *Aniso*. & *Aniso*. Germanis, *Anis* & *Enis*. Hispanis, *Matabalua*, & *Yerua dulce*. Gallis, *Ani*.

ANISVM.

F O R M A.



Caulem edit rotundum, *Matth.* cubitalem, ramosum, umbellam candidam mellis odore, semen oblongum, iucunde odoratum, sapore sanè misto ex dulci, acriq; ac etiam amarisculo, ad multa utile.

L O C V S.

Seritur in campis, hortis, *Diosc.* & viridarijs. Sed optimum *Matth.* est quod in Creta, & Egypto nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Semen maximè utile est, *Gal. 6.* acre, subamarum, vt propè *simp. me.* adurentium accedat caliditatem. Est autem in siccando tertij ordinis, sicut in calefaciendo. Aperit, concoquit, *Matth.* digerit, incidit, prouocat, & flarus pellit.

V I R E S.

Oris halitum iucundiorem facit, doloris leuamentum præstat, vrinam ciēt, *Diosc.* discutendi vim habet. Hydropicis porum, sitim exstinguit. Animalium venenis aduersatur. Valer, & ad inflationes. Aluum, & albā fœminarum profusua sistit. Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat, capitis dolores leuat, naribus suffitum, cum rosaceo tritum instillarumq; fractis auribus medetur. Inspargitur *Matth.* panibus odoris, saporisq; gratia; Datur tostum cum mentha ad coliacos affectus. Singultum sedat, tam haustum, quàm olfactum; somnum conciliat, & calculos pellit.

CARVM, Græcis, *Karôs*. Arabibus, *Coreuia*, *Karania*, seu *Carui*. Italis, *Caro*, & *Caruo*. Germanis, *Matte Kûmich*, *Wiesentûmmel*. Hispanis, *Alcarauca*. Gallis, *Carni*.

CARVM.**FORMA.**

Matth. Planta est Pastinacæ sylvestris non absimilis, caulibus ab vna radice pluribus, quadrangulis, cubitalibus, umbellula floribus candidis referta; semine anisi longiore, anguloso, subnigricante, radice longa, sapore amariusculo simul & acri.

LOCVS.

Idem. Nascitur in pratis, & præfertim in montibus, & conuallibus.

QUALITATES.


Gal. 7. Cari semine excalfacit, & sic.
simp. me. cat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens. Aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat, & flatu pellit.

VIRE S.

Diosc. Vrinam concitat, stomacho vile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis: Radix cocta pastinacæ modo manditur. Herba pro odore estur. Seminis farina admiscetur vtiliter cataplasmatibus, quæ ad sugillata parantur.

CENSURA.

Ridendus sanè error eorum est, qui rubram caroram, carum legitimum esse contendunt.



ANETHVM, Græcis, *ἄνιθος*. Mauritanis, *Xebet, Iebet, seu Sebet*. Italis, *Aneto*. Germanis, *Dillen* seu *Hochtraut*. Hispanis, *Heneldo*. Gallis, *Aner*.

ANETHVM.

FORMA.

Adeo ex omni parte fœni- *Matth.*
culum æmulatur; vt sæpius le-
gentes fallat, nisi gustum con-
sulant. consurgit itaque cauli-
bus sesquicubitalibus, ramo-
sis, folijs capillorum speciem
referentibus, floribus luteis,
flores, & umbella fœniculi, Ra-
dice neq; adeo longa: neque
multis subnixa fibris.

LOCVS.

Seritur in hortis ad cibo- *Idem.*
rum obsonia, & in medicum
quoq; vsum.

QUALITATES.

Adeo exalfacit, vt haben- *Gal. 6.*
dum sit, aut secundi ordinis in *simp. me.*
tensi, aut tertij remissi; ex-
cantium verò ordinis est se-
cundi incipientis, aut primi
finientis. ideoq; merito in o-
leo decoctum digerit; dolo-
rem sedat, somnum conciliat,

& crudos humores concoquit.

VIRE.

Aridicomæ, seminisq; decoctum potu lacuocat, inflationes, & tormina se- *Diosc.*
dat, aluum, vomitionesque sistit, vrinas ciēt, singultum lenat, oculorum aciem
hebetat, genituram restinguit assidue sumptum; vteri affectibus in deflectioni-
bus vtile est, cremati seminis cinis illitus condylomata tollit.

CYMINVM sativum, Græcis, *Κίμινον*. Arabibus, *Camium seu Kemum*. Italis, *Camino*, & *Cimino*. Germanis, *Sümmel*. Hispanis, *Comino*. Gallis, *Comin*.

CYMINVM SATIVVM.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, sativum alterum, alterum sylvestre.

F O R M A S A T I V I.

Math. Exit caule sceniculaceo, folijs quoq; ferè similibus, sed rarioribus, semine in umbella subflavo, cum graedine quadâ odorato, sceniculi maiore.

L O C U S.

Diosc. Seritur passim in Italia in campis, sed sponte quoq; per se provenit in Æthiopia, Egypto, Galatia, Cilicia, & Terentia. Tractu gaudet calido, & putrescibili. Quare frequentissimum in maritimis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen qualitatis est excalfaciens, perinde ac anisi, ligustici, & cari, ex tertio ordine excalfacientium.



V I R E S.

Diosc. Excalfacit, adstringit, exiccat. Ad tormina, inflationesq; convenit coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca. Demorsis à serpente in vino. Auxiliatur impositum testium collectionibus, impositum cum vva passa, aut loliacea farina, ceratove mensum abundantiam inhibet. Contritum in aceto, & naribus obiectum sanguinis profusio sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

CYMINVM sylvestre, Græcis, Κύμινος ἄγριος. Italis, *Comino, seu Ciniño saluatico.*

CYMINVM SYLVESTRÉ.

GENERA.

Duosyluestris cumini affi. Diosc.
gnantur genera, primum, &
secundum.

FORMA PRIMÆ.

Frutice assurgit paruo, cau- Diosc.
le dodrantali, ac tenui, qua-
ternis, aut quinis folijs, tenui-
bus veluti ferratis, & gingidij
diuisura. in cacumine capitula
quina, aut sena habet, mol-
lia, rotunda, in quibus semen
est acerosum gustu satiuo a-
ciore.

LOCVS.

Nascitur in collibus, in Ly- Diosc.
cia, & Galatia Asiæ, atq; Car-
thagine Hispaniæ.

QUALITATES.

Calefacit, exiccat, aperit, Matth.
digerit, incidit, resoluit, &
prouocat.

VIREs.

Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq;. Item ex vino contra Diosc.
venenatas bestias. Singultus ex aceto sedat, stomacho vtile quem humor vexat.
Singillara tollit, si manducatum cum melle, & vna passa illinatur. Idem praestat
ijsdem adiectis ad testium inflammationes.

CYMINVM sylvestre alterum, Græcis, κύμινον ἀγρίον ἑτερον. Italis, Cimino sa' uati-
co secondo.

CYMINVM SYLVESTRE ALTERVM.

F O R M A.

Diosc. Planta est sativi non dissimi-
lis, quod à singulis floribus ela-
ta promit cornicula, in quibus
semen est melanthio simile.

L O C U S.

Matth. Nascitur in collibus apricis.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Semen exalfacit, siccatur, ape-
rit, pronocat.

V I R E S.

Diosc. Epotum semen omnium ser-
pentium morsibus præsidio est,
calculosis, & ijs qui urinæ stilli-
cidio vexantur, aut concretum
sanguinem cum lotio reddunt
auxiliatur. Sed apij semen fer-
uefactum postea bibendum est.



CONSOLIDA Regalis. Italis, *Consolida Reale*, seu *sperone da cavaliere*. Germanis, *Rittersporn*. Gallis, *Pied d'Alouette*, seu *consolida royalle*.

CONSOLIDA REGALIS.

F O R M A.



Caulem gerit vnicum, ramu *Matth.* lis multis, tenuibus, longis, divisis, sylvestris melanthij modo. Flores edit purpureos corniculatosque, corniculis ipsis sursum spectantibus, semē fert melanthio simile in parvis corniculis, siliquisve conclusum.

L O C V S.

Nascitur plurimum in campis inter segetes. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Auxiliatur oculorū Epiphoris, inflammationibusq; per se recens ad motum, & eorūdem tumorib. ex melle. Datur quoque ictericis vtiliter illico à balneo, & ex dulci vino ad vrinæ ardores, calculos ejicit, vulnera recentia glutinat, & vlcera sanat.

Kk 5

AMMI,

AMMI, Græcis, *Ζυμυ*. Arabibus, *Hanoobach*, *Anaxaue*, *Nacathau*, seu *Nacathana*.
 Officinis, *Ameos*. Italis, *ammi*. Hispanis, *ammi*. Germanis, *Amci*.

AMMI.

FORMA.

Matth. Caulem emittit fœniculaceum, folijs agrestis pastinacæ, semine in umbellis exili, & cumino minutiore, Origanum resipiente, odoratum, & acutum.

LOCVS.

Idem. Nasçitur in monte Gargano, quod Italum est, quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur, Arabicum est.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Maximè est vtile, facultratis est excalsimp. me. factoriæ & desiccatoriæ, tenuium partium, gustu subamaro, & acri: & clarum est, quod & digerat, & urinam moueat, fuerit autem in calefaciendo, desiccan doque ex ordine tertio intenso.

VIREs.

Diosc. Semen facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpētium ietus, si cum vino bibatur. Menses prouocat. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, vnde inde exortis urinæ difficultatibus resistat: suggillata cum melle tollit. Colorem potu aut illitu mutat in pallorem: suffitu cum vna passa aut resina vulvas purgat. Quod ex Alexandria Ægypti ad nos confertur, sterilem prolificam reddit, si à purgato prius corpore, sumatur tritum in puluere drachmæ pondere diebus aliquot continuis mane ex vino meraco, aut carniū iure.

Matth.



CENSURA.

Rarò admodum legitimum Ammi in myropolijs habetur.

CORIANDRVM, Græcis, *κόριανδρον* ἢ *κορίαννον*. Mauritanis, *Rusbor*, *Rusbera*, *Kuzbara*, seu *Kuzibara*. Italis, *Coriandro* seu *Coriandolo*. Germanis, *Coriander*. Hispanis, *Culantro*, seu *Ciliandro*. Gallis, *Coriandre*.

C O R I A N D R V M.



& Rufus.

V I R E S.

Illitum cum pane, & polenta, ignib. sacris, & vlceribus, quæ serpunt, medet. Diosc. Epynictidas cū melle, & vva passa restitū inflammationes, carbunculosq; sanat cū faba fresa, strumas, & tubercula discutit, sumptū mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosiore vsu abstinentū: succus cū cerula, argentiq; spuma ex rosaceo, & aceto illitus arduentes summe cutis inflammationes emendat. Semen datur cochlearij mensura vtiliter ad acidus ructus, stomachū corroborat, & caput, defluxionibus ventris accommodè administratur; concoctionem cibi adiuvat. Tritū recentibusq; carnib. aspersum prohibet, ne tam cito æstatis tēpore putrescant. Ex aqua aut potū, celiacos & dysentericos iunat.

HIERA-

F O R M A.

Tenui prouenit caule, scf. Matth. quicubitali lōgitudine, ramis numerosis, folijs infernè parthenio proximis, quæ verò in caulib. habentur, & tenuiora sunt, & magis diuisa, flores in caulium summitatibus candicant, è quibus racematim oritur semen rotundum, ac striatum. Plāta virescens grauiter spirat fœtido cimum odore. At semen siccū exuta graeolentia odoratum euadit, & ad multa vtile.

L O C V S.

Nascitur sponte in campis, Matth. & inter segetes, seriturque in campis, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Ex contrarijs componitur Galen. 8. facultatibus, plurimum habes simp. me. essentia amaræ, q̄ tenuiū partū est, & terrena, nec parū ē humiditatis aqueæ obtinet, q̄ tepentis est facultatis. Habet autē & adstrictionis paucillū. Dioscor. tñ frigidæ facultatis Diosc. Coriandrū existimat, cui suffragatur Auicenna, Archigenes,

HIERACIUM, Græcis, *Ἱεράκιον*. Italis, *Hieracio*. Germanis, *Habichtskraut*.

HIERACIUM.

G E N E R A.

DIOSC. Duo Hieracij recensentur genera, maius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Magnum caulem emittit, asperum, subrubrum, spinosum, cauum, folia ex intervalis rariusculè diuisa per ambitum soncho similia, luteos flores in oblongis capitulis.

Matth. Vnica nititur radice, recta, lacteo succo pragnante, in summa herba est lactucæ sylvestri similis.

L O C V S.

Matth. Nascitur in campestribus, & collibus incultis locis, & aliquando inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

DIOSC. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi.



V I R E S.

Idem. Stomacho æstuanti, inflammationibusque illitum prodest. Succus epotus ventriculi erosiones mitigat. Herba cum radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Succus cum lacte mulierum sanat omnia oculorum vitia, ad id edoctis ab accipitre medicis, aiunt enim eos herbam pede scalpere, & emanantem lachrymam in oculos transferre ad nubeculas abstergendas. Idem in posca potus, aluum citat. In vino verò medetur serpentium ictibus: vrinæ difficultatibus succurrit haustus.

Plin.

HIERACIUM minus, Græcis, *Ἱερᾶχιον*. Italis, *Hieracio minore*. Germanis, *Ha-*
senstrauch.

HIERACIUM MINUS.

F O R M A.

Herba Cichorio ferè simi- DIOSC.
lis est, sed asperiora ei folia *Matth.*
sunt, cauliculi tenues, viren-
tes, subasperi, in quorum ca-
cumine flores exeunt lutei
cichoreæ figura, qui mature-
scentes in pappos euadūt. Ra-
dix illi multifida tenuisque.


L O C U S.

Nascitur in pratis in cam- *Matth.*
pestribus secus itinera, locis-
que incultis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vim suam ad eadem ad quæ
superior impendit.

A P I V M,



APIVM, Græcis, Σάπρον κνίσιον. Arabibus, *Charfi*, *Charfi*, seu *Cheres*. Italis, *Petrosemolo*, sed *Thasfi* Pitrofello. Germanis *Petersilien*, seu *Peterlin*. Hispanis, *Perexil*. Gallis, *Perfil de Jardin*.

APIVM HORTENSE.

FORMA HORTENSIS.

Matth.

Notissima planta vulgare nostrum *Petroselinum* est: exit enim folijs *Coriandri* æmulis compluribus ex vno ramulo prodeuntibus, per ambitum frequenter laciniatis, sed quæ in caule sunt mutata forma, longa angustaque spectantur. Flores habet exiguos candidantes, & semen *Aniso* simile. Radice nititur digitali, dodrantali longitudine, albicante, dura intus matrice, raro diuaticata, quæ carniū iuribus passim incoquitur.

LOCVS.

Idem.

Seritur vbiq; ab olitoribus passim in hortis.

QUALITATES.

Gal. li. 8.

simp. me.

Vsque aded calidum est, vt vrinam & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semen quàm herba ipsa.

VIRES.

Diosc.

Illinitur cum pane, aut hordeacea farina vtiliter oculorū inflammationibus, æstuantem stomachū mulcet. Mam-

marum duritiam ex lacte concreto contractam reprimi: vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Foliorum & radicum decoctum venenorum noxe resistit, cum vomitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehementius vrinam pellit. Auxiliatur contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam. Inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant. Thoracis quoque & tussis remedijs. Folia concisa, & cum vino, & oleo de scorpionibus in patella feruefacta, pubi quæ calida admota remorantem vrinam cient.

Matth.



APIVM palustre, Græcis, *Ελεοσέλινον*. Mauritanis, *Asaris*. Italis, *Apio*, & *Apio aquatico*. Germanis, *Eppich*, seu *Eppich*. Hispanis, *Perexil dagea*, & *Apio*. Gal-
lis, *Persil de leau*.

APIVM PALUSTRE.



FORMA.

Folia gerit hortensis maio- *Matth.*
ra, solidioraque; caulem quo-
que vegetiorem; odore etiam
acutiore, graviorève, & qui ca-
put feriat. Radice tamen, flo-
ribus, & semine ferè similibus.

LOCVS.

Prouenit palustribus, & v- *Idem.*
liginosis locis, & feritur quo-
que in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, quæ *Diosc.*
hortensi inesse diximus.

PETROSELINVM Macedonicum, Græcis, Πετροσέλινον. Italis, Petroselino Macedonico. Hetruscis, Pitrofello Macedonico.

PETROSELINVM MACEDONICVM.

FORMA.


Diosc. Planta est ramosa, vulgari
Matth. petroselino folijs pxiima, caule crasso, frequētibus alarum cavitatibus, floribus albis, semine ammi simile, odoratio-
re, sapore acri, & amaro, aroma olente.

LOCVS.

Gal. li. 8. Prouenit optimum in Ma-
simp. me. cedonia in præruptis locis.
& lib. 1. de Nascitur & in Epiro, & Cicla
Anti. dibus insulis, feritur etiā nūc
Matth. in hortis in Italia.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Semē maximè vsui est, cum
simp. me. tota etiam herba, vnà cum ra-
dice similem, sed imbecillio-
rem facultatem sortiatur. Est
autem vt gustu acre cum ama-
ritudine, sic & in operibus ca-
lidum, vnà cum incidendi ef-
fectu. Fuerit itaq; ipsum ter-
tij ordinis, tū calefacientium,
tum exiccantium.



V I R E S.

Diosc. Semen vrinam cit, & menstrua. Prodest contra stomachi, & coli inflationes. Laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit: admiscetur antidotis vrinam cientibus & in theriacis.

LEVISTICVM vulgare, Græcis, *ἰαννικόν*. Italis, *Leuistico*. Germanis, *Liebstöckel*. Gallis, *Ache*, & *Achelarge*.

LEVISTICVM VVLGARE, SEV
HIPPOSELINVM.



F O R M A.

Caulibus exit crassis bicu- *Matth.*
bitalibus, fruticosisque, ra-
mis multis, multisque alarum
cauitatibus, folijs palustris a-
pij, sed longè maioribus, mu-
scarijs in cacumine grandiori-
bus, albis refertis floribus, se-
mine oblongo fœniculi ma-
iore, tota planta grauitè o-
let.

L O C V S.

Seritur in hortis.

Idem.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & siccatur ordine *Idem.*
tertio. quo fit, vt aperire, in-
cidere, digerere, & prouoca-
re valenter possit: perinde ac
cætera selinorum genera.

V I R E S.

Ea omnia præstare valet, *Idem.*
quæ de palustri apio dicta
sunt: sed eo imbecillius est.

A P P E N D I X.

Tametsi vulgare Leuisticum Hipposelinum legitimum non sit, quod co- *Idem.*
ma, & semine illi non respondeat, cum tamen cæteris selinis grandius sit, &
tota facie simile, nemo nobis facessere debet, si hanc plantam Hipposelinum
appellauimus.

SMYRNIVM, Græcis, *Σμύριον*. Latinis, *Olustrum*. Arabibus, *Smirnen*. Italis, *Smirnio*, seu *Macerone*. Hispanis, *Apio Macedonico*. Gallis, *Maceron*.

S M Y R N I V M.

F O R M A.

DIOSC. Caulem habet, & stolones multos, folia latiora, subpinguia, robusta, ad terram infracta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundo. colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis vt anethi. semine brassicæ rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita vt alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus.

L O C V S.

Idem. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squallidis, & limitibus, terrenis. Acetiam in hortis feritur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Ex eodem genere & ipsum
simp. me. cum apio est, & petroselinum: fueritque apio calidius, petroselino vero imbecillius, calidum siccumque tertio ordine.

V I R E S.

DIOSC. Folij in muria maceratis ad obsonia vtuntur, alium sistant. Radix pota præstat aduersus serpentium ictus, tussis, & Orthopneas mitigat, vrinæ difficultati medetur: illita recens tumores, collectiones duritiâsq; discutit. vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vitiât, si feruēfacta subiiciatur, semen lienis, renum, & vesicæ vitijs prædest. Menses, & secundas pellit. Commodè datur Ischiadicis in vino. Inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & rictus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.



SMYRNIVM Creticum, Italis, Smirnio di Candia.

SMYRNIVM CRETICVM.

F O R M A.



Folia fert nostrate Smyr- *Matth.*
nio crassiora, quina ab vno
pediculo exeuntia, & per am-
bitum serrata, præter quàm
in altera parte propè pedicu-
lum, quo in loco succisa spe-
ctantur. Longè autem diuer-
sa habentur, quæ in caule sunt.
Ea enim rotunda visuntur,
caulibus per medium transe-
untibus perfoliatæ vocatæ
modo, nullis in ambitu den-
ticulis. Caulem edit firmum,
striatum, & subter folia geni-
culatum. Umbellas in sum-
mis caulibus gerit, floribus
albicantibus, semine rotun-
do, anguloso, & in acutum
desinente, sapore acuto, &
amariusculo. * Radix est prio-
ris Smyrnij sed minor. *

L O C V S.

Nascitur in Crera Insula, & *Idem.*
seritur nunc in Italia.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Non differt suis in qualitatibus, & viribus ab Italico Smyrnio.

Idem.

IMPERATORIA, Italis, *Imperatoria*. Germanis, *Weistertwurz*. Officinis Germanorum, *Magistrantia*. Gallis, *Ottuche*, seu *Imperatorie*.

IMPERATORIA.

F O R M A.

Martb.

Folijs exit Sphondylii, minoribus tamen, solo accubantibus, robustis, hirsutis, asperisque: caule bicubitali, purpurascente, rotundo, hirsutoque, in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur, è quibus postea semen prodit acutum, ac odoratum. Radix inest ei non longa, mediocriter crassa, rugosa, dura, quæ foris nigricat, intus verò virescit, gustu admodum acri, mordax, subamara, & odorata.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in altis montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Excalfacit ordine tertio completo, aut quarto inchoante. Incidit, trahit, aperit, digerit, attenuat, prouocat, resoluit, venena dissipat. Zedoiræque facultatibus pollet.

Idem.

Discutit mirificè tum intestinorum, tum ventriculi flatus. Cit menses, atque vrinam. Fouentur eius decocto vtiliter in dolore dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri stragulationibus prodest, conceptus adiuvat, quos frigiditas intercipit, concoctionem roborat. Commanducata cerebri pituitam trahit. Pulvis radice ex saluæ decocto haustus, auxiliatur resolutis, comitialibus, veteriosis, conuulsisq;. Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Præstat ferè ad venena omnia, omniumque venenosarum ferarum morsus, ac ictus. Asthmaticos, anhelososq; iuuat, obstructions aperit. Hydropicos, ac lienosos curat. In summa excalfacit vniuersas corporis partes, quas frigus occuparit.

V I R E S.



* IMPERATORIA Alpina, vel Astrantia Alpina. Germanis, Bergstren.

I M P E R A T O R I A A L P I N A.

F O R M A.

Minor est quam præcedens, omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicillos teneriores profert ex radice non absimili nostræ Imperatoriz, & æquali etiam, gustu acriori & magis virente.

L O C V S.

Prouenit in alpinis apud Helucios.

Q U A L I T A T E S.

Calida est & sicca, vt vulgaris Imperatoria, qua superior esse facultatibus omnibus videtur, & ad agendum promptior.

V I R E S.

Vtuntur hac planta ad quartanas, partus eruendos

& cerebrum expurgandum, flatus discutiendos, colicisq; dolores sedandos, id quod vulgaris nostra quoq; præstare potest. *

L I 3

F O E N I -

FOENICVLVM, Græcis, *Μάραθρον*. Arabibus, *Raenigi*. Italis, *Finocchio*. Germanis, *Senchel*. Hispanis, *Hinoio*, *sive Funco*. Gallis, *Fenoil*.

F O E N I C V L V M.

F O R M A.

Matth.

Caulem edit anethi, sed crassiorē, nec proceriorem, striatum, geniculatumque, folijs numerosis, capillaceis, caulis alarum multis. Umbellis cacumina occupantibus, anethi æmulis, melinis floribus, & semine oblongo, gustu acuto, quadam cum leuiuscula amaritudine, odorato. In quodam verò genere hortis Italicis familiarē, semen dulce percipitur, & crassiori quoq; mole spectatur. Radice nititur longa, digitali crassitudine, acuto, ac amariusculo sapore, cum dulcedine quadam.

L O C U S.

Idem.

Seritur in hortis, vineis, & apricis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7.
simp. me.

Tam valenter excalfacit, vt ex tertio excalfacientium ordine censerī possit, desiccatur verò non æquē. Sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: syluestris verò cum semen, tum radix, valentius calefacit, & siccatur.

V I R E S.


Diosc.

Herba deuorata, aut semen cum Prisana potum mammas lacte replet. coxæ decoctum in renum doloribus infusum prodest. Bibitur ex vino contra serpentium ictus. Menses ciet, contritæ radices, & cum melle illitæ canum moribus medentur: Succus caulium, & foliorum præstat instillatum ad excitandam oculorum aciem. Erratici autem potæ stranguriæ medentur. Menses suppositæ ciet, aluum sistunt. Radice, aut semine poto calculos comminuit, regium morbum expurgat, lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haustum puerperas purgat.



DAUCUM, Græcis, Δαῦρον. Mauritanis, Ducu Glezar, siue Gezar. Italis, Dauco. Germanis, Bertourk. Hispanis, Dauco. Gallis, Carote sauvages.

D A U C U M.



G E N E R A.

Trium est generum, Cre- diosc.
ticum, Aliud Apio simile, &
Terrium Coriandro.

F O R M A C R E -
T I C I.

Creticum folijs est fœnicu- diosc.
lo simile, minoribus tamen,
& tenuioribus, caule dodran-
tali, umbella coriandri, flore
albæ, candido, hirsuto, sua-
uissimi manducando odoris.
Radix digitali crassitudine, & Matth.
dodrantali longitudine ado-
lescit.

L O C U S.

In saxosis nascitur, & locis diosc.
sole illustratis.

Q U A L I T A T E S.

Agrestis quidem domesti- Gal. 6.
co minus est esui idoneus. sin. med.
Cæterum in omnibus vehe-
mentior. At domesticus co-
mestibilis quidem sed imbe-
cillior. Acrem & calefacien-

disfacultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix præter iam
comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac venereum. Id quod Domestici
quoq; semen præstare potest.

V I R E S.

Creticum omnium probatissimum, Semen omnium potum vrinæ, & men- diosc.
fes, atq; parvus extrahit. Torminibus liberat, vererem tussim mitigat. Ex vino
potum auxiliatur Phalangiorum ictibus, tumores illitu discutit, cretici pecu-
liariter radix maximè præstat contra venenatorum ictus ex vino pota.

FORMA.

Que apud nos habetur pro Dauc. Cretico, planta est folijs ferè fœniculi, nigrioribus & minoribus, semine oblongo acuminato subalbido hirsuto aromatici saporis cum manditur & odorato. Flores in summitate cauliculorum palmi altitudinem raro excedentium, nisi soli luxuria adiuuentur, umbellam candidam constituunt. Radice nititur crassa, & longa.

LOCVS.

In montibus Vicentinis hic Daucus plurimus prouenit.

FACULTATES.

Huc refer quæ suo ascribit Autor, nam figura non differt à vero Cretico qui ad nos afferri solet, viribus tantum eo paulo inferior. *



DAUCVM

DAUCVM alterum, Græcis, Δαύκων ἄλτρον, Italis, *Dauco d' altra specie.* Germanis, *Schwarz Hirschwurk.*

DAUCVM ALTERVM.

FORMA.


Folijs est coriandri, floribus in umbella albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ, semine oblongo cum cumini, acri. Radice pastinacæ sylvestris, superiore parte villosa.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, pro- *Matth.* montorijs, & montibus, & collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus ijsdem refertus est, *Galen.* quibus & Creticum, sed non *Diosc.* adeo efficacibus.



LI 5

SENA,

SENA, posterioribus Græcis, *Sena*. Arabibus, *Sene*. Italis, *Sena*. Germanis, *Senet*. Gallis, *Sene*.

F O R M A.

S E N A.

Matth. Folij est Glycyrrhizæ proximis, crassis, subpinguibus, fabarum recentiu sapore, caule cubitali, à quo ramuli exunt flexiles. Flores ei emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis intercursantibus venulis, quibus succedunt folliculi falcati, adeoque sui naturæ compressi, ut superior membrana inferiori cohereat, in quibus semine continetur subuirescens, vinaceorum nucleis simile. Folliculi è ramisculis prominent tenui pediculo nitentes. Planta est frigoris impatiens.

L O C U S.


Idem. Seritur in Hetruria, in agro præsertim Florentino in campis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Aperit, aluum citat, digerit, concoquit, excalfacit, attenuat.

V I R E S.

Idem. Educit bilem rûm atram, tum flauam, ac etiâ pituitam, quod sanè experientia comprobatur. Mundat cerebrum, iecur, lienem, pulmonem, atque omnes torporis sensus, viscerum obstructions aperit. Auger iuuentutem, seniumque retardat, & animum hilarem facit. folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquuntur, addita præsertim Anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima demum in vniuersum est Medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Ideoque delirij, amentie, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & Epilepsia. Cor etiam roborat præsertim ubi eis commisceatur medicamentis, quæ ad cordis affectus sunt idonea. Est præterea Sena clemens, & nullius incommodi medicamentum, adeo ut tuto dari possit cum pueris ætate tenellis, tum etiam vterogentibus. Fit ex folijs vinum vindemiæ tempore, quod ea omnia præstat potum.



* *SENA Alexandrina, Gallis, Sene de Leuant. Hispanis, Sen de Alexandria.*

SENA ALEXANDRINA.

FORMA.


Oblongiora & in acumen
vergentia habet folia, omni-
bus suis partibus tenerior est
vulgari.

LOCVS.

Ex Alexandria Aegypti ad
nos conuehitur.

FACULTATES.

Valentius praestat ea vni-
uersa quae vulgo vsitata. *



COLLY-

COLLYTEA, Græcis, Κολλύντη. Italis, Collutea. Germanis, Schaffrüsten.

COLLYTEA.

FORMA.

Theoph. Arbor est magnitudine præstans, fructum in Siliqua ferens magnitudine lentis, quo oves mirum in modum pinguescunt; Folium habet non absimile fœnogræco.

LOCVS.

Matth Nasçitur plurima sponte in Ananiensium, & Tridentinorum agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen potum vomitiones ciet, perinde ac genistæ, & alium quoque citat, non sine incommodo tamen, quam pecudibus nihil tale efficiat.



*COLY-

*COLUTEA Scorpioides. Græcis, Κολοιυτία σκορπιόειδης.

FORMA.



Sic vocata est hæc planta, quoniam folio colutæ & pene flore proueniat. Caule quoque lignoso simili eidem sed graciliore, siliquis vero Scorpioidi perquam respondentes. Radix buxea subdulcis amaritudinem habet admixtam, ingrato sapore.

LOCVS.

Nascitur in syluis, & prope fluminum carpidines. Inuenitur etiam in montibus.

QUALITATES.

Gustata astringit, & linguã vit.*

PYRE.

PYRETHRVM, Græcis, Πύρεθρον. Arabibus, *Macharcaraba*, seu *Hacharcharba*.
 Italis, *Piretro*. Germanis, *Vertram*. Hispanis, *Pelitre*. Gallis, *Pyrethre*.

PYRETHRVM VERVM.

F O R M A.

Diosc. Folia caulemq; mittit perinde ac sylvestre daucum & feniculum, umbellam anethi circinnatæ rotunditatis. Radicem longam pollicis crassitudine, feruidissimo gustu.

L O C V S.


Matth. Prouenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3. Pyrethri radice potissime vtimur, causticam, vrentemve facultatem obtinente, qua vtique dentium refrigeratorum dolores lenit, & ad rigores ante periodos ex oleo cōfricatur.

V I R E S.

Diosc. Mansa pituitam elicit, ideo in dentium dolore cocta in aceto, & colluto inde ore auxiliatur. sudores ciet peruncta ex oleo corpori, diuturnis horroribus efficax est, stupidis quoque ac resolutis mirifice confert.



PYRE-

PYRETHRUM alterum, seu PseudoPyrethrum. Italis, *Piretro secondo*, sine
Piretro falso. Germ. Gemein Bertram.

PYRETHRUM ALTERUM.

FORMA.

Folia fert Libanotidis, seu *Matthi-*
Anthemidis crassiora, cau-
 lem ramosum, foliosumque,
 florem maioris Bellis gradio-
 rem, colore intus aureo, &
 per ambitum candido, Radi-
 cem pollice crassiorem, mul-
 tificamque.

LOCVS.

Nascitur in Boemiæ mon- *idem*.
 tibus, ac etiam inibi in hortis
 seritur.

QUALITATES.

Radix vrentis est faculta- *idem*.
 ris, quadam cum leuicula ama-
 ritudine. Ideoque fuerit ex
 quarto exsiccantium or-
 dine.

VIRE.

Et si viribus videatur altero infirmioribus, potest tamen eius vicem com- *idem*.
 mode explere.

ROSMA.



ROSMARINVM, Libanotis. Græcis, *Λιβανός*. Mauritanis, *Xaier almerien*,
Alpinalfach, seu *Cachola*. Italis, *Rosmarino*.

G E N E R A.

Diosc. Duo eius habentur genera, vnum fecundum, quod duplex est, alterum sterile.

F O R M A.

Diosc. Folia habet fœniculi, crassiora, & latiora in rotæ speciei humi sparsa, iucundè olentia, caulè cubitalem aut maiore, multis concavum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, Sphondylion simile, acre, resinaceum, & quod in mandendo linguam exurat. Radix Thus redolet, candida, prægrandis. Alterū omnino cōsimile. Semen ferens larum nigrū, vti Sphondylion, odoratū minimè exurès. Radice foris nigra, intus si frangatur alba. Quod autem sterile dicitur, illorum planè similitudinè refert, sed neq; caulè, neq; florem neq; semen profert.

L O C V S.

Diosc. Nascltur in saxosis & asperis.


Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Omnes eiusdem sunt facultatis, emollientis, & digerentis, abstergentis, & incidentis.

V I R E S.

Diosc. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit, sed inflammationes, & condylomata mitigat. Cōcoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cū melle vlcera purgant: cum vino potæ torminib. medetur, & serpentium morfib. opè ferunt. Urinas cient, & menses. Veteres tumores illitu discutiunt. Succus cum herbæ, tum etiam radicis, ex melle illitus oculos exacuit. Idè præstat epotū semē. Valer ad comitiales, diuturna; pectoris vitia. Datur cōmodè Ictericis cū vino, & pipere. Sudores mouet ex oleo perunctū. Illinitur podagris cū aceto, & Loliacea farina, Vitilignes purgat, addito quā acerrimo aceto. Semine secundi generis vtendo, nam primi quod cachrym appellant, sua acrimonia arteriam exasperat.

ROSMARINVM.



ROS MARINUM coronarium, Græcis, *Λιβανὸν ὑπεραγναιον*. Arabibus, *Elkialgeber*. Italis, *Rosmarino coronario*. Hetruscis, *Ramerino*. Germanis, *Rosmarin*. Hispanis, *Romero*. Gallis, *Rosmarin*.

ROS MARINUM CORONARIUM

F O R M A .

Rosmarinū, quo coronarij **DIOSC.** utitur, ramos mittit tenues, & circa eos folia oblonga, angusta, densa, subter incana, superne virētia, & odorata. Flo- *Matth.* ret bis in anno, vere videlicet & Autumno, floribus odoratis, in purpura albicantibus.

L O C V S .

Nascitur sponte nonnullis in *Matth.* regionibus, utpote in provincia Narbonēsi, & feritur passim in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S .

Excalfacit, attenuat, digerit, *Idem.* resolvit, aperit, roborat, incidit, abstergit.

V I R E S .

Ictericos sanat, si decoctum **DIOSC.** eius ante exercitationes bibatur. Prodest ad frigidos ven- *Matth.* triculi affectus, ad coeliacas passiones, & vomitum cibi, si cum pane deuoretur, aut sicci pulvis ex vino meraco bibatur. Prodest tum lienosis, tum iocinerosis, non solum enim vasorum infarctus expedit,

sed sua adstringenti vi etiam robotat. Valer ad capitis defluxiones, ac etiam ad eius frigidos morbos, nempe ad comitiales, stupidos, veternosos, resolutosq;. Additur vtiliter in capitis lotionibus, & articulorum fomentis. Cohibet alba vteri profluvia diutius sumptum, visum acuit, si eius folia, & flores cum pane, & sale dum floret quotidie edantur. Mansum oris halitum commendat. Sistit gingivarum, & dentium fluxiones, in aceto, & vino austero feruefactum, ubi hoc decocto calido os colluatur. Sicci farina inspersa, vulnera glutinat, quæ prius vino, in quo decoctum fuerit, fuerint elota. Parantur è virgis dentiscalpia, & carbones ad picturas delineandas. Flores saccharo asseruati valent ad omnia prædicta. Præstat etiam admodum in obsoniorum usu.



ROSMARINVM sylvestre, Italis, Rosmarino saluatico. Germ. Wild Rosmarin.

ROSMARINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matth. Crescit hæc planta cubitali altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, rufescentibus, fragili tamē materie. Folia in his erumpunt numerosa, coronarij rosmarini æmula. prona parte viridia, supina verò rufescentia, rubroque nitentia pediculo. In furculorū summitatibus corymbacea coma visitur rubro colore, è qua flores prodeunt sublutei. Radice est infirma, & superuacua, planta est odorata.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Boemia, & Polonia vliginosis locis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resoluit, incidit, & digerit.



VIRES.

Idem. Præfertur Boemis contra tineas, & blattas, quæ vestes lacerant, quare ijs interponunt. Sed ad ea omnia efficax est, ad quæ coronarium Rosmarinum præstare diximus, præterquam ad ciborum condimenta.

* ROSMA-

*ROSMARINUM sylvestre minus.

F O R M A.

Multo minor & tenerior est priore, lignosis atque tenuibus virgis ultra palmi altitudinem paululum assurgēs, vel ad plurimum dodrantem æquans. Folia acuminatiora sunt, & inferiore parte cæsia. In surculorum summitatibus flosculi prodeunt rubelli, è quibus semen, prioris plantæ semini simile. Odor ipsius vix percipi potest.

L O C U S.

Nascitur in Borussia in sylvis umbrosis vliginoso solo prope priorem, quæ ibi humanam staturam pene superat.*



Mm 2

SPHONDY-

SPHONDYLIVM, Græcis, Σφονδύλιον. Italis, *Sfondilio*. Germ. *Verentiana*.

SPHONDYLIVM.

FORMA.

Diosc. Folia quadam tenuis platani, & panacis habet, caules fœniculaceos, cubitales, aut maiores, in quorum cacumine semen duplex, fœveli simile, sed larius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris, flores eius albi, aut pallētes. Radice Raphani candida.

LOCVS.


Idem. Nasctur in palustribus, & aquosis.

QUALITATES.

Galen. 8. Semen acre est, & siccantis
simp. mē. facultatis, & radix nimirum similis est.

VIREs.


Diosc. Epotum semen pituitam per altum extrahit. Medetur iocinoris vitijis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vteri strangulationibus, & veterinosos suffitu reuocat. Infunditur commodè cum oleo capitibus lethargicorum. Item capitis doloribus, cum ruta illitum serpentina vlcera cohibet. Radix eadem præstat peculiariter autem circumrasa & intacta callos fistularum derodit. Recentium florum succus infunditur purulentis auribus.



FERYLA,

FERULA, Græcis, Νάρθηξ. Italis, Ferola. Hispanis, Canánheia. Gallis, Ferule.

F E R V L A.



F O R M A.

Ferula grandis admodum Theoph. surgit, unico tantum caule ac li. 6. ca. 3. geniculato, folia, & cauliculi de his. quidam erumpunt, ac alter-plant. natim exeunt folia, quæ grandia, mollia, multifida sunt, adeo ut capillamenti modò ferè spectetur, præsertim quæ terræ proxima sunt. Flos melius, semen obscurum, anetho simile sed maius. Finditur cacumine, & in stipites haud magnos disperditur, quibus flos, semenq; insidet. Annuo caule constar. Radice altè descendit, eademq; singulari innititur.

L O C U S.

Æstuosis nascitur locis, quæ Matth. re Apuliæ solum maxime ferularum est ferax.

Q U A L I T A T E S.

Ferulæ semen excalfacit, & Galen. 3. attenuat. At interna eius pars simp. m.e. recens adhuc, quam medullam vocant, adstringenti pollet facultate.

V I R E S.

Viridicaule medulla pota valet ad cruentas excretiones. Datur ex vino Diosc. contra viperarum morsus. Erumpentem è naribus sanguinem indita sistit. Semen porum torminosi auxiliatur, sudores ciet vncto ex oleo corpore. Caulis si edantur capitis dolores faciunt. Asinis gratissimæ sunt in pabulo feru-Plin. lz, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno. Murenis infestissima ferula est, tacta siquidem ea moriuntur.

PEUCEDANVM, Græcis, Πευκέδαρον. Arabib. Herbatum. Italis, Peucedan.
Germanis, Harstring.

P E U C E D A N V M.

F O R M A.

Diosc. Caulem emittit tenuem, gracilentum, fœniculo similem, comam habet statim à terra copiosam, spissamq; flore luteo. Radice nigra, crassa, succosa, graui odore.

L O C V S.


Matth. Prouenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Peucedani radice quidem
simp. me. maximè, sed & succo, & liquore utimur. Sunt enim hæc omnia eiusdem specie facultatis, sed valētior succus admodum exalfaciens, & digerēs, incidit quoque, & extenuat.


V I R E S.

Diosc. Ex aceto, & rosaceo illitum veteriosis, phreneticis, comitialibus, & diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis, & omnibus in vniuersum neruorum vitijis ex oleo, & aceto illitum prodest, eius olfactu respirant vulnæ strangulatus, & veteriosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conueniēter ex rosaceo instillatur. Dentium dolorem mulcet eorum cauis inditum. contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspirijs, torminibus, & inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit. Lienem absumit, difficiles partus mirè adiuvat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones porum, vuluam aperit. Radix ad eadē utilis est, sed inefficacior. Farina eius sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit, squamas ossium detrahit.



MELANTHIVM, siue Git, Græcis, *Μελάνθιον*. Mauritanis, *Xamin*, *Sunis*, seu *sunici*. Italis, *Melanthio*, seu *Niella*. Germ. *Schwarz Kummel* / siue *Schwarz Coriander*. Hispanis, *Negulla*, & *Alipiure*. Gallis, *Barbue poyurette*, siue *Nielle*. Officinis, *Nigella*.

MELANTHIVM SATIVVM.



GENERA.

Duum est generum, sativū, *Matth.* & sylvestre, quod duorum pariter generum est.

FORMA SATIVI.

Surculus exit exilibus, cubitalibus, folijs Senecionis, sed magis diuisis. Floribus in cacumine ceruleis, & in stellæ modum radiantibus, è quibus capitula oriuntur parua, oblonga, pluribus coronata apicibus in internam partem reflexis, intercurrentibus intus membranis, vt in papaueris capitibus. Semen intus corinetur parvū, nigrū, & quandoq; subflavū, odore eximio, sapore amarifculo, simul & acuto.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem.

QUALITATES.

Excalfacit atq; desiccatur ordine tertio, videtur et tenuiū esse partium, in summa vbi in cisione, extensione, desiccatione, & excalfactione est opus, præstantissimū id remediū est.

VIRES.

Illitum fronti capitis doloribus tubuenit, discutit recentes oculorum suffusiones, tritum, & naribus infulum, cum aceto illitū lepras, lentigines, duritias, tumoresq; vetustos tollit, circūcarificatos clauos excutit, cū verere vrina impositum, teretes vëtris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico. Destillatione laborantes adinuat tritū in linteo, & olfactum, vrinæ, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit. Ex vino potum aufert spirandi difficultatem. Incensum serpentes fugat, & phalangiorum ictibus auxiliatur.

MELANTHIVM sylvestre, Græcis, Μελάνθιον ἀγρίον. Italis, Melanthio saluatica,
& Niella saluatica.

MELANTHIVM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth. Folij exit satiuo tenuiori-
bus, multifidis, & capillaceis,
caulibus ferè similib⁹, quem-
admodum & floribus, capitula-
gerit satiuo maiora, sed fa-
cie haud longè dissimilia, se-
mine intus nigro, acuto, ama-
riusculo, & odorato.

L O C V S.

Idem. Nascitur in campestribus,
in incultis præsertim agris.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Semen exalfacit, incidit,
aperit, attenuat, extergit.

V I R E S.


Idem. Ad omnia efficax habetur,
perinde ac satium.



MELAN-

MELANTHIUM sylvestre alterum, Italis, *Melanthio saluatico secundo*. Germanis, *Wilder Schwarze Kummel / Hornkummel*.

MELANTHIUM SYLVE-
STRE ALTERUM.



FORMA.

Nullis prorsus foliorum, *Matth.* caulium, ac florum notis ab altero differt. Solùm itaque capitula disparia sunt. In hoc enim genere longiora sunt, & in quinque sexve diuarticata cornibus.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, *Idem.* & in agris.

FACULTATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ alter. *Idem.* rum.

M m 5

PSEUDO-

PSEUDO-Melanthium, Italis, Melanthio falso, Ruosola, seu Gittone. Germanis, Kornneglin, Kaden.

PSEUDO-MELANTHIUM.

F O R M A.

Matth.

Caulem edit bicubitalem, pilosum, in quo vtrinque per intervalla bina exeunt folia oblonga, hirsutaque. In cacumine flores exeunt purpurei, roseique. semen in calycibus oblongis concluditur, nigrum, melanthio simile, sed amarum, nulloque odore præditum.

L O C U S.

Idem.

Nascitur in arvis inter segetes.

F A C U L T A T E S.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, abstergit, & resoluit.

V I R E S.

Idem.


Farina eius melle excepta, & illita, lentigines, alphas, & cæteras cutis faditates extergit, lembricos pota interimit, urinam ciet, & menses.



VISCUM,

Viscum, Græcis, *Ἰξδα*. Arabibus, *Dabach*. Italis, *Vischio*, seu *Pania*. Germanis, *Vogelkaim* / seu *Mistel*. Hispanis, *Visco*. Gallis, *Guy*.

V I S C U M.



F O R M A.

Viscum planta est brevis, *Matthi*. ramusculis in crucis modum prodeuntibus, folijs binis in ramusculorum summitatibus vtrinque emergentibus, oblongis linguarum instar, crassis, solidisq; colore submelino. Baccas fert copiosas pisorum magnitudine, albicantes, tenui tunica obductas, substantia intus tenaci, glutinosaq; ac molli, in qua semen est paruum.

L O C U S.

Nascitur tantum in arboribus, nempe quercu, castanea, Ilice, Pino, pyro, maloq; sylvestri pruno, terebintho, ac fortasse alijs in arborib; ijsq; præsertim in quibus maiores turdi stabulantur. Ex eorum enim fimo *Viscum* gignitur, quod baccas eius edant, & semen vna cum stercore ibi relinquant.

Q U A L I T A T E S.

Viscum ex plurima aërea, *Gal. 6.* & aquea calida, paucissima simp. med. terrena substantia constat, nã

acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiæ respondent, si quidem valenter ex alto humores extrahit, nec tenues tantum, sed crassiores, coliq; diffundit, ac digerit.

V I R E S.

Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, cæterasq; collectiones ad *Diosc.* maturitatē perducit, cum resina, & pari cera mistum, vetera ulcera, abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide absumit. Cum Sandaraca, aut Anripigmento illitum vngues extrahit. *Matthi* Lignum vero caudicis eius, quod in quercu nascitur (ut quidã scribunt) si in puluerem contritū potandum exhibeatur maximum est Epilepticis auxilium. Sed in quadragesimū diem vsq; potandū est. Idem collo suspensum, aut brachio adalligatū cum suo cortice granidarum conceptū adiuvat.


*VISCUM:

FORMA.

Differt à vulgari visco bacca-
rum racematim cohærentium
copia, cæteris partibus cum eo-
dem prorsus cõuenit.

LOCVS.


Rarum est, & in Heluetia re-
pertum.*



APARINE,

APARINE, Græcis, *Αραρίνη*. Italis, *Aparine*, seu *Speronella*. Germanis, *Rebe-
frant*.

F O R M A.



Ramis multis, & parvis fructuosis.
 ticit, asperis, quadrangulis.
 per intervalla orbiculato fo-
 liorum ambitu, vt in rubia.
 flos albus; semendurum, ro-
 tundum, concavum, album,
 vmbilici figura, asperitate,
 vestium tenaci..

L O C U S.

Nascitur plurimum in agris *Matth.*
 inter lentes, secus itinera, & *Theoph.*
 propè sepes..

Q U A L I T A T E S.

Modicè tum abstergit, tum *Gal. 6.*
 desiccatur, habetque nonnihil *simp. med.*
 subrilium partium..

V I R E S.

Seminis, caulium, & folio-
 rum succus: ex vino potus,
 auxiliatur contra viperarum,

& phalangiorum morsus. infusus aurium doloribus medetur. Herba cum
 arungia trita strumas discutit; ea pro colo pastores vtuntur ad eximendos ex
 lacte pilos,

ALYSSVM,

ALYSSVM, Græcis, Ἀλυσσον. Italis, Alisso.

ALYSSVM.

VIRES.

DIOSC. Exiguus est frutex, vnicaulis, subasper, rotundis folijs, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum.

LOCVS.

Idem. In montibus, & asperis locis emicat.

QUALITATES.

Gal. 6. Non solum mirificè iuuat demorosos à cane rabido, sed & rabienti quoq; data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius similitudine substantiæ effecit. Di-
simp. me. Etumque prius est talem facultatem ex sola excipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experia-
tur, cognoscet facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum absterforij non nihil.

VIRES.

DIOSC. Eius decoctum singultum sine febre potu discutit. Idem efficit si quis eam teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat, contusa in edulio tabiei canis inderi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus, atq; brutis fascini amuletum.




* APPENDIX.

An Veterum Autorum hoc sit Alysson, cum alijs adhuc subdubito.*

VINCETOXICVM, Asclepias, Hirundinaria, Italis, *Vincetostico*. Germanis, Schwalbentwurz.

V I N C E T O X I C V M.



F O R M A.

Folijs prouenit Laurinis in *Matib.* cacumine acutioribus, virgis compluribus fruticat, exilibus, obsequiosisque, circa quas folia per interualla vtrinque bina spectantur. Flores edit. tenues, subalbidosque, è quibus acutæ, tenuésq; proueniunt siliquæ, candida intus lanugine, & semine, vt in nerio. Radicibus nititur numerosis, exilibus, longis, albicantibus, & in girum se diffundentibus mansu subdulcibus, sed inodoris.

L O C V S.

Nascitur in incultis locis, *Idem.* secus itinera, in montibus, & collibus, & saxosis tractibus.

Q U A L I T A T E S.

Radices excalfaciunt, & *Idem.* siccant ordine primo, digerunt, aperiunt, & resoluunt, atque ex totius similitudine substantiæ venenis resistunt.

V I R E S.

Dantur radices ex vino potandæ magno auxilio ad venenosorum animalium idus, demorsis quoque à serpentibus, & cane rabido vtiliter præbentur. Bibuntur quoq; quotidie aduersus pestilentia contagia. Dantur vtiliter vnâ cum citrei mali semine ad omnes cordis affectus. Ex vino meraco potæ tormina mulcent. Earundem ex vino albo decoctum, selibræ pondere haustum diebus pluribus hydropicos iuuat. verùm statim à potu sudor prouocandus est, ictericos ad bonum colorem restituunt, vrinam cient, & tussi, & cæteris pectoris vitij opitulantur. Non desunt qui has radices laudibus efferant ad fractos, & ab alto deuolutos, vbi dentur potandæ ex vino aut maioris symphiti decocto.

NOMINA.
 * VINCETOXICVM FLO-
 RE NIGRO.

FORMA.


Folijs conspicitur alterius
 nigrioribus, virgisque lon-
 gioribus non consistentibus
 sine pedamento, quo nixæ in-
 terdum sex cubitorum altitu-
 dinem attingunt. Flores edit
 quoque similes figura, sed co-
 lore purpureo nigricante. Si-
 liquis & radicibus non longè
 abest à vulgari. *



ATRA-

ATRACYLIS, Græcis, Ατράκτυλος. Italis, Attratile, & Cartamo saluatico.

ATRACYLIS.



F O R M A.

Atracylis, vel Cnicus syl- DIOSC.
 uestris, spina est Cnico simi-
 lis, folia longiora ferens in
 summis virgis, magna parte
 nuda asperaque, qua foeminae
 pro fusis vtuntur, capitula in
 cacumine spinis horrent. Flos
 luteus, quibusdam in locis
 purpureus inuenitur. Radix
 tenuis, superuacua.

L O C V S.

Prouenit inculto solo in *Matth.*
 collibus, & asperis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Coma, semen, & folia te- DIOSC.
 runt cum pipere, & vino v-
 tilissimè contra scorpionum
 ictus. Percussos tradunt quàm
 diu ea teneantur herba, nul-
 lum experiri dolorè, ipsumq;
 deposita statim recrudescere.

N n

CAR-

CARDVVS benedictus, Italis, *Cardo benedetto*, *Cardo santo*, siue herba Tuta Germanis, *Kardobenedict*.

CARDVVS BENEDICTVS.

F O R M A.

Matth.

Caulibus est rotundis, flexilibus, lentis, spinosis, humi accubantibus, folijs longis, utrinque lacinitatis, hirsutis, & cum adolenerint per ambitū aculeatis, capitula summis caulibus gerit longis, ac pungentibus aculeis rigentibus folijs circumquaque stipatis, è quibus melius flos emicat, paposo intus semine cinare simili, & albicante. Radice nititur alba multifidaque.

L O C V S.

Idem.

Colitur diligenter in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Herba est vehementer amara. Ideoque exalfacit, ficit, aperit, abstergit, & digerit. magni nominis, magnæq; existimationis planta est apud omnes nationes.



V I R E S.

Idem.

Præstat maximè contra pestilentiam, item aduersus venena lethalia, tam interius sumpta, quam venenosorum animalium morsibus illita. Sanantur hac herba quartana, aut alijs febribus laborantes, quarum circuitus cum frigore, & horrore adueniunt. Id enim præstat aut epoto herbæ decocto, aut stillaria aqua, aut foliorum pulueris drachma. Præstat eadem ad Epilepticos infantes. Alui tinea necat, & vteri virijs auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quam sicca pota, & exterius admota, contumacia vlcera sanat, quam obrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco parantur aduersus Gallicam luem.

CLINOPODIUM, Græcis, *Κλινopodium*. Italis, *Clinopodia*. Germ. *Wirtel Dost*.

CLINOPODIUM.

F O R M A.

Erutæ est folijs serpyllo simi *Diosc.*
 lis, surculofus duum dodran-
 tum altitudine. Flores marru-
 bij modo ex interuallis distin-
 cti, speciem lecti pedum præ-
 bent.

L O C U S.

Nascitur in petrosis.

Diosc.

Q U A L I T A T E S.

Calefaciendi vim obrinet, *Gale. 7.*
 nondum adurendi, est verò *simp. me.*
 essentia tenuium partium. ita-
 que exiccare, ac excalfacere
 poterit ordine tertio.

V I R E S.

Bibitur herba, & succi eius *Diosc.*
 decoctum ad conuulsa, rupta,
 strangurias, serpentium ictus.
 Menfes, & partus pellit, &
 peniles verrucas, quas acro-
 chordonas vocant eiicit, ali-
 quot diebus potum. Alium
 sistit decoctum ad tertias po-
 rumque, si febrim sentiunt ex
 aqua, alioquin ex vino.

A P P E N D I X.

Cum Clinopodium adeo tenuium esse partium (vt scribit Galenus) vt ex
 tertio excalfacientium, siccantiumque ordine habeatur, atque operæpretium
 esse, vt quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amaræ
 percipiantur. Cumque neutra qualitas in clinopodio, cuius hic imaginem de-
 dimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimum facere Clinopodium. Sed
 potius alterum statim sequens, cui præter acredinem & odoris fragrantiam,
 cæteræ astipulantur notæ.

CLINOPODIVM alcerum, Italis, *Clinopodio*.

CLINOPODIVM ALTERVM.

FORMA.

Matth.

Folijs est serpylli modo oblongis in cacumine mucronatis, floribus inter folia subpurpureis balaufti effigie, caulibus exilibus, angulosis, è quibus folia per interualla ex-eunt vtrinque bina: sapor illi acutus.


LOCVS.

Idem.

Nascitur in campestribus inculto solo, & saxosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.*Idem.*


Cum non dubitem, quin hæc planta legitimi Clinopodij faciem referat, fateri ac affirmare cogor id ijs viribus esse præditum, de quibus in præcedenti capite diximus, de Clinopodij viribus.



LEON.

LEONTOPETALVM, Græcis, ΛΕΟΝΤΟΠΕΤΑΛΟΥ. Italis, Leontopetalon. Germanis, Löwentap.

LEONTOPETALVM.



FORMA.

Caulē mittit dodrantā-diosc. lem, aut altiorē, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parva duo, aut tria in filiquisciceris modo. Flores anemonæ similes; * Lutei instar centaurei lutei. * folia brassicæ, sed papaveris diuisura, radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & segeti- Idem. bus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem, & Gale. 7. exiccandi, calefaciendique in simp. me. tertio ordine possidet.

VIRE.

Radix auxiliatur serpē-diosc. tium ictibus, ex vino pota, nec alia res celerius dolorem finit, miscetur & ischiadicorum clysteribus.

TEUCRIUM, Græcis, Τεύκριοι. Italis, Teucro. Germanis, Batengel oder Sum-
merrost.

TEUCRIUM.

FORMA.

DIOSC. Herba est virgæ referens effigiem, triffaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno.

LOCVS.


DIOSC. Nascitur vbertim in Cili-
cia iuxta Gentiadem, aut Cif-
sadem.

QUALITATES.

Gal. 3. Incidentis & tenuium par-
sim. me. tium facultatis est, quare lie-
nes sanat. Ponatque ipsum
quispiam in tertio exiccanti-
um, secundo verò calefacien-
tium ordine.

VIRÉS.

DIOSC. Recens cum posca, aut ari-
dorum foliorum decoctum,
potu lienem porenter absu-
mit. Lienosis cum aceto, &
ficis illinitur. Ité serpentium
morsibus ex aceto solo.



TRIS.

TRISSAGO, Græcis, *Xauzidæus*. Arabibus, *Damederios*, *Camadrins*, *sue Kemadrins*. Hetruscis, *Querciela*, & *Chamedrio*. Italis cæteris, *Calamandrina*. Germ. *Camanderie*, *sue Klein Bathengel*. Hispa. *Chamedreos*. Gallis, *Germandree*.

TRISSAGO, SEV CHAMEDRYS.

FORMA.

Herba est dodrantalis, folia *Diosc.* habes exigua, & amara, querc^o effigie, & diuisura. Flore paruo, penè purpureo. Odoris *Matth.* non ingrati. Carpitur semine prægnans.

LOCVS.

Nascitur petrosis, & asperis, *Diosc.*

QUALITATES.

Vincentem habet qualita- *Gale. 8.* tem amaram, & est quodam- *simp. me.* modo acris. Ponatq; eam quispam in tertio ordine excalficientium, & desiccantium, plus tamè desiccatur, quàm calefacit.

VIREs.

Recentis decoctum bibitur *Diosc.* in tussi, in durato lieni, vrinæ difficultate, & incipiente hydrope. Cit menses, partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentinum venena ex vino pota, illitaque efficacissima. Vetera vlcera purgat ex melle illita, cum oleo illita caliginè oculorum discutit. Præstat quoq; ad o- *Matth.*



mnes frigidos capitis morbos, nempe ad comitiales, veterinosos, melancholicos, stupidos, resolutos, conuulsosque, & ad diuturnos capitis dolores. semen drachmæ pondere potum bilem per vrinas ducit. Ideoque conuenienter datur potandum iëtericis. Instillatur foliorum succus ad vermiculosas aures. Datur idem aduersus intestinorum vermes. Id quod etiam præstat vinum bibitum, in quo florescens herba die ac nocte fuerit macerata. Decoctum aliquot diebus potum mirificè tertianis febribus medetur.

CHAMEDRYS altera, Italis, Calamandrina secunda, & Querciola secunda. Germanis, Feldt Cypressen.

CHAMEDRYS ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folijs exit quercus. effigie, sed magis quàm in altera lacinariis, tenuibus, subnigricantibus, copiosioribusque, caules edit quadrangulos, tenues, lignosos, sesquidodrantales, surculosis ramis repletos, in quibus flosculi purpurei inter folia rutilant, & caules ipsos ambiunt., alterius chamedrys modo. Radicem habet multifidam albicantem. est autem planta aspectu iucundo, & eleganti, amara tamen, odore non iniucundo, resinam olènte.


Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Cum adeò amara non sit ut altera, ea quidem minus calida, siccaque fuerit, itaque ad omnia munia imbecillior, non tamen multò.

C E N S U R A.


Quòd hæc planta (ut credo) resinam respiciat, non desunt scriptores, qui putent eam legitimam esse Dioscoridis Chamæpitim: sed hallucinantur.

LYCHNIS.



LYCHNIS, Græcis, *Ανθις*. Italis, *Lichnide coronaria*. Germanis, *Margenröſ* lin..

LYCHNIS.



FORMA.

Coronaria Lychnis flore DIOSC. est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ facitatur. Folijs longis, tomento- *Matth.* fis, albicantibusque, caule lanuginoso, incano, cubito maiore, flore inodoro, sed pulchrø. Sylvestris per O- DIOSC. mnia vrbanae similis.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Matth.* spõre per se prouenit, quam sylvestrem appellant.

QUALITATES.

Semen calidum est secun- *Galen. 7.* do quodam modo ordine, aut iam etiam tertio, siccum sanè eodem quoque *sim. me.* modo..

VIRYS.

Semen duarum drachmarum pondere potum, bilem per alium detrahit. *DIOSC.* Idis à Scorpione subuenit. Aiumt huius herbæ appõitu Scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

CENSURA.

Sunt qui Pseudomelanthium in segetibus nascens sylvestrem Lychnidem faciant. Atqui cum Dioscorides agrestem Lychnidem vrbanae per omnia similem esse scribat, eamque sæpius viderim in inculto solo, non possum horum placitis subscribere..

LILIVM, Græcis, *Κελύων*. Italis, *Giglio bianco*. Arabibus, *Sufen*. Germa, *Silgen* seu *Silgen*. Hispanis, *Azucena*, seu *Lirio blanco*. Gallis, *Li*.

F O R M A.

LILIVM.

Matth. Folia fert longa, nunquā non virentia, læuia, pinguia, Pancratis similia, caulem profert bicubitalem, rotundum, rectum, læuem, pinguem, firmum, minoribus folijs ab imo ad summum circumuestitum, è cuius cacumine terni, quaternive ramuli exeunt, è quibus oblonga prodeunt capitula herbaceo colore, quæ tractu réporis lilia fiunt eximij cādoris calathi figura, extrinsecus striata, resupinis per ambitū labris, luteis aliquot ligulis ex calathi fundo (vt in croco) sursum spectantib, è quorum medio longum producit germen, rotundo in cacumine capitulo, herbacei coloris. Radice nititur bulbosa albicante, compactili squamarum serie.

L O C U S.

Idem. Scribitur passim in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Liliij flos temperaturam mistam obrinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; amaritudinem habet, partim ex aquea, eaque temperata. Quod autem ex eo conficitur oleum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet. Porro Radix foliaque desiccant, abstergunt, & digerunt moderatè. in radice plus abstergeris facultatis est, quàm in folijs.

V I R E S.

Diosc. Folia herbe illita auxiliantur contra serpentium ictus, seruefacta ambustis proficiunt. Aceto condita vulneribus opitulantur. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni ambusta sanat. Vulnam emollit, menses ciet. vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis luxatisque medetur. Vitiligines, furfures, leprasque emendat, & vlcera in capite manantia expurgat. Faciem abstergit, & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici mulceadistestium inflammationibus. Semen porum aduersatur serpentium moribus, ignibus sacris. Semen, & folia, cum vino illinuntur. Oleum quod è floribus paratur vteri duritias commodissime emollit: valet quoque ad omnes frigidis neruorum affectus, ad emollienda articulorum impedimenta, & scyrrhosos tumores. Illinitur vtiliter puerperis in vteri doloribus. Additur in clysmatibus emollientibus. Elixir radix ex vetere axungia illita pedum clauos cicit. Eadem ex adipe, & oleo imposita defluxos pilos replicat.

Matth.

MARTAGVM chymistis, Italis, Martagon, & Giglio saluatico. Germanis, Gold-
mirt.

MARTAGVM.

FORMA.

Folia promit vulgaris saponariae æmula, quæ ex interval-
lis orbiculariter caulem ambiunt, in cuius cacumine flores emicant tenui pediculo
nitentes liliorum effigie, sed
minores, quorum folia quo-
que retroflexa cernuntur, pur-
pureo colore, punctis qui-
busdam rufescentibus resper-
sa. Ipsique flores odorati sunt,
& aspectu incundi. Radicem
habet lilio similem, sed luteo
colore.


LOCVS.

Prouenit in montibus, & Idem
cliuosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Radix ad ea omnia commo-
da est, ad quæ Lilij.

BALLO-



BALLOTE, Græcis; Βαλλον. Italis, Marrobio bastardo. Germanis, Schwarz
Andorn. Hispanis, Marroio negro. Gallis, Marrubin noir.

BALLOTE.

FORMA.

Diosc. Caules edit quadrangulos,
nigros, subhirsutos, complu-
res ex vna radice, folijs maio-
ribus, quam marrubij, hispi-
dis, & per intervalla in caule
dispositis, subrotundis, gra-
ueolentibus. Candidi flores,
verticillato ambitu caulem
coronant.

LOCVS.


Matth. Nascitur in agrorum mar-
ginibus, & secus vias.

QUALITATES.

Paulus. Planta est acris, & absterfo-
ria facultatis.

VIRES.


Diosc. Vis eius efficax aduersus ca-
nis morsus; folijs ex sale illitis,
eadem feruenti cinere calefa-
cta quousque flaccescant, illita condylomata reprimunt, purgant tumelle
etiam sordida ulcera.



MARRUBIUM, Græcis, Περσίου. Mauritanis, Farufio, siue Frasium. Italis, Marrubio. German, Lindorn, siue Lungenkraut. Hispan, Maroio. Gallis, Marrubin.

MARRUBIUM.

FORMA.



Frutex est ab radice ramosus, Diosc.
candicans, subhirsutus, quadrangularib⁹ ramis, folium pollicem
æquat, subrotundum, hispidum,
rugosum, amaro gustu, semen in
caulibus, & ex interuallis, flores
verticillato ambitu, asperi.

LOCVS.

Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Et in arcis viarum. Diosc. Marth.

QUALITATES.

Marrubium vt gustu amarū est Gale. 8.
ita vt si quis vtatur, consentien- simp. me.
tem huic saporis actionē reperiet. Iecur, ac lienem obstructione
liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac menses pro-
uocans: sed & illitum detergit, ac
digerit. excalfacit quidem secun-
do ordine iam completo, & ter-
tio siccat.

VIREs.

Folia sicca cum semine in aqua Diosc.
decocta, aut viridum succus da-
tur cum melle suspensiois, tussien-
tibus, & ad tabitudinē redactis,
crassam ē pectore pituitam, cum

sicca Iride eijs cit. Mulieribus à partu non purgatis datur, vt menstrua, & secun-
das extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpenti-
bus demorsi sunt. Vesicam, renesq; lædit. Folia ex melle illinuntur sordidis vl-
ceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigat. Succus
folijs contusis expressus, solēq; coactus, ad eadem pollet. Cum vino, & melle
illitus, oculorum claritatem adiuuat. Naribus regium morbum expurgat, &
dolentibus auribus instillatur per se, & cum rosaceo. Decoquantur marrubij Marth.
binz vnciz vnā cum buglossi, helenij, & eupatorii radicum sesquidrachmas,
Rhabbarbari drachma, & agallici pari pondere ex vini albi generosi libris 3, ad
Ictericam. Nam vbi diebus decem continuis huiusce decocti binas vncias affe-
cti potauerint, præstantissimum reperient medicamentum, vbi tamen morbus
ab obstructione prouenerit.

MELISSOPHYLLVM, Melissa siue melitena, aut Apiastrum, Græcis, *Μελι-
φυλλον*. Arabibus, *Bederangie*, siue *Bederangi*, siue *Marmacor*. Italis, *Melissa*, *Cedronella*, & *Aranciata*. Germanis, *Melissein* Weutterfraut. Hispanis, *Torongil*,
seu *Hierua Cidreira*. Gallis, *Melisse*, & *Pom citrade*.

APIASTRYM, SIVE MELISSOPHYLLVM.

FORMA.

Diosc. Cauliculi, & folia essent Bal-
lote similia, nisi maiora te-
nuioraque, nec ita hirsuta spe-
ctarentur. Citreum malum
olent.

LOCVS.

Matth. Seritur passim in hortis, ac
etiam sponte per se nascitur in
collibus, & montibus.

QUALITATES.

Auic. lib. Excalfacit, siccaturque ordi-
de viribus ne secundo.
cordis.


VIRES.

Diosc. Folia cum vino pota, aut il-
lita profunt contra phalangio-
rum, & scorpionum ictus, &
canis quoque morsum. Folia
auxiliantur fungorum strangu-
lationibus in potu addito ni-
tro. Illita cum sale strumas dis-
cutiunt, vlcera purgant, arti-
cularios dolores illita sedant.

Serapio. Melissophylli proprium est a-
nimum hilarem reddere, hu-
menti ac frigido ventriculo

auxiliari, concoctionem adiuvare, cerebri obstructions referare, deficientem
animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, quinetiam eius pulsus re-
primere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ &
ab atra bile, & ab exusta pituita gignuntur. Vires deiectionarias possidet, nec adeo
imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus, & à sanguine, qui cordi &
arterijs inest educere queat. quod in cæteris corporis partibus efficere nequit.

**Auic. ibi-
dem.**



MOLVCA, Italis, *Melissa Constantinopolitana*.
MELISSA MOLVCA, SIVE CONSTAN-
TINOPOLITANA.



GENERA.

Duum est generum, altera *Marth.* levis, altera aculeata.

FORMA.

Vtraque folio est melysso- *Idem.* phylli quadantenus simili, brevius tamen, & minus denticulato, sed in altero genere circumquaque aculeato, amaro sapore, nec vilo citrei mallo-odore. profert calyces quosdam tintinnabuli effigie herbaceo colore, in quibus semen ori-
tur.

QUALITATES, ET
VIRES.

Aperit, attenuat, excalfacit, *Idem.* abstergit, venenis resistit, & animalium venenosorum ictibus mirificè auxiliatur, tum po-
ra, tum quoque illita. Ictericos iuvat, interaneorum animalia necat. Datur utiliter succus pe-
stilentibus febribus affectis.

MELIS-

MELISSA Moldauica, Italis, *Cedronella di Moldauica*. Germanis, *Erdbeß* *W.*
Liffen.

F O R M A.

Matth.

Caules edit bicubitales, quadrangulos, subrufescentes, ramososq; folia in ramis ipsis viticæ figura, sed longe minora. flores in summitate purpureos, saluix æmulos, verticillatimque inter folia emergentes. Tota planta citrei mali odore quàm belle spirat. Radice nititur vnica, sed fibrata.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, sed ex Muldauia primum ad nos delata est, vbi spontè per se provenit.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Excalfacit, siccatque ordine secundo, aperit, attenuat, & incidit.

V I R E S.

Idem.

Vires habet Apiastro per omnia similes.

MELISSA MOLDAVICA.



STACHYS, Græcis, Σταχὺς. Italis, Stachi.

STACHYS.



F O R M A.

Frutex est Marrubiō simi- Diosc.
lis, sed lōgior, folia ferens nu-
merosa, hirsuta, rara, prædura,
cana, odoris iucundi, & com-
plures virgas, ex vna radice ex-
euntes Marrubio candidio-
res. Flores spicatos, subpur- Matth.
pureosq; * & plerumq; sub-
luteos.*

L O C V S.

Nascitur in montibus aspe- Diosc.
ris.

Q U A L I T A T E S.

Frutex est stachys gustu acri, Galen. 8.
& amaro, tertij ordinis exal- simp. me.
facientium.

V I R E S.

Foliorum decoctum potu Diosc.
pellit menstrua, & secundas.

PSEVDOSTACHYS, Germanis. Riechender Andorn/ Feld Andorn.

PSEVDOSTACHYS.

Pseudostachys hanc plantam appellare libuit, quod & ipsa stachym in multis notis referat.

* Planta est caule quadrato, folijs hirsutis, albis, maioris saluiæ figura, verbasci folia colore referentibus. flores gerit Marrubij purpureos, semen rotundū vasculis inclusum.*



PEYLL.

PHYLLITIS, Græcis, Φυλλίτις. Italis, *Lingua ceruina*, ac præter Fillite. Officinis, *Falso, Scolopendria*. Germanis, *Hirschjungen*. Hispanis, *Lingua ceruina*. Gallis, *Lang de Cerf*.

PHYLLITIS.

FORMA.



Folia promit Rumici simi Diosc. lia, longiora, & viridiora, sena, aut septena, quæ parte inferiore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostédunt, gustu acerbo. Neq; caulem, neq; semen profert.

LOCVS.

In vmbrosis, & opacis hor. Diosc. torum locis emicat.

QUALITATES, ET VIRE.

Cum qualitatibus sit acerbæ, Galen. 8. non absurdè diarrheas, siue simp. vie. profluuia, & dysenterias pota iuuat.

Folia in vino pota serpenti. Diosc. um morsib^o aduersantur, quadripedibus per os infusa au-

xilio sunt, & si dysenteria aut resoluta aliis exercet potui datur.

Expertum quoque est à compluribus valere phyllitim ad splenis affectus. Matth. Vtuntur quoq; quidam stillatitia eius aqua contra singultum, & cordis pulsus, atq; in animi deliquiis, eandem gargarissandam quoque præbent ad prolapsam columellam. Siccorum foliorum farina ex earundem aqua excepta, & admota refrigerat ventriculi, & iocinoris ardore.

CENSURA.

Aberrant qui phyllitim Asplenium, siue scolopendrium esse censent.

PHALANGIVM, Græcis, Φαλάγγιον. Italis, Falangio. Germanis, Weisser Weiden/Grasgilgen.

PHALANGIVM.

FORMA.

- Diosc.** Ramuli sunt illi duo, aut tres, plurésve, in diuersa tendentes. flos candidus, lilio similis multas incisuras habēs, femine nigro (postea enim contrahitur) lato ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. Folliculi in quibus semen concluditur phalangij formam referunt, vnde illi nomen.
- Matth.**

LOCVS.

- Diosc.** Prouenit in collibus. Et in
Matth. montibus.

QUALITATES.

- Galen. 8.** Est autem facultatis tenuissimæ. **simp. me.** um partium, desiccantis.

VIREs.

- Diosc.** Huius folia, semē, flos cum
Galen. vino pota auxiliantur contra scorpionum, phalāgiorumq; ictus, tormina quoq; discutiunt.



TRIFOLIUM, Græcis, Τρίφυλλον. Italis, Trifoglio bituminoso. Germ. Hartzlee.

TRIFOLIUM ASPHALTITE.

GENERA.

Plura sanè habentur generâ Matth. ra, nempe Asphaltite, Pratenſe, Acetoſumq;.

FORMA ASPHALTITIS.

Frutex eſt qui ſupra cubiti Dioſc. altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iunceaſ, & nigraſ, vnde ramulares enaſcuntur appendiculæ, in quibus terna ſinguliſ germinationibus exeunt folia, loto arbori ſimilia. iſs recenter enatiſ crucæ odorineſt, ubi autem adoleuerunt bitumen olent. Florem edit purpureum, ſemen quadantenus latum, ſubhiſſutum, ex altera extremitate exertum antenæ modo corniculû gerens. Radix tenuiſ, longâ, validâ.

LOCVS.


Nâſcitur in Sicilia, & in I. Scribonitalia circa Lunæ portum. uſLarguſ.

QUALITATES.

Viſ plantæ eſt calidâ, & ſicca, vt bitumen cui odore eſt ſimiliſ, vtrinque ter- Galen. 8.
tio ordine. ſimp. me.

VIREſ.

Semen & folia in aqua pota pleuriticiſ, urinaſ difficultati, comitialibuſ, & iſs Dioſc. qui aquaſ intercutem principia ſentiunt, fœminiſ quoq; vuluæ vitioſiſ opportuniſ, auxiliantur. Menſeſ ciunt. Ternæ drachmæ è ſemine dari debent, è foliſ verò quaternæ, contra ſerpentium icuſ trita folia ex oximelite pota præſidio ſunt. Quidam terna folia, aut ſemina in tertianis cum vino potui dedere, & in quartanſ quaterna. Radix antidotiſ inferitur.



TRIFOLIUM Pratense, Italis, *Trifoglio*. Germanis, *Diesentlee*.

TRIFOLIUM PRATENSE.

GENERA.

Matth. Trium est generum, foliorum, & florum diuersitate differendum.

FORMA PRIMI.

Matth. Primum folijs est subrotundis, maculosis, longo pediculo nitentibus, obsequioso, flexilibus; floribus in capitulis subpurpureis, aut albicantibus, in cauliculis summis emicantibus.

LOCVS.

Idem. Nascitur in pratis, & herboso solo.

FACULTATES, ET
VIRES

Idem. Sunt qui Trifolij pratensis succum miris laudibus efferrant ad oculorum nubeculas, vulnera, & cicatrices. Idem tempestates pronunciat, inhorrescit enim & folia contra tempestates subrigit. Vniuersæ florentis plantæ decoctum potum, alba vteri profluvia cohibet. Semen, & flores ex aqua decocti, & ex oleo admodum duros emolliunt abscessus.




TRIFO.

TRIFOLIUM pratense alterum, Italis, *Trifoglio indifferenter dicitur*. Germanis, *Spistlee*.

TRIFOLIUM PRATENSE ALTERUM.

FORMA.



Cauliculis assurgit lentis, *Matth.* obsequiosisque, folijs in vnoquoque; pediculo ternis, varia tamen facie perinde ac bituminosum. Namque quædam quæ ad radicem sunt Acetosi trifolij modo quod oxym vocatur trina ex vnico pediculo emergunt, cordis faciem quadamtenus imitantur, cætera verò longa sunt, & in cacumine acuminata, vt in Asphaltite. flores in capitulis sunt illi purpurei in flocci modum.

LOCVS.

Prouenit sponte in pratis, *Idem.* & viridarijs, & herbosis locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem præstare potest, quod *Idem.* alterum,

TRIFOLIUM acetosum, Græcis, *ὄξυς*. Barbaris, *Albulia*, *sive Lulola*, *sive Parunculi*. Italis, *Trifoglio acetoso*. Germ. *Gauchbrodt*; *Sawrtice*.

TRIFOLIUM ACETOSUM.


* GENVS.

Differt primo sexu, Fœmina enim flore albo conspicitur, venis purpurascētibus distincto. Mas totus purpureus, rarus inuentu. Deinde habetur quoddam genus totum supinū & repens luteis flosculis.*

FORMA.

Matth.

Vulgaris Oxys cauliculis exit abvna radice plurib⁹, exiguis, rotundis, ac tenuibus, quorum singulis ternis in summitate sunt folia, cordis figura, mollia, acido gustu. flores edit albos, stellæ figura. Radicem habet subrufam; compactili squamarum serie obductam.* Alterum genus quod serpit & flosculos habet flavos, eosdem paruos iridem stellatos, foliolis non differre à vulgari nisi quod hirsutiora sint & breuiori pediculo annexa, semen gerit in corniculis oblongis, quæ attracta semen expuunt. Sed adeo concidunt rimulæ vt non appareat dissilijsē siliquas.*



LOCVS.

Idem.

Nascitur opacis locis, propter sepes, & itinera.

FACULTATES, ET VIRES.


Idem.

Tota planta refrigerat Oxalidis modo, proinde deuorata sitim extinguit, sic refrigerat, & cor corroborat. Stillatina eius aqua datur vtiliter potanda acuta pestilentiq; febre laborantibus. atqui longè præstat herbæ succus ex saccharo porus. Illinitur idem per se Erysipelatis, & inflammatis locis, colluiturq; ex eo os vbi lingua, palatum, faucēsve calida fluxione laborent. In summa ad ea omnia censetur vtilis Oxys, quibus Oxalis auxiliari valeat. Datur ad stomachum dissolutum. edunt & qui enterocellem habent.

Plin.

TRINITAS, Italis, *Herba Trinita*. Germanis, *Gulden Lebertraut*.

T R I N I T A S.



F O R M A.

Folia fert triquetra, æderæ minoris magnitudine, quæ aduersa parte cyclamini modo subpurpurea sunt, superiore verò parte maculis quibusdam albicantibus respersuntur. Caules habet tenues, in quorû cacumine primo statim vere flos emicat cæruleus in stellæ modum, è quo capitulum oritur echinata quadantenus specie, in quo semen oblongum subcæruleumque. Radicibus est numerosis, tenuibus, subrubentibusque. *Matth.*

L O C V S.

Prouenit locis opacis, & in frutetis. *Idem.*

F A C U L T A T E S, E T V I R E S.

Vulneraria est herba, tam admota, quàm in potionibus sumpta, quin etiam ad cterocelas mirificè præstat, epota foliorû farina ex vino austero diebus pluribus continuis cochlearij mensurâ. Decoquitur tota herba ex eodem vino ad columellæ, fauciumque inflammationes.

O o 5 P O L I V M,

POLIVM, Græcis, *Πόλιον*. Mauritanis, *Cahade*, siue *Iahade*. Italis, *Polio*. Gallis, *lue muscate*.

POLIVM.

GENERA.

Matth. Duo Polij extant genera, montanum, & alterum fruticosius, non vsque aded valens odore.

FORMA MONTANI.

Matth. Planta est candicans, folijs oblōgis, & per intervalla caules ab imo ad summū vestientibus, pluribus etiam minoribus inter inaiora subnascentibus; caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignososq;, albicantes, & qui in cacumine capitula edant florida, candicantia, thymi figura tota plāta odorata est, sed non sine odoris grauitate, acuitateq;ue.

LOCVS.

Matth. Prouenit in mōtibus, exultato solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Amarum est gustantibus, & modicè acre. Vis quoque Polio inest reseransimp. me. di, incidendi, attenuandi, & abstergendii.

Matth.

VIRES.

Diosc. Foliorum decoctum potu auxiliatur serpētium morfibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis cum aceto: stomachum verò malè habet, caput doloribus afficit. Alium & menses ciet: substratum, suffitumve serpētes abigit. Illitū vul-
Gal. ibid. nera conglutinat. Omnia viscera obstructione liberat, aridum cum fuerit, maligna vlcera sanat, viride verò magna vulnera. Adalligatur fronti contra oculorum suffusiones, protinus vbi inuentum sit, nec alia herba magis conuenit.

Matth.



POLIUM alterum, Græcis, Πόλιον ἑτερον. Italis, *Polio secondo*. Herbarijs nonnullis, *luz muscata*. Germanis, *Marienfraut* wild Eaucndel.

P O L I U M A L T E R U M.

F O R M A.

Folijis, caulibus, capitulis, ac *Matth.* floribus altero similis est.

L O C U S.

Nascitur in campestribus, *Idem.* saxosis, & ex cultis locis.

F A C U L T A T E S,
E T V I R E S.

Ab altero facultatibus non *Idem.* differt.

A P P E N D I X.

Tametsi hæc plantam sciam *Idem.* non esse secundum Polij genus à Dioscoride conscriptum, cum tamen omnibus suis partibus, sapore, odoreque montanum polium referat, non quidem temerè factum putavi, eam inter Polij genera fore recensendam, & præsertim, cum omnibus Polij facultatibus sit prædita.

S C O R D I U M,



SCORDIVM, siue Trissago palustris, Græcis, Σκόδιον. Arabibus *Scordeon*, siue *Scordeum*. Italis, *Scordio*. Germanis, *Wasserbatenig* seu *Knoblochstraut*. Hispanis, *Scordio*. Gallis, *Chamaraz*.

SCORDIVM.

FORMA.

DIOSC. Folij erūpit trissaginis maioribus, nec sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris, & adstringētibus, caulibus quadrangulis, subrubro flore.

LOCVS.


Idem. Nascur in mōtibus, & palustribus.

QUALITATES.

Galen. 8. Exmultiformibus id tum fa-
simp. me. cultatibus, tum saporibus constat, nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maxime allio assimilis eius est acrimonia, unde mea sentētia, nomenclaturam obtinuit: expurgat igitur, simulque exalfacit viscera.


VIRES.

Matth. Herba vim exalfactoriam habet, urinam ciet, cocta recens, aridave cum vino bibitur ad venenatos serpentium morsus, ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem binis drachmis ex aqua mulsa. Crassamen purulentum ē pectore expellit. Aridæ farina facit ad veterem tussim, rupta, conuulsaque; si cū nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicē præcordia cerato excepta recreat. Menses imposita mouet, vulnera coaglinat, vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca exterrētias in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Laterum dolores ab
Gal. li. 8.
simp. me. obstructione, & frigore natos sanat epotum.



ALLIARIA, Italis, *Alliaria*. Germanis, *Knoblauchstrauch*, *lauchel*, *Saßtraut*. Gal-
lis, *Alliaire*.

ALLIARIA.



FORMA.

Huius folia cum primum erum- *Matth.*
punt, ferè rotunda spectantur, viola-
riæ similitudine, postquam verò ad-
oleuerint, per ambitum serrata eua-
dunt, vt quadantenus apiastri faciem
repræsentent, leniora tamen sunt, &
prope caulem latiora, quæ digitis at-
trita, gustataque allij odorem, sapo-
remq; reddunt. Caulem proferit bi-
cubitalem, rotundumque, flores al-
bos, & semen nigrum tenuibus fili-
quis inclusum. Radix, quæ longius-
cula est, eundem cum folijs odorem
retinet.

LOCVS.

Iuxta sepes, & in agrorum margi- *Idem.*
nibus nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, aperit, inci- *Idem.*
dit, digerit, prouocat.

VIRES.

Semen emplastri modo vuluæ admotum, mulieres vteri strangulatu oppress. *Idem.*
sas liberat, & excitat.

TVSSILAGO, Græcis, Βήρυον. Officinis, Farfara, seu Vngula caballina. Italis, Farfara, seu Farfarella, & Vnghia di Cavallo: Germ. Kosshub/ Efelshuff/ siue Brandlattiſch. Hispanis, Vnha de Asno. Gallis, Pas de Asne, siue Tacconner.

T V S S I L A G O.

G E N E R A.

Matth. Tria Bechij numerantur genera, quamvis Dioscoridi vnum tantum sit genus.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Folia promit maiuscula, quam hedere, sex aut septem, à radice à terra subalbida, superne virentia, in plures angulos exeuntia. Caulis dodrantalis, flos luteus, vere prodit, quo vna cum caule confestim exuitur. Inde nonnulli his vacare existimarunt. Radix tenuis est.

L O C U S.


Diosc. Nasctur in amœnis & riguis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Modicè est acris.
simp. me.

V I R E S.

Diosc. Folia ex melle trita, igni sacro, & omnibus inflammationibus, illitu medentur. Arida suffitu ita vt fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanat, qui sicca tussi, atque orthopnea infestantur. Pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præber suffuta radix. Eadem decocta in hydromelite, & pota mortuos partus eiicit.



*TVSSILAGINIS FLORES.



Malè pinguntur flores inter folia iam grandia prodeuntes. Primo vere namq; oriuntur nudi, & in pappos abeuntes nudi percunt.*

TVSSILA-

TYSSILAGO maior, Petasites, Græcis, Βύσσινος, Italis, Fatsfara maggiore.
Germanis, Pestilenzwurt.

TYSSILAGO MAIOR.

Matth.

FORMA.

Caulē edit, anteaquam folia emergant in ipso Veris principio, concavum, dodrantalem, pinguem, purpurascētem, parvis & oblōgis circumvestitum folijs. In cuius cacumine flores exeūt spicati, subpurpurei, qui vnā cum caule paulō post contabescunt, & in pappos dissoluuntur. Eodem fere tēpore foliā ē terra emergunt, altera parte incana, quæ antequam adoleſcant Tussilagini ante scriptæ similia spectātur. Verū posthac in tam magnam crescunt amplitudinem, vt Personatæ folijs longē maiora habeantur. Horum singula pediculo nitūtur purpureo, alba lanugine obducto. Radicē edit longam, brachij quandoque humani crassitudine, intus cādīdam, amaram, atque odoratam.

Matth.

L O C U S.

Crescit humectis & vliginosis locis, & præsertim prope riuos aquarū, perinde ac altera.


Idem.

QUALITATES.

Radix excafcit, attenuat, incidit, & abstergit, vt eius euīdens indicat amritudo.

VIREs.

Constat radicē multis experimentis præstare cōtra pestilentiam, & pestilentes febres, vbi eadem in puluerem contrita duarum drachmarum pondere ex vino propinetur, & deinde sudare cogantur ægri. Quamobrem Germanis pestilētiz radix appellatur. Præstat eadem ad vteri præfocaciones, & cruciatus, eodem modo sumpta. Propinatur item veterinarijs, & pastoribus contra quadrupedum vermes, & equis qui anhelandi difficultate laborant. Reliqua cum Tussilagine communia habet.



*PETASITES FLORE ALBO.

FORMA.

Mense Februario suos promittit flores nondum emortuis folijs, densos, pusillos, multos, racemosos, minores quàm in vulgari, similes tamen, sed albos totos, qui in pappos similiter abeunt. Folia oblongis pediculis insident, Tussilaginis folijs æqualia. Radix intra terram quoquo versum reptat, & singulis annis, annatis nouellis se propagat.*



Pp

Tussr.

TVSSILAGO altera, siue Farfugium, aut Farranum, aut Chamelence. Caltha palustris. Italis, *Farfugio*. Germanis, *Dotter Blumen*.

F O R M A.

Matth.

Folij exit nigre populi amplioribus ad tussilaginis faciem inclinantibus, atqui non tot exertis in ambitu angulis, nec à terra tam albicantibus. Caulem edic sesquidodrantalem, à quo plures egrediuntur rami, in quorum summitate flores exeunt aurei, magni, rosarum figura. Radicem habet albam, & subamaram, floret vere, Aprili præsertim mense, & Maio quoq;


L O C V S.

Idem.

Nascitur circa riuos aquarum in conuallibus, & pratis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Vbi vulgaris, ac vera Tussilago non fuerit ad manus, Farfugium eius loco bellè substitui potest. nam ijs ferè viribus præstat.


TVSSILAGO ALTERA, SIVE
FARFUGIVM.

ARTE.

ARTEMISIA, Græcis, *Ἀρτεμισία*. Italis, *Artemisia*. Germanis, *Wenfuß*; & *S. Johannis Gûrtel*. Hispanis, *Artemisia*. Gallis, *Armaise*.

ARTEMISIA.

F O R M A.



Artemisia exit caulib⁹ plu- *Matth.*
ribus, rectis, sesquicubitalib⁹,
interdum rubentibus, forun-
dis, striatisq[;]. Folia gerit absin-
thio leuiora, pinguiora, supi-
na parte albicantia, sed quæ in
caule sunt longè minora spe-
ctantur. Flores copiosissimi in
caulium ramusculis racema-
tim exeunt, parui, pilosi, odo-
rati, albicantes, è quibus mi-
nutum oritur semen. Radi-
cem habet lignosam, multifi-
dam minimi digiti crassitudi-
ne. Tota planta odore spirat
haud ingrato.

L O C U S.

Magna ex parte in monti- *Diosc.*
bus nascitur. Imo fere vbiq[;] *Matth.*
locorum.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & modicè desic *Gal. 6.*
cat. quòd autem ad calefactoriam attinet, excessus est secundi. quod verò ad re- *simp. me.*
siccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis. est quoq[;] & modicè te-
nuum partium.

V I R E S.

Conuenienter adijcitur seruefacta in muliebres desessus ad detrahendos *Diosc.*
menses, partus, secundasq[;]. Item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflamma-
tiones. calculos comminuit, remoratum vrinam ciet. Et menses pubi illita pel-
lit. succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit. Coma tribus
drachmis eorundem eiiciendorum gratia sumitur.

AMBROSIA, Græcis, *Ἀμβροσία*. Italis, *Ambrosia*.

PSEVDAMBROSIA.

F O R M A.

Diosc. Pusillus est frutex, ramosus trium palmorum altitudine, folijs rutæ circa imum caulem exiguis, cauliculi feminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suau. Radice tenui, sesquipedali.

L O C V S.

Matth. Prouenit in montibus, & collibus, amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Cataplasmate imposita vim habet adstringentem, & repellentem.

V I R E S


Gal. 6. Vis eius reprimere, ac repellere, & illitæ adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

* A P P E N D I X.

Missa est Autori hæc planta, quam quidam Nasturtium verrucarium appellant, pro Ambrosia, pro qua etiam alij, vnde idem accepit, sibi hanc missam fatentur, id quod monendum censi lectorem, ne turbaretur si in hanc iconem incideret. Nec desunt qui pro Coronopo habeant, sed non astringit ipsius radix odore & sapore Nasturtium referens, & Psyllij nihil habet, nec graminis. Sed folia Nasturtio pene similia sunt, maioribus tamen diuisuris, pluribusque depressa rotunda aspera; promit semina racematim coherentia, luteis inrus granulis repleta. Prouenit passim secus itinera, odore destituitur, sola acedine nares feriens.*

AMBROSIA altera. Germ. Klein Draubentraut.

AMBROSIA ALTERA.



Hanc plantam Ambrosi-*Marth.*
am quoq; nobis vocari libu-
it, quod omnibus ferè notis
Ambrosiam referat.

BOTRYS, Græcis, Βίτρυς. Italis, Botri. Germ. Traubenfrant / Mattenfrant / Wä-
 ffischer Bockfuß. Gallis, Pjment, Migraine, Millegraine, seu Patience.

BOTRYS.

FORMA.

Matth. Folijs provenit Cichorij,
 aut quercus modo lacinia-
 tis, sinuosisq; ramis numero-
 sis, tenuibus, semine copiosissi-
 mo, racemosoq; refertis. Plā-
 ta tota rufescit, & resinoso
 quodam succo mader, adeo
 ut compræhēsa manibus hæ-
 reat, odorem quidem acrem
 spirat, & qui graueolētia qua-
 dam nares afficiat. non tamen
 sine aliqua suauitate.

LOCVS.

Diosc. Inuenitur in conuallibus,
 & in torrentium alueis.

QUALTATES.

Matth. Excalfacit, & siccat, aperit,
 incidit, abstergit, & crassa ex-
 crementa expectorat.

VIRES.

Diosc. Pota orthopneas mulcet.

Matth. Præstat eadem ad omnes pe-

ctoris, & thoracis affectus pi-
 tuiriosos; quinimo etiam sup-
 puratos adiuvat, quin etiam
 asthmaticos, & suspiriosos tū
 herba ipsa ex decocto dulcis
 radice pota, rum ipsius herbæ decoctum pluribus diebus haustum, addito vi-
 laceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirifice auxiliatur. Herba
 ipsa facit quoque ad vteri cruciatus si in calenti regula vino irrorata calefiat, &
 ventri imponatur. Puerperarum à partu dolores mulcet. Concisa, & in patella
 ex oleo lilino, & ouorum vitellis calefacta, vnà cum parthenij, & anthemidis
 floribus, adeo ut placentæ formam recipiat, & deinde calida ventri illinatur.
 Suffiuntur eiusdem herbæ vapore vtiliter fœminæ ad menses ciendos, & emor-
 tuos fœtus eieiendos. Herba ipsa arida vestib⁹ interposita à tinea, & blattis es-
 tuctur, & odoratas reddit.



GERANIUM, Græcis, Γεράνιον. Italis, Geranio. Officinis, *Rosæram Ciconia*, vel *Rosæstrum græus*, vel *Acus muscata*. Germanis, Welscher Storchschnabel. Hispanis, Fico de cinguenba. Gallis, Bec de Ciconne.

GERANIUM.

GENERA.

Sex Geranij genera nobis *Matth.* reperta sunt; ut inferius patebit. Dioscoridi duo tantum habentur, Plinio tria.

FORMA PRIMI.

Geranium folijs est anemo *Matth.* nes, diuisuris longioribus in vnoquoq; folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectum, tenuem, geniculatorumq;. Flores è geniculis in caule prodeunt punicei rosarum syluestrium ferè figura, sed longè minores, & quinque tantum folijs referri, è quibus rostellum oriuntur inferna parte lunati. Radice nititur rotunda, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita.

LOCVS.

Nascitur copiosum in Dal. *Idem.* maria incultis locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Radix drachmæ pondere in vino pota vuluæ inflationes discutit. Reficiens *Idem.* tibus se ab imbecillitate vtilissima est. Bibitur contra phthisim drachma in vini cyathis tribus bis in die. Succus radice auribus medetur, Epystoronicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum, auxiliatur.

GERANIVM secundum. Italis, *Geranio secondo*. Germanis, *Zauben Fuß*.

GERANIVM II.

FORMA.

Matth. Folijs est malvæ minoribus, pediculis tenuibus, longis, & subrubentibus: caulibus gracilibus, flexilibus, floribus puniceis, è quibus acuminati apices oriuntur, gruinis capitulis similes. Radicem habet tenuem, do-drantalem, & fibrosam.

L O C U S.

Matth. Nascitur secus itinera, locis incultis, & in hortis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Additur à Chirurgicis in positionibus intrinsecorum vulnorum, & fistularum, quinetiam radicibus, & folijs ad recentia vulnera, & vlcera sananda, vtuntur. Foru quoq; vsurpantur ad articularum dolores.



GERA-

GERANIVM tertium. Italis, *Geranio terzo*. Germanis, *Storchschnabel*.

GERANIVM III. .

FORMA.



Folijis viret cicuræ minori- *Matth.*
bus, seu Myrrhidis proximis,
minus tamen laciniatis, humi
accubantibus, quæ senescētia
rubescunt: caules habet bre-
ves, rotundos, pilolos, ruben-
tesque: in quorum summitati-
bus spectantur flores punicei,
parui, stellæ figura, è quibus a-
cuti oriūtur apices gruinis ro-
stris similes, sursum spectan-
tes, capitulis balauftij effigie:
radice nititur candida tereti,
ac dulci.

LOCVS.

Nascitur in ruderibus, circa *Idem*.
sepēs, secus itinera, & saxoso,
& extenuato solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem cum secundo gene-
re viribus pollet.

Pp 5

GERA-

GERANIUM quartum. *Italis, Geranio quarta. Germanis, Goffes gnad, Blau Hanenfuß.*

GERANIUM IIII.

FORMA.

Matth.

Folijis affurgit cæteris gran-
dioribus, ranunculi æmulis,
octonis, circumquaq; diuifur-
ris, numerosis, humi accuban-
tibus, prælongis, ac firmiori-
bus pediculis, nitentibus: cau-
les edit pinguiusculos, & ar-
ticulatos, ramis copiosis, in
quorum cacuminibus, flores
emicant in cæruleo purpurei,
cæterorum maiores. Quibus
flaccescentibus gruiua (vt in
cæteris) prodeunt capita, pro-
no in summitate rostro, tri-
plici apice in coronæ modum
reſciſſo. Radicē quoq; cæte-
ris lōgiorem habet, craſſiorē,
robustiorēq; colore ruſe-
ſcēre, & lignoſa int^o matrice.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in pratis in Ger-
mania & Boëmia.

FACULTATES,
ET VIRES.

[Vulneraria est herba, & præsertim radix tam in portionibus addita, quam ex-
terius admota.



GERANIUM quintum. Italis, *Geranio quinto*. Germanis, *Kupprechtskraut*.

GERANIUM V.

FORMA.



Folia promit pentaphylli *Marth.* modo diuisa, magis tamē per ambitum serrata: subhirsuta, & praelongis pediculis, ipsisq; pilosis nitentia: caules habet dodrantes, tenues, & lanuginosos. Flores ex purpura rufescentes, è quibus parua, acutaque oriuntur siliquulae, hirsutae, ac subasperae, in quibus semen concluditur. Radicem habet dodrantalem, sed tenuem.

Locvs.

Nascitur arido solo.

Idem.

QUALITATES,
ET VIRES.

Germanorum medici hanc *Idem.* tritam recentemq; peculiari-ter commendant ad Erysipelas, ad inflammationes mamillarum, & oris, & pudendorum vlcera.

GERA-

GERANIUM sextum, Italis, *Geranio seſto*.

GERANIUM VI.

F O R M A.

Matth.

Folia profert Altheæ proxima, caules plures, lentos, geniculatos, hirsutos, flores paruos, rubêres, balauſtij effigie, è quibus roſtrata prodeunt capitula. Radix illi eſt ſeſquidrantalis, digiti craſſitudine, quæ humotenus rubefcit.

L O C V S.

Idem.

Nafcitur in montibus, & præſertim in Baldo monte in agro Veronenſi.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Viribus præſtat vulnerarijs, & ijs omnibus, quibus & cætera genera.




GNAPHA-

GNAPHALIUM, Græcis, Γναφάλιον. Italis, Gnafalio.

GNAPHALIUM.

F O R M A.



Gnaphalium planta est inca- *Matth.*
na tota, tomentosaque, cauli-
bus compluribus fruticans, cir-
ca quos totos folia insunt cras-
siuscula, oblonga, lanuginosa,
ac mollia: quæ verò in caulium
summitate spectantur in rosæ
modum orbiculata sunt. Radi-
cem habet multifidâ, ac ligno-
sam.

L O C U S.

Prouenit raris in locis in Ita- *Idem.*
lia, & gaudet apricis, & siticu-
losis.

Q U A L I T A T E S.

Gnaphalium, ideo sic nomi- *Gal. li. 6.*
natum est, quòd folijs eius mollibus, ἀνήγναφάλιον, hoc est, pro tomentis vtan- *simp. me.*
tur: sunt autem candida, & mediocriter adstringunt, proindeq; sunt, qui ex vi-
no austero dysentericis propinent.

V I R E S.

Bibuntur efficaciter folia ex vino austero ad dysenteriam. Quinetiam ad *Diosc.*
diarrheam & cæliacas passiones. Profunt quoque enterocellis in puluerem *Matth.*
hausta.

GNAPHA-

*GNAPHALIUM vulgare, Impia Plinij, Herba torminalis. Germa. *Nystrant*.

F O R M A.

Incana tota est, vt prior, & quæ tomenti vicem præstare possit, caules pmit exuccos, mollibus, lanuginosisque folijs refertos, diuaticatos in ramos complures, quorum nouelli superât longitudine vetustiores, & rotundâ florû capitula quæ modo nata sunt altius surgentia despiciunt inferius relictâ ortu priora. Semine pusillo seipsam serit quorannis, radice namque pusilla non diuturna nititur.

L O C V S.

Nascitur in locis sabulosis apricisque aggeribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem huic ascribuntur, quæ priori.*


GNAPHALIUM VULGARE.



TYPAL

TYPHA, Græcis, Τύφα. Italis, *Mazza fonda*. Germanis, *Mosstolben* seu *Narrenstolben*. Hispanis, *Bobordo*, seu *lunco Amacorocado*. Gallis, *Mache* seu *Masse de iunc*.

TYPHA.



FORMA.

Folium edit Cyperidi si- Diose-
mle, caulem album, leuem,
æquabilem, florem in cacu-
mine ambientem, densum,
qui in pappos soluitur, quod
paniculam aliqui vocant.

LOCVS.

Gignitur in palustribus, & Idem
aquis stagnantibus.

FACULTATES,
ET VIRES.

Huius herbæ flos suillo Idem;
adipe eloto exceptus, am-
bustis medetur.

FILI-

FILIPENDULA, Italis, *Filipendula*, Quibusdam *Oenanthe*, sed falso. Germanis, *Steinbrech*, Erdt Eichein.

FILIPENDULA.

FORMA.

Matth.

Folij est numerosis ab vno pediculo vtrinque seriatim dependentibus, pinnellæ siue sanguisorbæ modo, magis tamen sese stipantibus, oblongis, & per ambitum denticulatis, caulibus sesquicubitalibus, in quorum fastigijs flores sunt albi, in umbellæ ferè speciem coherentes, atque odorati. Radices habet multifidas, funiculi modo exiles, sed globulis numerosis refertas perinde, ac in præonia fœmina, sed longè minoribus, oblongis, & rariusculis.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in pratis & herbosis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.


Idem.

Radix pota vrinæ remoratur, eiusque stillicidio auxiliatur. Item renum, tum calculis, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspiriosis, & ægrè spirantibus, omnibusque in vniuersum morbis, quos spiritalia excitauerit. Radicum siccarum puluis vtiliter inspergitur comitialium cibus.



OENANTHE, Bulbocastanum, Tralliani, Græcis, Οινάνθη. Italis, Enante. Germanis, Erd Rosten.

OENANTHE I.



F O R M A.

Folia habet pastinacæ, flori-
diosc.
rem candidum, caulem cras-
sum, palmi altitudine, semen
atriplicis. Radicem magnam,
in multa rotunda capitula ex-
tuberantem.

L O C U S.

Nascitur in petris. * Bulbo-
diosc.
castanum agris innascitur. *

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Semen, caulis, & folia cum Idem.
mulso vino pota, secundas eij-
ciunt. Radix ex vino urinae stil-
licidio conuenit.

A P P E N D I X.

Si huic plantæ caules ines-
sent crassi, assererem profectò
legitimum esse Oenanthe.

OENANTHE secundum. Italis, *Filipendula secunda*.

OENANTHE II. ET III.

F O R M A.

Matth.

Folij est pyrethri, aut pastinacæ sylvestris non absimilibus, caule fœniculaceo, qui umbellas in summitate gerat, è ramis dependentes. Radicibus per omnia filipendulæ similibus.

L O C V S.

Idem.

Prouenit in collibus, & locis à Sole illustratis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.


Idem.

Creditur ijdem esse viribus, quibus filipendulam præstare diximus.

O E N A N T H E T E R -
T I V M.

Matth.

Folia promit Gingidij, caulem fœniculaceum striatumq; è cuius ramis umbellæ oriuntur candidæ, Radicibus numerosis filipendulæ similibus, sed vegetioribus globulis.



L O C V S.

Idem.

Nascitur in amœnis tractibus & in montibus.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem.

Nihil differt suis viribus à præscriptis.

OENANTHE aquatica, repens. Italis, *Filipendula serpeggiante*.

OENANTHE IIII.

F O R M A.

Herba est humi serpens, *Matth.*
folijs tertij ferè similibus, ex-
lioribus tamen, & magis laci-
niatis, caule sinuoso, striato-
que. Capitulis in summitate
hirsutis, in quibus semen. Ra-
dices mittit plures, rapuncu-
li ferè effigie, non solum in
ima caulis parte, sed etiam in
ramis, qui humi serpentes, ra-
dices quoq; faciunt.

L O C V S.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*
* In paludibus sponte nasci-
tur sine radicum tuberculis,
has enim in hortos translata
aut in aridam deplantata sibi
demum adsciscit.*

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Et si nihil certi de eius viri- *Idem.*
bus, nobis constet: putamus
tamea à cæteris *Filipendulis*
non multum differre.

A P P E N D I X.

Oenanthe, has plantas, ideo appellare libuit, quòd ita *Filipendulam*, cuius
sunt species, vulgares vocent. Arqui re vera nec *œnanthe* sunt, nec eius spe-
cies.

CONYZA, Græcis, *Koviça*. Italis, *Coniça*, seu *pulicaria*. Germanis, *Stech Mint*. Hispanis, *Artadegua*. Gallis, *Herbe aux puces*.

CONYZA.

G E N E R A.

DIOSC. Triæ eius habentur genera, maius, minus, & medium. * inveniuntur etiam plura, & nos quartum adiecimus.*

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folijs est oliuæ similibus, latioribus tamen, & frutice altiori, graui odore, hirsutis, pinguibus, caule binum cubitorum, flore fragili, lutei coloris, qui in pappum abit. Radicibus superuacuis.

L O C U S.

Matth. Nascitur in campestribus, in collibus, & amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Conyza maior, & minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum facultatis. Gustui amaræ, & acris. Excalfaciuntque admodum luculenter, adeo ut terrij sint ordinis excalfacientium, & desiccantium.




V I R E S.

DIOSC. Frutex totus suffitu, substratûq; serpentes fugat, culices abigit & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum vino ad menses, parrusq; ejiciendos bibuntur. Item contrariæ stillicidia. Arquarum morbum, & tormina, comitiales potæ ex aceto adiuvant. Decoctum in deseffionibus vuluæ affectibus medetur, impositus succus aborrum facit. Herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur.

CONYZA minor, Græcis, *Koniza mizēda*. Italis, *Coniſſa minore*.

CONYZA MINOR.



F O R M A.

Folijs provenit alterius angustioribus, frutice breviori, pedali longitudine, & odore quidem præstantiori, cætera verò maiori similia habet.

L O C U S.

Provenit secus itinera, in campestribus, & in amœnis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Adsimilis cum maiori est *Galen.* temperaturæ: quinetiam fa-
dirosc. cultatis.

CONYZA tertia, Græcis, Κοιζα τertia. Italis, ConiZaterZa. Germanis, See-
Münz.

CONYZA TERTIA.

F O R M A.

Diosc. Caule est crassiore, & molliore, folijs mediæ inter maiorem, & minorem, amplitudinis, minime pinguis, multo tamen granioris odoris, & iucundioris.

L O C U S.

Diosc. Prouenit humectis locis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Diosc. Potest omnia quæ priores, sed imbecillius operatur. Peculiariter autem auxiliatur siccæ farina dysentericis, si quotidie drachmæ duæ propinentur ex vino rubro auctero.



*CONYZA QVARTA.



F O R M A.

Rubicundum profert caulem è radice tenui alba, qui folijs angustis, aliquantum pilosis, in acumen desinentibus, & parum incisis, vestitur. In summo aliquot ramuli sustinent flores luteos, præcedenti similes quibus proculdubio etiam papposum semen respondet.*

L O C V S.

Nascitur in pratis.

HEMEROCALLIS, Græcis, *Ημεροκαλλίς*. Italis, *Hemerocalle*, & *Giglio salatico*. Germanis, *Heydnisch Eilien*. Hispanis, *Lirio amarillo*. Gallis, *Luxiaune*.

HEMEROCALLIS.

FORMA.


DIOSC. Folium, & caulem habet Liliij, herbacei coloris, vt porrum. Flores in caule per singulos exortus terni, aut quaterni erumpunt liliij diuifura, quoties dehifcere cœperunt, colore per quàm pallido. Radix magna est, atq; bulbosa.

LOCVS.

Matth. Prouenit in fegetibus, & campeftribus inter vepres.

QUALITATES.

Gale. 6. Hemerocallis radicem habet liliij radici fimilem, non figura tantum, fed & viribus. prodest non fecus atque illa igni ambuftis, quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulforium quiddam.




VIRES.

DIOSC. Pota radix, aut cum melle, & lana in pefso fupposita, aquam educit, & fanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigat. Radix, & folia igni ambuftis vtiliter illinuntur.

HEMEROCALLIS altera, Italis, *Giglio saluatico secondo*. Germanis, *Eurdisch Goldwurk*.

HEMEROCALLIS ALTERA.



F O R M A.

Alteram facie æmulatur, *Matth.* sed radicem habet, quæ pluribus, & paruis coagmentatur bulbis. quin etiam flores profert Martagi modo repandos, prioris hemerocallis colore, vt eius imago quam hic adiecimus palam demonstrat.

L O C U S.

Prouenit in montibus. *Idem.*

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Eadem præstare possunt, tum radix, cum folia, quæ prior.

Q 9. 5.

LILIVM

LILIVM conuallium, Italis, *Lilio conuallio*. Germanis, *Meyenblümlein*. Gallis, *Muguet*.

LILIVM CONVALLIVM.

FORMA.

Matth. Folia profert, quadantenus plantaginis effigie, sed tenuiora, lævia, nervisque carentia, cauliculos iunceos, triangulares, tennes, ac molles, obsequiososque, in quibus flores exeunt plures balustij, aut arbuti florum effigie: odore eximio, & perquam iucundo, & quibus baccæ enascuntur vitales, quæ per maturitatem rufescunt. Radices demittit laxas, longas, fibris, capillamentisq; refferas, nullis adiacentibus bulbis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & in eorum conuallibus.

QUALITATES.


Idem. Flores excalfaciunt, attenuant, digerunt, prouocant.

Idem. Aiunt iuuare cor, atque cerebrum, ac omnes principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, vertiginosis, veternosisque, animi deliquio laborantibus, & cordis pulsatione affectis inibent. Item ægræ parturientibus stillatitiam florum aquam vtiliter potandam censent, & oculorum inflammationes eandem sanare putant.

VIRES.

CENSURA.

Qui Liliū conuallium Ephemērum aliterum faciunt, ijs mens sana non est.



LEVCOIVM, Græcis, *Adxibior*. Mauritanis, *Keiri*, *Cheiri*, *sive Alcheiri*. Italis, *Viola bianca*, & *pauonazza*. Germ. *Rot Braun vnd weiß Veil*. Hisp. *Violetas amarillas*, & *violetas blancas*. Gallis, *Viola rouges, blanches, seu Violet*.

LEVCOIVM ALBUM, ET PURPUREVM.

GENERA.

Tria Leucoij visuntur gene. *Matth.*
ra, nempe Album, Purpureum, & Aureum.

FORMA.

Profilunt omnia genera cu. *Matth.*
bitali altitudine, ramosa, fruticosaq; caulibus brassicæ exilioribus, sed foliorū facie variant. Namq; tamen si omnibus folia sunt oblōga, id tamen q̄ luteis exit floribus, folijs est longioribus, numerosioribus, viridioribus, ac magis in acutum desinentibus. Cætera verò nempe album, & purpureum folia gerunt breviora, latiora, & minime mucronata, quinetiam superne, inferneq; canescentia.

LOCVS.

Seritur in hortis, & scitilibus *Idem.*
ad exornandas ædium fenestras.

QUALITATES.


Leucoij frutex vniuersus ex. *Galen. 7.*
tergētem facultatem possidet, *sim. me.*
ac tenuium est partium, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciores, magis etiam quā virides: Radices similis quoq; sunt facultatis, nisi quatenus

crassioris sunt essentiz, & magis terrenæ.

VIREs.

Sicci flores oculorum cicatrices crassas extenuant, tum menses quoq; decoctum eorum mouet, & secundas, sc̄tumq; emortuū elicit, & si bibatur viuum quoq; perimit, & abigens est medicamentum. Est enim id vti si q̄ aliud amarum. Sic decoctū eius si non merū fuerit, sed aqua mistum vteri phlegmonas persusum sanat. potissimū quē diuturno tempore ad scirrhi modū induruerit, sic cum cerato vlcera ægrē ad cicatricē peruenientia curat. Sunt verò etiā q̄ cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semē quoq; iisdē facultatib⁹ præstat. Radices ex aceto illiz lienes induratos sanant. Quinetiam phlegmonas in articulis induratas.

LEV.



LECOIVM aureum, Græcis, *Δελνίον ἄργεον*. Italis, *Viola gialla*. Germanis, *Gelb Negel Weil*.

LECOIVM AUREVM.

F O R M A.

Matth. Folijs est longioribus, numerosiorib⁹, viridioribus, & magis in acutum desinentibus. Flores edit luteos, odoratosque.

L O C V S.

Idem. Seritur passim in hortis, & fœtilibus.


Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Diosc. Præstat ea omnia, quæ cætera genera, sed longè valentius. Ideoque præcipui est in medicina vsus.



PHYLLVM, Græcis, φύλλον. Germanis, Welsch Dingelkraut.

PHYLLVM.



GENERA.

Duum est generum, θηλυγον, DIOSC.
καὶ ἀρρενονγον.

FORMA.

Telygonon prouenit musci DIOSC.
modo, folio oleæ, sed colore
magis herbaceo, caule tenui,
breui radice exili, florem album
profert, semen papaueris ma-
iusculum. Arrhenogonum verò
cætera huic simile habet, solo
fructu distat, habet enim race-
mosum quiddam deflorentibus.
oleis non dissimile.

LOCVS.

In saxosis nascitur.

Idem.

VIRE S.

Arrhenogonon pora masculini sexus partus, vt telygonum feminei, face-
reproditur.

TESTI-

TESTICVLVS, Græcis, *ὄρχις*, & *ἀπέρχορον*. Mauritanis, *Chafi*, Alchelb. Italis *Testicolo di cane*. Officinis, *Testiculi vulpis*. Germanis, *Knabentrant*. Hispan. *Coyon de perro*. Gallis, *Coullon de Chien*.

G E N E R A.

T E S T I C V L V S.

Duo tantum genera Dioscoridi recensentur. Sed re vera plura passim spectantur, ut ex iconibus hic seriatim appictis palam fiet.

F O R M A.

DIOSC. Is qui Cynosorchis dicitur folijs exit circa caulem, & ima eius parte in terra striatis Oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, læuibus, caule dodrantali, florib⁹ purpureis, radice oblonga oliuæ modo, angusta, duplici ordine, superiore quæ plenior est, inferiore quæ mollior, & rugosior. Alter verò Serapias appellatus, folijs est porri, latoribus, oblongis, pinguibus ex alarum sinu inflexis, caule palmeo, floribus planè purpureis. Radice testiculis simile.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in petrosis, & sabuletis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8.
simp. me. Cynosorchis vis inest humida, & calida, ac gustatibus dulcior apparet. Cæterum maior

radix multam videtur habere humiditatem excrementitiam, & flauosam. Altera verò, minor videlicet, contra admodum elaborata est, ita ut eius temperamentum ad calidius, & siccius vergat. Orchis verò, quem & Serapida nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quàm ut primi ordinis haberi mereatur.

V I R E S.

DIOSC. Eduntur Cynosorchis radices coctæ, ut bulbi, ex quibus si maiores edunt viri, mares generare dicuntur, si minorem fœminæ, alterâ sexum. Illius verò radix qui Serapias appellatur, illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes delet. Aride radices nomas inhibent, sanantq; putredines, & oris vlcera cacoethe. Alium sistunt è vino potæ. De hac eadem, quæ de Cynosorchis produntur.



TESTICULI SPECIES II.
ET III.



FORMA.

Secundi, tertijq; Testicu- *Matth.*
li forma ex duabus his ima-
ginibus circumscribi potest.

LOCVS.

Nascitur in pratis mon- *Idem.*
tium, collibus, & herbosis
pascuis.

VIREs.

Vires cum ceteris vnifor-
mes habet.

TESTI-

FORMA.

Matth. Ex hac imagine facile quispiam quarti testiculi formam concipiet.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & præsertim in pratis.

VIRE.

Idem. Vires illi eadem sunt quæ & cæteris.



TESTICULI SPECIES V.

FORMA.

Folia gerit plantaginî proxima, gemina, superne striata, caulê dodrantalem, glabrum, leuemq; , flores spicatos, candidos, odore longè suauissimo, radices (vt cæteri) duas oleæ magnitudine, longiusculas, nonnihil hirsutas.

Locvs.

Prouenit in syluis & vallibus, & locis syluestribus, herboso solo.

VIRES.

Ea omnia potest, quæ catagenera.

Ri

PALMA



PALMA Christi maior. Italis, *Palma di Christo maggiore.* Germ. *Händlinnurg.*

PALMA CHRISTI MAIOR.

GENERA.

Duum est generum, Alterum maius, Alterum minus.

FORMA MAIORIS.

Matth.

Maius folia habet allij, latiora, nigris infecta maculis, caulem rotundum, lævem, florem spicatum, varium, in purpura albicantem, odore non ingrato. Radices duas, quæ sanè caninos testiculos referrent, nisi processibus quibusdam, quasi digitis humanam manum exprimere viderentur.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in montibus, potissimum in pratis, & herbosis locis.

**QUALITATES, ET
VIRE.**

Idem.

Ea omnia præstat, quæ canini Testiculi. Peculiariter autem radices potæ crassa corporis excrementa pellunt, faciemq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento, quin & in neruorum affectibus. Semen drachmæ pondere in vino potum comitialibus conuenit. Febrem quoque quartanam curant radices duarum drachmarum pondere haustæ.

*Nicolaus
Florentinus.*



PALMA Christi minor. Italis, *Palma di Christo minore*. Germanis, *Brendelin*.

PALMA CHRISTI MINOR.

F O R M A.

Folijs constar croci, caule *Matth.* dodrantali, iunceo, læuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus amaranthi æmulus, laturationi tamen purpurea splendens, qui recens odorem quàm suauissimum spirat.

L O C U S.

Nascitur in pratis altorum *Idem.* montium.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Florum exiccatorum pul. *Idem.* nis datur vtiliter potandum dysentericis, ex aqua in qua ferrum extinctū fuerit *Idem* totius plantæ stillatitiam aquam præstare aiunt.



Rr 2

HORMI-

HORMINVM, *O'quivor.* Italis, *Horminio.* Germ. *Weißer Tag und Nacht.*

HORMINVM.

GENERA.

Diosc. Horminum duplex habetur, domesticum & sylvestre.

FORMA DOMESTICI.

Diosc. Planta est folijs marrubio similis, sed maioribus, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant. Flores edit in caule secundum folia per intervalla prodeuntes purpureo colore, in quibus diversum semen concluditur.


Matth.

LOCVS.

Idem. Seritur in hortis.

QUALITATES, ET
VIRE S.

Diosc. Semen ad venerem stimulantam bibi cum vino volunt. Purgat cum melle argemas, albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit, eo etiam aculei ex corpore extrahuntur. Idem effectus est illitæ herbæ.



HORMI-

HORMINVM sylvestre, Græcis, *O'quvor āxiou*. Italis, *Horminio saluatico*. Germ.
Wilder Scharlach/Wilde Salbey.

HORMINVM SYLVESTRE.

FORMA.


Folio est Saluix ferè simili, *Matth.*
caule sesquipèdali, aspero, qua-
drangulo, subhirsuto, striatoq;
flore saluix, purpurascènte, sili-
quis numerosis in humum re-
flexis, in quibus semen rotun-
dum, fusco colore.

L O C V S.

Prouenit in campestribus, in *Idem.*
pratis, secus itinera, & herbosis
locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Eadem omnia præstat, quæ *Idem.*
de domestico scribuntur.



SCLAREA, Italis, *Sclarea*, *Scarleggia*, seu herba di san Giovanni, quibusdam *Matrisalis*. Germanis, *Scharlach*. Gallis, *Orual*, seu *Toutetonne*.

SCLAREA.**FORMA.***Matth.*

Folij exit hormino quadruplo maioribus, ac latioribus, subasperis, crispis, humi accubantibus, caule sesquipedali, & quandoq; maiori, hirsuto, firmo, quadrangulo, à cuius medio plures oriuntur rami, in quibus spicati exeunt flores subpurpurei, odore eximio, & quadam cum gravitate fucundo, ex his calyculi oriuntur, in quibus habetur semen nigrum pellucidum, ac rotundū. Radice nititur multifida subnigricante.

LOCVS.*Idem.*

Seritur in hortis, & viridarijs.

FACULTATES.*Idem.*

Excalfacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit.

VIRES.*Idem.*

Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutit. Item forunculos antequam acuminentur. Italæ mulieres seminis granum oculis caligantibus intromittunt, nec inde auferunt nisi caligine soluta.

APPENDIX.*Idem.*

Sclarea & si *Dioscoridis* *Horminum* non est, ego tamen *Horminum* maius, aut odoratum appellauerim.



SECURIDACA, Græcis, *Ἡδυσάριον*. Vnguentarijs, *Pelecinum*. Italis, *Securidaca*. Germanis, *Groß Peltfchen*.

SECURIDACA MAIOR.

GENERA.

Duum est generum, Alter *Matth.*
rum maius, Alterum minus.

FORMA MAIORIS.

Folij exit ciceris, vnde *Matth.*
ex vno processu erumpenti-
bus, cauliculos edit tenues,
lentosq; floribus diluto co-
lore, purpurascens ut in
piso, sed minoribus. Siliquas
habet quadam tenus falcatas,
pressas, ad unco cacumine, in
quibus rufum concluditur se-
men ancipitis securis effigie.
Vnde illi nomen. amaro sa-
po re. Radice vnica nititur, pau-
cis adnatis fibris.

LOCVS.

Nascitur in fegetibus, & hordeis.

Diosc.

QUALITATES.


Hedysari semen colore rufum est, vtrinque anceps, vti securis. Amarum, & *Gal. 6.*
subacribum apparet. *simp. me.*

VIRE.

Semen haustum stomacho vtile, cum melle ante coitum subditum concipi- *Diosc.*
endi spem adimit. Additur in Antidotis. Viscerum obstructions expurgat. *Gal. ibid.*
Idem prestant totius fruticis ramuli.

Rr 4

SEC-



SECVRIDACAMINOR, Græcis, ἡδύραγον μικρόν. Italis, *Securidacaminore*. Germanis, *Klein Pelttschen*.

SECVRIDACAMINOR.

FORMA.

Matth.

Maiori ferè adsimilis est, folia tamen minora spectantur, numerosiora, & in cacumine retusa. Quin etiam & caules, & rami & cæteræ quotquot sunt partes minores habentur. Flores edit alteri haud absimiles, sed pusillos, è quibus cornicula proueniunt rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt. Semen in his contentum alteri simile est, sed minus, ac tenuius.


LOCVS.

Idem.

Nascitur & ipsa inter segetes in agris.

QUALITATES, ET
VIRES.

Ea omnia, quæ maiori ascribuntur, ea quoq; in minori reperiuntur.




ONOSMA.

ONOSMA, Græcis, ὄνοσμα. Italis, Onosma.

ONOSMA.

FORMA.



Oblonga folia habet, an- Diosc.
chusæ modo, lōgitudine qua-
tuor digitorum, & vnus lati-
tudine, mollia, in terra iacen-
tia, sine caule, sine semine, si-
ne flore. Radice nititur ob-
longa, tenui, infirma, rube-
scente.

Locvs.

Gignitur in asperis.

Idem.

QUALITATES.

Onosma ex acri & amara Gal. li. 6.
constat substantia. simp. me.

VIREs.

Folia ex vino pota partus Diosc.
extrahunt. Prægnās si eam su-
pergradiatur abortum facere
dicitur.

Rr 5

NYPHÆA,

Nymphaea, Græcis, *Nymphaea*. Mauritanis, *Nilofar*, seu *Nilufar*. Barb. *Nerufar*.
 Ital. *Nimphaea*. Germanis, *Weiß Seebiumen*, & *Daarwurh*. Hispanis, *Escude-*
tes del rio, & *Higos del rio*. Gallis, *Blanc de eau*, siue *Linet de eau*, siue *Lu de stagn*.

Nymphaea alba.

GENERA.


Matth. Tria eius habetur genera, duo magna, alterum quidē album, alterum Luteum, & tertium, quod parvū appellatur.

FORMA ALBA.

Diosc. Folij est fabæ Egyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex eadem radice prodeuntibus. Flore albo, Lilio simili, & in medio crocos habente, cū defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat, nigro semine, denso, & lato, lēti gustus. Caulis est levis, niger, minimè crassus, Egyptiæ fabæ cognatus. Radix nigra, crassa, scabra, clauæ similis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis.



QUALITATES.

Galen. 2. Nymphaeæ tum radix, tum semen desiccâdi vim habet, citra morsum. Porro
simp. me. nonnullam etiam abstergendi vim obtinet.

VIRES.

Diosc. Sicca cum vino pota cæliacis, dysentericisque auxiliatur, & Lienem absumit. Radix stomachi, & vesiçæ doloribus illinitur, vitiliges ex aqua emendat, imposita cum pice alopecijis mædetur. Eadem cōtra veneris insomnia bibitur.
Matth. Paratur è floribus oleum ipsis in eo insolat, quod vruntur medici, ubi refrigerare ac humectare sit opus. Soporiferi enim quidpiam illi inest, folia recentia renibus admodum seminis profluuia sistunt.

NYMPHÆA altera, Græcis, Νυμφαία ἑτέρα. Italis, *Nimpha gialla*: Germanis, Gelb Seebäumen.

NYMPHÆA LVTEA.

FORMA.

Folijis est antedictæ, radice DIOSC. alba, scabra, flore luteo, niten-
te rosæ simili.

LOCVS.

Prouenit & hæc in stagnis, Matth.
lacubus, & paludibus.

QUALITATES.

Desiccandi vim habet tum Gal. li. 8.
semē, tum radix citra omnem simp. me.
morsum, & nonnihil abster-
gunt.


VIRES.

Huius semen & radix, con- DIOSC.
tra sceminarum profluuia ef-
ficaciter ex vino nigro bibun-
tur, cætera cum altera paria
sunt. Attamen huius radix ad Gal.
mulierum profluuia imbecil-
lior.

CENSURA.

Qui putâr Arabum, & Græcorum Nymphæas diuerfas esse plantas, procul-
dubio hallucinantur.

NYMPHÆA



NYPHÆA parva, Græcis, *Νυμφαία μικρά*. Italis, *Nimphae piccola*. Germanis,
-*Klein Seebium*.

NYPHÆA PARVA.

FORMA.


Matth. Folijs est aliarum facie similibus, sed brassicæ marinæ paulò maioribus. Flore candido, capitulis exiguis, ut in capari, femine intus papaveris magnitudine.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Lacubus, & paludibus, circa eorum litora, in aqua tamen, nec alibi eam videre licuit, præterquam in Boëmia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Imbecillioribus longè viribus est, quàm cætera de quibus diximus.



*NYPHÆA


* N Y M P H Œ A parua alia.

F O R M A.

Folijs est circinitaræ rotunditatis, subtilissimis, prodeuntibus è radice longa duos digitos, inferius recurva, colore partim viridi, partim sublutea, superius præsertim, nodis quibusdam protuberantibus, inæqualiter còpacta, quorum singulis in medio nigricantia duo puncta insunt, à fibris quæ deciderunt, relictæ, enascuntur ab hac fibræ complures, albæ, crassiusculæ, spōgiosæ ad octo digitorum longitudinem, sapore nullo insignes. Floré non vidi.

L O C U S.

Nascitur in Heluetia sub Suamedinga pago.*



ANDRO-

ANDROSACES, Græcis, ἀνδρόσακος. Italis, *Androsace*.

ANDROSACES.

FORMA.

Diosc. Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitibus habens, in quibus semen continetur.

LOCVS.


Idem. Gignitur in Syriae maritimis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Androsaces humida, & a-
simp. me. cris herba est.

VIREs.

Diosc. Ea drachmis duabus ex vino pura hydropicis copiosam urinam ciēt: eūdem effectum præstat, & semen potū, & herba decoctum: podagris vtiliter illinitur.



ANDROSA-

ANDROSACES ALTERA.



Sunt qui putent hanc plantam Androsacem legitimam esse, quod è Syriæ maritimis allatam sciant. Verùm cum folia in summitate gerat, non possum ego facile eorum subscribere placitis, eam tamen hic excudi curauimus, ut aliorum quoque sit iudicium. Matt.

ASPLENYM,

ASPLENVM; quod Scolopendrium aliqui vocant, Græcis, *ἄσπλερον*. Maurita. *Scolofendrion. siue Sculufendrium*. Officinis, *Cetrach*. Italis, *Aspleno*, & *Cetrach*, seu herba indorata. Hispanis, *Doradilha*. Gallis, *Cetrach*.

ASPLENVM.

FORMA.

Diosc. Folijs est multis scolopendræ animalī similibus, ab radice vna prodeuntibus, nec caulem, nec florē, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subterflauescentia, hirsutaq; , supernè viridia.

LOCVS.


Diosc. Nasctur in parietibus, saxiq; siliceis (oppidorum mœnijijs) & opacis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Asplenium tenuium quidē partiu, non tamen calida herba est, hac vtiq; ratione, & lapides frangit, & lienes liquat.

VIREs.

Diosc. Folia in aceto sernefacta, & per dies quadraginta pora, lienem absumunt, quibus etiam contritis, lienem ex vino illini oportet, stranguriæ & regio morbo prodest, singultum sedat. Calculos in vesica comminuit, conceptum adimere creditur per se aut cum Muli liene apensa. Tradunt nocte silente Luna huius rei gratia effodienda. Ponitur inde coctis, quæ ad melancholicos parantur morbos.



HEMIONITIS, Græcis, *Hemionitis*. Italis, *Hemionite*. Germ. *Welsch Dirschnung*.

HEMIONITIS.



FORMA.

Folium emittit dracunculi, *Diosc.*
lunatum, radicibus cohæret
multis, tenuibus, nunquam
florem, neq; semen, neq; cau-
lem gignit, austero tota planta
sapore.

LOCVS.

Nascitur in petrosis. Itaque *Diosc.*
Romæ nasci eum scribunt pro-
pe magnum amphitheatrum,
quibusdam in ruderibus, aut
ædificiorum ruinis.

QUALITATES.

Adstrictionem simul & a-*Gal. 6.*
maritudinem possidet. *simp. me.*

VIRES.

Ex aceto pota lienem ablu-
mit.

Ss

Italis,

Italica, Sfera cavallo, ita appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat, Chymistis Lunaria minor. Quibusdam securidaca etiam nuncupatur.

S F E R R A C A V A L L O.

F O R M A.

Matth.

Folij exit minori Securi-daca proximis, pusillis, cordisq; faciem referentibus, incurva secundum longitudinem excurrente linea, pluribus vtrinq; è longo pediculo emergentibus siliquis oblongis, pressis, numerosis, altera parte sinuatis incisuris diuisis, foraminum rotundorum speciem referentibus, prominente vtrinq; orificio. Caules habet angulosos, striatosq; ramulis numerosis refertos, semine è siliquis prodit lunatum, bicorni. Vnde apud chymistas Lunariæ nomen adinuenit.

L O C U S.


Idem.

Oritur in altis montibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Nullum quod sciam habet in medicina usum, quamvis non desint herbarij, qui eam in portionibus vulnerum addant. Chymistæ tantum ex argento vino argentum purum fieri fabulantur.



LVNARIA minor, siue Lunaria Botrytis. Italis, *Lunaria del grappolo*. Germanis, *Monrauten/Monkraut*.

LVNARIA MINOR.

F O R M A.

Gaule constat simplici, do- Matth.
drantali, rotundo, lento,
gracili, è cuius medio in la-
tus ramusculus exit costæ ef-
figie, cui folia insunt vtrinque
septem, aut plura, lunata, cras-
sa, firmaque brassicæ marinæ
modo. flores profert in sum-
mitate caulis oxalidis mino-
ris modo, semine rufo, rotun-
do, in vix modum racema-
tim coherente.

L O C V S.


Nascitur in altis montibus Idem.
herboso loco.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Vulneraria est planta, effi- Idem.
caxq; vulneribus recentibus
glutinandis. sanat pota intrin-
secas corporis fracturas, & ex-
trinsecas quoq; illita, quare

miris celebratur laudibus ad puerorum enterocellias. Darur vtiliter, commo-
deq; dysentericis, planta tota in puluerem contrita ex vino austero pota. Albas
vteri fluxiones suppressit, quemadmodum, & rubentes.


In Anglia quædam species
huius nostræ Lunarię inueni-
tur quæ pluribus folijs dona-
tur, & nonnunquam pluri-
bus etiã racemulis, quam
deliniari iussi, vt alijs quoque
herbarum inuestigatoribus
hæc varietas innotesceret.*



CHAMÆMELON, Græcis, Ἀγέμυς. Italis, Camamilla. Germanis, Camillen. Hispanis, Manzanilla. Gallis, Camenima, & Camomille.

ANTHEMIS SIVE CHAMÆMILLA.

FORMA.



Rami sunt illi dodrantes, Diosc. & sæpe maiores, fruticosi, alis multis, concaui, tenuibus foliolis, parvis, numerosis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, forinsecus orbicularo ambitu candidis, & odoratis.

LOCVS.

Prouenit iuxta semitas in Diosc. aruis, inter segetes & in pratis.

QUALITATES.

Chamæmilon tenuitate Galen. lib. quidem rosę persimile est; ca- 4. & 6. lore verò ad olei facultates simp. me. magis accedens; animali tum familiares, tum temperatas, quapropter lassitudinibus, si quid aliud confert, doloresq; sedat, mitigatque. Præterea rensa remittit, & laxat, quæq;

mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata rarefacit, excalfacit, & desecat ordine primo.

VIRES.

Portu, & infusione menstrua pellit, partus, vrinam, calculosq; aduersus inflationes, & ilei tormina bibitur. Bilem suffusam expurgat, iocinoris vitia sanat. Eius decocto vesicæ fouentur, & renes in calculi dolore, vrinam ciet, Agilopis illita medetur, comamanducata vlcera eruptiones in ore sanat. In summa omnibus ferè humani corporis morbis medetur.

*CHAMÆMELVM Romanum flore multiplici.

F O R M A.

Multo suavius, & Aromaticum quiddam olet, & tenerioribus reperit cauliculis, foliolis quoq; brevioribus ornatur, & imprimis floribus cōmendatur adeo dense stipatis foliorum luxuria, vt nonnunquam centrum luteum prorsus operiant.

L O C V S.

Instructiorib⁹ tantum hortis familiaris est in Germania. Sed circa Aurelias sponte nasci quidam referunt.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.


Præstantior est facultatibus suis quam vulgaris, Et præcipue ex huius floribus, succo & vino albo syrupus conficitur ictero splenis & hydropivtillissimus.*



ADONIS

ADONIS, *Eranthemum quorundam*. Germ. *Seldtröflin*/ *Margrethen Blümlin*.

ADONIS.



Sunt qui hanc plantam, *Matth.* quam quidam Virgilij Adonidem vocant, eam Chamæmeli speciem faciant, quæ flore purpureo provenire asserit Dioscorides. Sed proculdubio falluntur, quod ipsiusmodi Anthemidis flores in medio aureo sint colore, & perambitum, ut in Amello.

* Huius vero flosculi apices quidem luteolos habent sed raros & sæpius nigros circa capitulum fuscum & obscure virens, & folia in rubore splendentia versus medium atra, calix quinque folijs constant, quæ & ipsa rubent intrinsecus. caules tenuibus folijs vestiuntur, sylvestris nigellæ similioribus quam Chamæmeli vel Anthemidis folijs. Echinatum capitulum efficiunt semina coherentia, quæ sub finem æstatis delapsa crescunt, perficiunt autem caulem & florem sequenti æsta-

te. Herba subamara est & herbaceum quid redolet. radice nititur gracili, fibrata & lignosa.

L O C U S.

Nascitur in agris tantum, inter segetes, & à quibusdam in hortis colitur.

F A C U L T A T E S.

Eius semina ad frangendum calculum efficacissima sunt.

*ADONIS FLORE PALLIDO.

F O R M A.

Præcedenti in cunctis similis est, præterquam quod flores pallidos habeat, in medio tamen similiter nigricantes, aut in purpuram vergentes. gustu etiam respondet priori.

L O C U S.


Nascitur ijsdem quibus prior, locis.*



PARTHE

PARTHENIVM, Græcis, *παρθένιον*. Officinis, *Matricaria*. Italis, *Matricaria*, seu *Amarella*. Germanis, *Mutterkraut* / siue *Mettram*. Gallis, *Matricaire*.

P A R T H E N I V M.



F O R M A.

Folijs exit coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro.

L O C V S.

Seritur in hortis, ac etiam *Matth.* sponte nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Exalfacit, siccatur, aperit, *Idem.* abstergit, prouocat, resoluit, flatus pellit.

V I R E S.

Siccaturum cum aceto multo, aut sale potum, non secus atq; epithymum bilem, & pituita detrahit, suspiciosus prodest, & melancholicis: herba sine floribus pota calculosos, & anhelatores iuuat. Valet decoctum ad insedendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni & in collectionibus cum flore. Eporus succus drachmæ pondere cum saccharo ventris tineas perimit. Illitus, imperigines, alphas, & lentigines emaculat. Peculiariter autem auxiliatur omnibus vteri affectibus, quos flatus, aut pituitosus humor excitauerit: menses ciet, & secundas. calefit recens super tegula: & irrorata vino ventri illinitur contra vteri dolores. *Matth.*

TANACETVM, siue Arthanasia, Italis, Tanaceto, siue Daneda. Germanis, Mat-
faren.

F O R M A.

TANACETVM.

Matth. Folia gerit maioris millefo-
lij æmulis, aliquanto tamen
maioribus, amaro sapore, &
odore graui, caulibus bicubi-
talibus, floribus melinis, au-
reis globulis similibus, vmbel-
latim quadantenus micanti-
bus. Radice nititur vnica com-
pluribus adnatis fibris.

L O C V S.

Idem. Prouenit in hortis, ætiam
alibi sponte per se nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, exiccat, abster-
git, aperit, flatum pellit.

V I R E S.

Idem. Alui, ventriculi, & vteri fla-
tus discutit. Lumbricos pel-
lit, vrinam ciēt, & menses, cal-
culos eijcit, obstructions vi-
scerum aperit.



BYPHTHAL

BUPHTHALMUM, Græcis, Βύβθαλμον. Latinis, *Oculus bouis*. Italis, *Bupbthalamo*, *sive Oculis di buæ*. Arabibus, *Bihar*. Germanis, *Äinds Aug*. Gallis, *Oiel de Bœuf*.

BUPHTHALMUM.



F O R M A.

Caules emittit tennes, mol *Diose.* lesque, folia fœniculi, luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit.

L O C V S.

Circa oppida nascitur, & in *Idem.* campestribus.

Q U A L I T A T E S.

Flores anthemidis floribus *Gal. li. 6.* simillimi sunt, sed multò illis, *simp. me.* tum maiores, tum acriores, proinde & vehementius discutiant.

V I R E S.

Flores cum cerato tritici, tu- *Diose.* mores, duritiasque discutiant. Aiunt epotam herbam post exitum à balneis, Regio morbo correptis colorem tractu temporis reddere.

*BUPHTHAL-

*BYPHTHALMUM flore purpurascente.

FORMA.

Hec eadem cum priore est, in eo autem differt, quod flores huius foliosa à parte externa vel in totum purpurascunt, vel saltem per medium purpurascens quiddam habent. Caulis quoque in priore plane viridis, in hoc purpureus est.

Locvs.


Nascebatur in horto cuiusdam Iurisperiti Genevæ, translata fortè illuc ex vicinis montibus Allobrogum.*



BELLIS

BELLIS maior. Italis. Primo flore maggiore. seu Fioe di p^rima vera; nonnullis Primula veris maior. Germanis. Gengßel. m. Kuckblum. S. Zeyarablum.

BELLIS MAIOR.



GENERA.

Complura Bellidis haben- *Matth.*
turgenera.

FORMA MAIORIS.

Foliagerit prope radicem, *Matth.*
quercus modo ferrata humi
accubantia, crassiuscula, ro-
bustaq; sed quæ in caule sunt
angustiora, ac longiuscula spe-
ctantur senecionis quodante
nus emula, complures ab vna
radice emittit caules, cubita-
les, teretes, robustos, è quo-
rum summis partibus flores
exeunt anthemidis, aut parthe-
nij maiores, qui æstate ferè to-
ta perdurant, colore intus au-
reo, & per ambitum cædido.
Radix illi est multifida, haud
valde descendens.

LOCVS.

Nascitur in pascuis, pratis, *Idem.*
secus itinera, & in agrorum
marginibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Præstant flores ad strumas & caluariæ fracturas, qui etiam ad thoracis vlcera, *Idem.*
quæ in eius cavitatem penetrarunt, in quem vsum Bellum in portionib. addunt.
Sunt qui omnia genera commendent ad Ischiadicis, & resolutos, commansa
folia sanant cum oris, tum linguæ exulceratas pustulas. Eadem tusa genitalium
inflammationes exstingunt ac etiam resoluunt. Herba ipsa recens ex oleo & a-
ceto deuorata, aluum adstrictum lenit. Id quod etiam præstat ex iure pinguium
carnium decocta, & vnà cum iure sumpta.

**BELLIS* media, siue syluatica, seu montana.


BELLIS MEDIA.

GENERA.

Duo habentur genera, mas & foemina forte, differūt enim colore, magnitudine & latitudine foliorum.

FORMA.

A. Caules plures habere solet, à duobus ad octo, singulos cum singulis floribus, nisi præter naturam duo siue distincti siue in vnum confusi flores vni cauli insideant, quod nõ raro ei accidit, & tum caules nõ rotundi sed latiores sunt. Folia ei sunt oblõgiora, angustiora, caules quoque lõgiore. In B. vero latiora sunt folia & caulis magis rubet, singularis. Fortè autem cùm herba adুক্তior est, in hac quoque specie plures fiūt caules, Sapor vtriq; acris, tenuium partium, ferè vt virgæ aureæ & radix ferè similiter transuersa odore non ingrato.



LOCVS.

Nascitur in syluis & in Salena monte.

QUALITATES.

Calida & sicca videtur in tertio gradu.*

BELLIS

BELLIS minor, Italis, *Primo flore minore, fior di primavera.* Germanis, *Masflieben,*
Gallis, *Marguerites, seu Pasquette.*

BELLIS MINOR.

FORMA.

Folij provenit alterius mi *Match;*
noribus, minimè sinuatis, hu
mi accubantibus, cauliculos
edit tenues, obsequiosos, ro-
tundos, dodrâte minores. Ra-
dicem alteri longè minorem
multifidamque.

L O C U S.

Nascitur in pratis, & pa- *Idem.*
scuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R È S.

Præstat omnia quæ maior. *Idem.*



BELLIS

BELLIS minima; Italis, *Margarite*, & *fiori di prima vera gentili*. Germanis, *Zinnfenchön*.

BELLIDIS SPECIES.

G E N E R A.

Matth. Pluribus spectantur generibus, quæ florum varietate dignoscuntur.

F O R M A.

Idem. Folia tamen si in omni genere habeantur longiuscula, & crassiuscula, solo procumbentia, atq; per ambitum sensim serrata; flores tamen coloribus, & foliorum stipatu inter se variant. Siquidem in uno genere cætro tenus aurei, & per ambitum rubentes cernuntur, in altero verò ex candido rufescentes, aut versicolores. Sūt etiam qui intus rubescant, & in ambitu albicet, quin etiam in quodam genere flores habentur exilibus admodum foliolis, ipsisq; versicoloribus aded vbiq; stipati, vt sericinos floccos penè referant.



L O C U S.

Idem. Seruntur in hortis, & fœtilibus ad coronamenta.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Omnia genera paribus viribus pollent.

PEONIA, Græcis, Παιωνία, seu παωνία. Arabibus, Feonia. Italis, Peonia. Germanis, Peonien. Hispanis, Rosa del monte, seu Rosa albardeira. Gallis, Pivoine, seu Pynoine.

PÆONIA MAS.



G E N E R A.

Duum est generum, Mas diosa & Fœmina.

F O R M A M A -
R I S.

Mas folia iuglandis habet. *Idem.* Radix ei inest digitali crassitudine, & palmi longitudine, alba, gustu adstringens: Flores & fructus fœminæ similes.

L O C V S.

Prouenit in altissimis montibus, & præruptis. *Idem.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ijs tum qualitatibus, tum *Matth.* viribus præstat, quarum & fœmina, de qua statim dicitur.

T:

PÆONIA

PÆONIA fœmina, Græcis, Παιωνία, sive Παιωνία θυλεια. Italis, Pœonia fœmina.

PÆONIA FŒMINA

F O R M A.

Diosc. Folia Smyrniij more diuiduntur. flores mittit summo caule grandes, è quibus filiquæ oriuntur amygdalis similes, in quibus cum dehiscunt multa grana exigua, rubra, acinis punicatorum similia, inueniuntur. Radices habet ceu glandes circiter septem, aut octo, ut in haustula regia.

L O C V S.

Idem. Nascitur in altis montibus, saxosis, & præruptis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Radicem habet leuiter adstringentem, quadam cum dulcedine, & si plusculum dentibus mandas, acrimoniam irem quampiam subamaram subesse percipies. Expurgat porro etiam iecur obstructum, & renes, præsertim quæ acris & subamara est. Est autem facultate omnino resiccatoria vehementer, haud tamen insigniter calida, sed aut ad symmetrum, aut paulò calidius temperamentum attingens est.



V I R E S.


Diosc. Sicca radix fœminis, à partu non purgatis datur, ciet menses, amygdalæ magnitudine pota, ventris doloribus cum vino hausta auxiliatur, valet contrarium morbum, & renum, & vesicæ dolores, decocta in vino aluum sistit. Rubra grana, rubentes menses sistunt decem, aut duodecim pota ex vino austero, lithinachicis, & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota initia calculorum erimunt, grana nigra auxiliantur nocturnis suppressionibus, Vulvæ strangulationibus, atq; doloribus. xv. numero pota in aqua mulsa, aut vino. Præstat collo suspensa Radix comitialibus pueris, & pota capitis affectibus auxiliatur, & idem facit semen.

Gal. 6.
simp. me.

LITHOSPERMUM minus, Officinis, *Milium folio*. Græcis, *Ἀσθμασπικρον μικρόν*.
 Italis, *Lithospermo minore*, *Miglio saluatico*, seu *Milium folio*. Germanis, *Klein
 Wechhuse* / seu *Steinsamen*.

LITHOSPERMUM MINUS.

F O R M A.



Planta est fruticosa, cauli- *Matth.*
 bus plaribus referta, sesqui
 pedalibus, lignosis, firmis, in
 quibus folia insunt oleæ mi-
 nora, & semen circa folio-
 rum exortum, album, milij
 simillimum, pellucidumq;,
 sed lapidea ferè duritie. Ra-
 dices habet tenues, nume-
 rolasque.

L O C U S.

Nascitur arido, & sabulo- *Idem.*
 so solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Semen cum vino albo po- *Diosc.*
 tum, calculos frangit & vri-
 nam pellit. Semen datur v- *Matth.*
 tiliter potandum diebus plu-
 ribus sesquidrachmæ pon-
 dere addita Asplenij semi-
 drachma, & succini scrupu-
 lis duobus ex succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhæam co-
 hibendam. peculiariter autem iuuat foeminas ægre parturientes, si seminis
 drachmæ duæ in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.

* LITHOSPERMON sylvestre, aruense, vel nigrum, Græcis, *λίθοςπερμον*
ἀγρίον. Germanis, *Wilder Meerhirschen*.

LITHOSPERMON SYL-
 VESTRE.

F O R M A.

Herba hæc excedit cubi-
 tum altitudine, folia habet
 quodammodo similia folijs
 Milij solis, minora, non ita
 quidem dura sed aspera, ni-
 gricantia, per ramos sparsa,
 quæ quo magis ad superiora
 tendunt minora fiunt. In mul-
 tos diuiditur ramos tenues a-
 speros, in quibus sunt flores
 albi, parui, similes floribus
 milij solis, ordine per ramos
 ascendentes, & ad vnum quæ-
 que sunt folia, ijs succedunt
 semina nigra, terna vel qua-
 terna simul, similia feminibus
 Echiorum, Buglossæ vulgaris
 vel Borruginis, stipata par-
 uis foliolis vt in Borragine, ra-
 dice nititur succi plena, an-
 nua tamen, superiore parte
 subrubente.

L O C V S.

Nascitur in segetibus & in-
 ter olera.*



PHALARIS,

PHALARIS, Græcis, Φάλαρις. Italis, Falari.

P H A L A R I S.



F O R M A.

Cauliculos emittitææ cul- DIOSC.
mis similes, à minutis, ac nul-
lius vsus radicibus: multis, du-
um palmorum, geniculatos,
graciliores, validiores, ac dul-
ces, semen candidum, in spi-
catis capitulis, oblongum, mi-
lij magnitudine.

L O C V S.

Seritur in Italia, spectaculi Matth.
gratia.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Tunditur, & in aqua, aut
vino succus, & ad vesicæ cru-
ciatus vtilissimè bibitur: Se-
men cochlearis mensura po-
tum ad eadem efficax est.

T c 3

RUBIA

RUBIA sativa, siue Domestica, Græcis, Ερυθρόδαρυ. Arabibus, *Pane*, seu *Fae*, *Alfabagin*. Italis, *Robbia*. Germanis, *Serbertöt*. Hispanis, *Ruia*. Gallis, *Garence*.

RUBIA SATIVA.

G E N E R A.

Diosc. Duo eius sunt genera, vna sponte prouenit, altera feritur.

F O R M A S A T I V E.

Idem.

Caulēs illi sunt asperi, & quadranguli, longi, aparinae non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores, folijs per interualla circum articulos stellatim decussatis. Semen rotundum, inter iniuria viride, mox rubrum, postea cum maturuerit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra.

L O C V S.

Matth.


Seritur quibusdam in locis in campis. in Ethruria tamen domestica etiam sponte nascitur secus itinera, sepes, & fruteta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6.

simp. m.

Radix acerba gustu est, & amara. Itaque Iecur, & lienem expurgat, vrinam trahit crassam, & sanguinolentam, & menses, ac me-
diocriter abstergit.



V I R E S.

Diosc.

Radix vrinam ciet, qua de causa regio morbo opitulatur, ex aqua multa pota. Item Ischiadicis, & resolutis, crassam, copiosamq; vrinam pellit, nonnunquam & sanguinem. bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Ramuli cum folijs ex vino potui præstant aduersus serpentium morsus, semen ex aceto potum lienem ablu-
mit. Imposita radix trahit menses, & secundas. Illita ex aceto albæ vinlig-
ni medetur.

RUBIA sylvestris, Græcis, Ερυθρόδαρον ἄγριον. Italis, *Robbia saluatica*. Germanis, Wildt Röt.

RUBIA SYLVESTRIS.

FORMA.

Caulis, & folia minora *Matth.* longè spectantur quàm domesticæ, & minus quoque aspera. Radix etiam illi est non adeo rufa, multifida, tenuisque.

LOCVS.

Prouenit sylvestris locis. *Idem.* secus itinera, in frutetis & propter sepes.

Eius vires longè imbecilliores sunt quàm domesticæ.



LONCHITIS aspera, Græcis, Λογχίτις τραχήα. Italis, Lonchite aspera. Germanis, Spicant.


LONCHITIS ASPERA
MAIOR.

GENERA.

Matth. Duo eius reperiuntur genera, Maius, & minus, quamvis Dioscorides vnus tantum meminerit.

FORMA.

Matth. Folij est Scolopendrij proximis, longioribus tamen, ac magis diuisis, & ad polypodij faciem potius accedentibus, spitamæ longitudine, vtrunque disparibus incisuris dissectis, tenuibus, aculeatisq; denticulis circumferratis, ac vbiq; asperis, vnde illi nomen. caulem non profert, nec flores, neq; semen, perinde ac polypodium, & asplenium, quorum imaginem refert. Radice nititur multifida tenui Phyllitis modo.



LOCVS.

Idem. Nascitur in vmbrosis, opacis, & humectis locis.

QUALITATES.


Gale. 7. Folia ad glutinanda vulnera vtilia sunt, cum sunt adhuc viridia, sicca tamen *simp. me.* ex aceto pota lienes induratos sanant.

VIREs.

DIOSC. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisque inflammationes excitari non patitur. ex aceto pota lienem absumit.

LONCHITIS asperaminor. Italis, *Lonchite aspra minore*.

LONCHITIS ASPERA MINOR.



FORMA.

Mitiora, tenuiora, angustioraq; folia promit, & magis Polypodio similia, hirsuta, & aspera.

LOCVS.


Nascitur in opacis, & frutetis, vliginoso solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Herba est, & ipsa vulneribus glutinandis, lienibusque absumendis idonea, perinde ac altera.

* LONCHITIS ASPERA
MARANTHÆ.

Folia promit à radice nigra cirroloaque, similia scolopendrio, sed magis diuisa & minora, pediculis nixa rubentibus vt Trichomanes, attingit nonnunquam dodrantis altitudinem, sed plerunq; infra subsistit. Nascitur locis æditis & saxosis, vel in nemoribus aspero solo. *



ALTHIA,

ALTHEA, Græcis, Ἀλθαία, & ἑβραϊκῶς. Italis, Malvauschio. Mauritanis, Chirini, Chatini, siue Chatmia, siue Rosa Laueni. Germ. Ibsch / & Heywurts. Hisp. Hierua Cannamera, siue Marmaie. Gallis, Guymauue.

ALTHEA

FORMA.

Althea, quam alij Ibscum diosc. vocât, in maluarû syluestrium genere est, cui folia vt Cyclamino rotunda sunt, lanugine canescunt, flore rosaceo, caule bicubitali; tricubitalive. Radice lenta, intus alba.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, Matth. humecto solo.

QUALITATES.

Facultatē habet digerendi, Galen. 6. laxandi, phlegmone leuandi, simp. me. mitigandi, concoquendi. Radix porro eius, & semē cætera quidē similiter agunt, vt herba viridis, sed tenuiarum partium, magisq; exiccatoria. ad hæc magis abstersoriam quā illa facultatem ostendunt.

VIRES.

In vino aut aqua multa decocta, & per se cū imponitur tusa efficax est cōtra vulnera. Prestat itē ad strumas, parotidas, abscessus, mammarū inflammationes. Siquidē discutit, excoquit, rūpit, & ad cicatricem perducit. Diosc.

Cocta (vt dictum est) suillo aut anserino adipe adiecto terebinthinæve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflāmationes, præclusionesq; in pessis subdita. Decoctum eodem fungitur munere, onera vuluæ reliqualq; a partu extrahit. Decoctæ radicis succus ex vino potus succutrit vrinæ difficultati, calculosorū cruditatibus, dysentericis, ilchiadicis, tremulisq; Dentium dolorem mulcet cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, sicumq; tritum vitilignes, sub Sole perunctum emendat. Eodem cum oleo, & aceto peruncti à venenaris non feriuntur. Valent contra dysenteriam, sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. Bibitur in posca, aut vino contra omnes Jelsparum, apum, similitumq; aculeatorum ictus.

ALTHEA

ALTHEA altera, quibusdam Abutilon vocatur. Italis, *Malvauschio bastardo*.

ALTHEA ALTERA, SIVE
ABUTILON.

FORMA.

Matth.

Folia habet cucurbitæ, minora, tactu lævia, sed tenuissima obducta lanugine. caulem edit sesquicubitalem, & aliquādo maiorem. flores in toto caule aureos, è quibus semen oritur nigrum. Radice nititur longa fibrosaq;.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in campestribus, ac etiam sponte in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Semen epotū sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos, & arenam pellit, vrinam ciet, & eius cruciatus mitigat.



ALCEA,

ALCÆA, Græcis, ἀλκᾶ. Barbaris, Bimalue. Italis, *Maluanisco saluatico*. Germanis, *Sigmarstrauch*. Hispanis, *Malua montesina*. Gallis, *Bimaue*, vel, *Guimaue sauuage*.

A L C Æ A .



F O R M A .

Herba est caule, floribus, *Matth.* & semine sylvestri malvæ per quàm similis, sed folijs euidentioribus, incisuris laciniatis, ranunculi modo. caules edit tres, aut quatuor, canna bino cortice vestitos. flores malvæ, tum facie, tum colore similes, pauloq; maiores, quemadmodum & semé. Radicem longam, latam, albam, ac multifidam malvæ similem, sed lignosa intus matrice.

L O C V S .

Nascitur in incultis, campis, *Idem.* pestribus, & agrorum, scrobiumq; marginibus, iuxta semitas, vias, ac semitas.

Q U A L I T A T E S ,
E T V I R E S .

Alcea sylvestris malvæ ge- *Galen.*

nus est, in vino pota dysenteria, & erosionibus medetur, & potissimum eius *Diosc.* radix.

C A N N A -

CANNABIS, Græcis, *Κάναβις*. Arab. *Scehedenege*, & *Canab*. Italis, *Canapa*. German. *Zämer Hanff*. Hispan. *Canambo*. Gallis, *Chanvre*.

G E N E R A.

C A N N A B I S.

DIOSC. Tria Cannabis numeratur
Matth. genera, Mas, Fœmina, & Syl-
uestris.

F O R M A.

Matth. Mas plures è caule fundit
ramos, arbusculæ speciem re-
ferens. adeo vt ex eius stipite
carbones fiant ad bombardarum
puluerem parandum. Fœ-
mina caules edit lōgè tenuio-
res, nullis ramis brachiatos,
nulloq; semine proliferat. Fo-
lia vtriusq; fraxini, sed mino-
ra, & graciliora, sensimq; ser-
rata, quæ quidē in mari maio-
ra, nigrioraq; spectantur, qui-
na senave ex vno pediculo p-
deuntia. Radice nititur mul-
tifida, fibrosa; Semen tan-
tum in mari gignitur rotun-
dū, cinereo colore, cuius me-
dulla dulcis est, & alba. Sylue-
stris virgas fert altheæ similes,
minores, nigriores, & asperio-
res, cubitalesque, folijs satiuæ
nigrioribus, & asperioribus,
flore Lychnidis, subrubro, se-
mine & radice altheæ.



Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen flatus discutit, adeoque desiccatur, vt si plusculum edatur, genituram exiccet. Mat-
simp. me. tum quoque calefacit. Ideoque sumprū paulò largius, caput ferit, vaporem sursum ad iplum
& li. 1. de mittens, calidum simul, ac medicamento sum.

V I R E S.

DIOSC. Semen aduersatur ijs, qui procreandæ soboli dant operam: namq; lōgiore cibo sumptis,
genituram extinguit. foliorum recentium succus conuenienter aurium doloribus instilla-
Matth. tur. Syluestris radix decocta, & illita inflammationes mulcet, tumores discutit, & tofos articu-
lulorum. Succus satiuæ instillatur auribus vtiliter ad vermes necandos: quin etiam inter-
stinatorum tineas excutit. Equorum quoque tineas, quæ intro sedem hærent, succus, aut de-
coctum infusum eiicit. Radix recens illinitur vtiliter ambustis, sed sæpius amouenda, & iterum
ad mouenda recens, ne exiccet,ur.

ANAGYRIS, Græcis, ἀνάγυρις. Italis, *Anagiri*, & *fauinversa*. Germ. *Stindbaum*.

ANAGYRIS.



GENERA.

Duum est generum, *Matthiæus*, & *Minus*.

FORMA MAIORIS.

Frutex est arboris instar, per *Diosc.* quàm gravi odore, folijs viticis, virgisque, flore brassicæ, racemoso, semen in corniculis non breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vva maturefciente. *Vf. Matth.* que adeo duro, vt aqua macerato, in sua tamen pertinaci duritie consistat.

QUALITATES.

Frutex est grauiter olens, *Galen. 6.* & acris, digerentis exalfaciens *simp. me.* risque facultatis. virentia folia propter humiditatis admistionem, minus sunt acria, sicca verò incidentis. & siccantibus sunt facultatis. similem quoque facultatem habet radicis cortex.

VIRES.

Tenera folia trita tumores illita reprimunt. Si partus hæreat, si secundæ, *Diosc.* mensisq; morentur, bibuntur drachmæ pōdere in passo. Sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. difficulter parientibus adalligantur, ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducarum vomitiones vchementer ciet.

ANAGYRIS altera, siue minor, Græcis, ἀνάγυρις ἑτέρα. Italis, Angiri minore.
Ananienſibus, in agro Tridentino, Eghelo.

ANAGYRIS ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia prodeunt ex vno pediculo terna, oblonga, in acumine mucronata, viridia, læuiaque, trifolij latiora. aureis micat floribus, vt in altero racematim dependētibz, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt Genistæ æmula, in quibus semen continetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongū, phaseli modo, colore subnigro. Materies ligni durissima, quæ Guaiaci modo exterius lutea est, medullitus verò nigra. In- corrupta diu durat; proinde rura palos ad vites sustinēdas ex ea parant. Quin etiam sagittarij validissimos cōficiunt arcus.

LOCVS.

Idem.

Oritur in syluis montium, & copiosum habetur in Ananiz vallis syluis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Omnia potest, ac præstat, quæ maius præstare diximus. * Odore dicitur occidere mures: Plantæ cinis ad calculum commendatur. *

APPENDIX.

* Qui putant Anagyrim alteram esse Laburnum (mea quidem sententia) non aberrant, Et fide digni rei; herbariæ peritissimi viri se in monte Iura cubito longiores racemos floribus inuenisse referunt. *



CEPÆA, Græcis, Κηραία. Italis, Cepea.

C E P Æ A.

F O R M A.


Cepæa portulacæ similis DIOSC.
est, sed nigriora habet folia,
& radicem tenuem.

L O C U S.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Folia in vino pota, urinæ DIOSC.
stillicidio, & vesicæ scabie la-
borantibus opitulatur. maxi-
mè id præstat, si cum decocto
radicum asparagi, quem mya-
canthon, hoc est, corrudam
vocant, bibatur.



Vu

ALISMA,

ALISMA, seu Damasonium, Græcis, ἄλισμα. Italis, Alisma. German. Engwurtel. & Mutterwurt.

A L I S M A.

F O R M A.

DIOCS. Folia insunt ei plantaginis, sed angustiora, conuexaq; in terram, caule simplici, tenui, cubito altiore, capitib. thyrsi, flore tenui, candido; pallescere, radicibus tenuibus, ut veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus.

L O C U S.

Idem. Aquosos amat tractus.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. simp. me. Absterforiæ est facultatis.

V I R E S.


DIOSC. Radicis drachma una, aut altera pota his conuenit, qui leporem marinū, aut opium hauserunt, aut à rubetis demorsi sunt. Datur dysentericis per se, aut cum dauci semine. conuulsis, & contra vitia vulæ prodest. Hæba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigar.



A P P E N D I X.

* Quam pinxit autor hoc in loco pro Alismate, non candidum, sed aureum gerit florem in hirsuto subrubenteq; cauliculo, pedali, odore sternutamentum ta cientem, qui tandem in pappos abit.*

HYPERICVM, Græcis, *ὑπερίκον*. Mauritanis, *Reioficon*, seu *Reiofaricon*. Italis, *Hiperico*, *Perforata*, seu *Herba di S. Giouanni*. Germanis, *Sancti Johannisstraut*. Hisp. *Coraioncillo*. Gallis, *Millepertuis*, sine *Trucheran*.

H Y P E R I C V M.**F O R M A.**

Frutice est surculaceo, do- **Diosc.**
drantali, rubescente, folioru- **Matth.**
ta, punctim perforato, flore
luteo, leucoio simili, qui digi-
tis attritus sanguineū succum
remittit, subhirsuta siliqua,
& in rotundo oblonga hordei
magnitudine, semine intus
nigro, resinosi odoris.

L O C V S.

Gignitur in cultis locis, & *Idem*.
asperis. **Diosc.**

Q U A L I T A T E S.

Calefacit, & desiccatur, re- **Gal lib. 3.**
nuisq; substantiæ est, aded vt, *simp. me.*
& mētes, & vrinās prouocet.
Aperit, resoluit, agglutinat,
atque etiam cohibet.

V I R E S.

Vrinam cit, Menstrua pel- **Diosc.**
lit, appositū Tertianis, *Quar-*
tanique liberat. Semen qua-
draginta dieb. haustum Ischia
dicis ineditur. Folia cum se-
mine illita, ambusta sanant.

Semen ex vino potum calculos eiicit, & venenis aduersatur. *Quin etiam vene-* **Matth.**
nosorum moribus resistit, tum idem potum, tum herba ipsa deuorata, hausta-
re, tum vulnere illita. Aqua stillatitia florentis herbæ bibitur vtiliter comitia-
libus, & resolutis. Datur seminis farina commodè ex polygoni succo sangui-
nem expuentibus. Idem aluum exonerat. Inest floribus, ac semini mira facul-
tas ad vulnera recentia sananda, præter ea quæ capiti infliguntur.

ASCYRUM, Græcis, ἀσσυρον. Italis, Asiro. Germanis, Harten.

A S C Y R V M.

F O R M A.

Diosc. Hyperici genus est, magnitudine distas, fruticosus, maiores habens ramos, surculosos, rubentesque, folia tenuia, flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non ab-similem, cuius attritu digiti ferè cruentantur.

L O C V S.


Matth. Nasclitur in cultis, & quandoque in vliginosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Semen purgatorium est, **simp. me.** foliorum verò facultas modicè extergens, & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austero decocta vinum ipsum magnorū vulnerum glutinatorium efficiunt.

V I R E S.

Diosc. Vfus seminis ad Ischiadicos valèr, potum in hydro-melitris sextario. nam biliosa recrementa detrahit, sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur, liniuntur & ambustis efficaciter.



ANDROSÆMVM, Græcis, Ανδρόσαμνον. Italis, Androsæmo.

ANDROSÆMVM.

FORMA.

Androsæmum ab hyperic. Diosc.
eo, & ascyro differt, quod fruticet, ramulis furculosis, ac tenuibus, rubentibus virgis, folijs rutæ, triplo, quadruplove maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complures in cacumine alas habet, vtrinq; expâsas pinnatasq; circa quas flores pusilli, lutei, & in calyculis semen papaueris nigri.

LOCVS.

Prouenit in montosis, & *Matth.* collibus.

QUALITATES.


Semen aluum purgat, at- *Galen. 6.*
qui folia extergunt, & desic- *simp. me.*
cant.

VIREs.

Semē tritum duarū drach- Diosc.
marum pondere potum biliosa alui excrementa pellit.

Uchiadicis maximè medetur, sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Vu 3 CORIS,



CORIS, Græcis, *Kēis*. Italis, *Cori*. Germanis, *Wankentraut*.

C O R I S.

F O R M A.

Diosc.
Matth.

Frutex est folio *Ericæ*, rubro, pinguiore, ac minore, nō altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Flores habet hyperici æmulos, luteo colore, sed minores.

L O C U S.

Idem.

Nascitur arido solo in colibus, atque montibus.

Q U A L I T A T E S.


Idem.

Aperit, excalfacit, extenuat, digerit, expurgat.

V I R E S.

Diosc.

Potum semen menses trahit, & vrinas. Contra Phalangiorum morsus, Ischiadicos, & opisthotonicos ex vino pota auxilio est. horribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur.



ΑΙΥΓΑ

AINGA, siue Camæpitys. Græcis, *γαραπίτυς*. Mauritanis, *Hamestheos*, seu *Camisrbius*. Italis, *Camepitio*, & *Iua*. Germanis, *Jelengerjelieber*. Hispanis, *Pinilho*, & *Iua arctica*. Gallis, *Iue muscate*, siue *arterique*.

C A M Æ P I T Y S.

G E N E R A.

Trium est generum.

F O R M A P R I M I.

Prima herba est in terra re-**DIOSC.**
pens, subcurua, folijs mine-
ris sedi multo tenuiorib⁹, cit-
cum ramos, frequentibus, o-
dore pinus. Flore tenui, luteæ
vel candido. Radicibus cico-
rij. Alterum exit cubitalibus
ramulis in anchoræ speciem
incuruatis, prætenuibus, co-
ma supradictæ, flore candido.
Semine nigro, ac etiâ pinum
redolet. Tertia Mas nomina-
tur parvula, folijs exilibus, al-
bis, scabris, caule aspero, can-
dido, luteis flosculis, semine
iuxta alas; resipit & hæc pi-
num.

L O C V S.

Nascuntur in campys tum **Matth.**
cultis, tum etiam incultis, &
præsertim exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Camæpitys gustu quidem
amarum saporem, ac rivalidio
rem obtinet. Effectu verò ex-

purgat, abstergitque viscera, plusquam calefacit. Est enim in desiccando ordi-
nis tertij, in calefaciendo verò secundi.

V I R E S.


Primi generis Ainga septem diebus in vino pota regio morbo medetur, & **Galen. 8.**
quadraginta diebus ex oxymelite Ischiadicos sanat. Datur peculiariter vrinæ **simp. me.**
difficultatib. Prodest, & renū vitij, & torminosi. Bibitur cōuenienter foliorū
decoctum contra aconitū. Trita in farina, & cum fico in pilulis sumpta aluum
emollit, apposita ex melle vuluæ vitia extrahit, mammarum duritias discutit.
Vulnera glutinat, & vlcera, quæ serpunt ex melle illita cohibet. Vrinam ciet.

CHAMÆPITYS alia, quam nonnulli ad Anthyllidem referunt.

* Folia profert oblōga hirsuta in tres partes diuisa, cauliculum dodrante altiorem striatum, in cuius summitate flores purpureos quinis folijs constantes vt buglossi flores sed oblongioribus, habentes in medio stamina praelonga, Lignosa radice sustentatur, & transuersa, superiore parte in ramos diuaticata, quibus se propagat, tota planta odorata est & nonnihil amara.

LOCVS.

Prouenit in mōribus prope Castelnēuf, locis valde petrosis.*



Libri Tertij Finis.

BETONICA, Græcis, Κίσπος, ἢ Λυχότροπος. Arabibus, *Chastra*. Italis, *Betonica*, seu *Brettonica*. Germanis, *Betonien*. Hispanis, *Bretonica*. Gallis, *Betonie*, seu *Botoine*.

BETONICA.



FORMA.

Caulem fert tenuem, cubiti *Diosc.* altitudine, aut maiorem, quadratum, folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, propè radicē maiora. Flo- *Matth.* ré in summis canlibus fert spicatum, & rubrum. Radicem fibrosam, & vt veratri tenuem.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & montibus, & in pascuis. *Idem.*

QUALITATES.

Vim habet incidendi: ipsa *Gal. 7.* enim herba amarior est, & sub- *simp. me.* acris, id quod & particulatum edita actio ostendit.

VIREs.

Radix ex aqua mulsa pota, *Diosc.* pituitā vomitione euocat. Folia dari debent mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad arcēdos eiusdē strangularis, ex eadē mulsa denarij pondere: tres eorundem drachmę bibuntur ex vini sextario cōtra scorpionum morsus, quibus & herba illira medetur: eiusdē drachma bibitur vtiliter cū vino ad ebi-

bita venena: quin etiam præsumpta eorundē vires abolet: vrinam ciet, aluum subducit: ex aqua pota medetur cōmitialibus, & infans, & iocinoris, lienisq; vitij ex oxymelite: propinatur acida ructantibus, stomachicis quoq; proderit, si mansæ succum deglutiuerint, & deinde dilutum vinum hauserint: valet sanguinem reiicientibus ex vino diluto sumpta: datur vtiliter ischiadicis, & in renum, & vesicæ doloribus. regio morbo laborantes recreat, menses pellit, drachmę pondere cum vino pota: aluum purgant quatuor drachmę cum oxymelitis decem cyathis. Consistentes in renibus calculos frangit, & pulmonem, *Matth.* iecur, & thoracem expurgat.

SERRATVIA, *Tralis*, *Serratola*. Germanis, *Scharrentraut* / *Serbscharten*.

SERRATVIA.

F O R M A.

Matth.

Caule constat purpurascen-
te, tenui, ramofoque: folia
gerit antea quàm caulescat
betonica cognata, toto am-
bitu tenuiter serrata, sed ybi
adoleuerit faciem mutant,
nam exortis profundioribus
incisuris, maioris phu qua-
dantenus similia spectantur.
Flores edit in summis ramu-
sculis purpureos, & radicem
multifidam.

L O C V S.

Idem.

Nascitur syluosis locis.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Idem.

Datur vtiliter potanda ex
albo meraco ruptis, & ab al-
to deuolutis: in vino deco-
cta, ac deinde illita, vlcera mi-
rifice mundat, carne replet,
& cicatrice obducit: hæmorrhoidum quoq; dolores mulcet foru adhibita: so-
lia, & radix simul contusa & imposita, enterocellas sanare creduntur.



BISTOR-

BISTORTA, seu Colubrina, Italis, *Bistorta*. Germanis, *Statterbourg*.

B I S T O R T A.

F O R M A.



Folijs erumpit primo sta- *Matth.*
tim exortu in acutum desinē-
tibus colore subrufo, quæ vbi
adoleuerint, rumicis folia re-
ferunt, læuia tamē sunt, & in-
ferna parte subpurpurea &
per ambitum sinuata: caulem
edit rotundum, tenuem, cu-
bitalē, in quo folia longē mi-
nora spectantur: flos in caulis
summitate prodit spicatus,
ruber, siue subpurpureus, ē
quo semen gignitur oxalidis.
proximū: radice nritur qua-
dantenus arundinacea, sedi
succosa, & serpentis modo
cōtorta. cortice exterius sub-
nigro, sed rubra intus carne,
adstringentis gustus.

L O C V S.

Oritur in altis montibus, & *Idem.*
pascuis.

Q U A L I T A T E S,
ET VIRES.

Refrigerat, exiccat, cohi- *Idem.*
bet, roborat. Bibita radix ab-
ortum reprimt: ventri, publi,

renibūsq; ex aceto illita vrinæ incontinentiam supprimit, cum succo plantagi-
nis pota, sanguinem ē vulnere manantē cohibet, superasperso tamen eiusdem
pulvere. Idem ex punicorum malorū vino potus, biliosas vomitiones suppri-
mit. præstat porus contra lætalia venena, aduersus pestilentiam, & pestilentes
febres, in quibus exanthematum notæ emergunt, valet ad puerorum vermes
necandos, tum idem radicum puluis, tum earum decoctum potum: Eadem ra-
dix cohibet tum cæteras alui fluxiones, tum dysenteriam. additur commodē in
potionibus, quæ ad intrinseca parantur vulnera. datur trita ad cruenta expuen-
tibus, canis dentium indita, cum aluminis & pyrethri momento, non modo
dolorem mulcet, sed fluxiones eo decurrentes sistit. valet item ad omnes ve-
nenosorum serpentium ictus, ex vino sumpta.

* *BISTORTA* minor seu Alpina.

FORMA.

Similis est priori, sed multo minor, folia in marginibus pulcre distincta punctulis quibusdam & veluti ferrata apparent.

LOCVS.


Crescit in alpidibus & in monte Iura quoque copiose provenit. *



TORMEN-

TORMENTILLA, Italis, *Tormentilla*. Græcis, *Ενυάλας*. Germanis, *Tormentil*. Gallis, *Tormentille*.

TORMENTILLA.



F O R M A.

Folia promit pentaphylli *Matth.* minora, septenis incisuris diuisa, radicem breuem, nodosam, compactam, rubro intus colore, sapore adstringenti: cauliculos tenues, subrubentes: flores melinos pentaphylli æmulos.

L O C V S.

Nascitur in montibus. *Idem.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Viribus omnibus insigni-*Idem.* tur, quibus Bistorta prædita est.

* A P P E N D I X.

Magna varietas in radice deprehenditur, minima omnium vulgaris est, quæ passim, etiam in planitie reperitur, ea in hortum translata tuberculum pusillum genuit, quasi nouellam radiculam, vt liquet ex imagine, qua exhibemus etiam illam montanam quæ non tantum brevis & nodosa sed nonnunquam etiam prælonga, brachiataque inuenitur.*

LYSIMACHIA, Græcis, *Λυσιμάχου*. Italis, *Lisimachia*. Germanis, *Sellwede*.
derich.

LYSIMACHIA.

F O R M A.

Diosc. Caules emittit cubitales, altioresve, hirsutos, renues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, falcis figura, gustu adstringentibus. flore rufo, aut aurco.

L O C U S.

Idem. Gignitur in aquosis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Superantem habet qualitatem adstrictoriâ, per quam vulnera glutinat.
simp. anc.

V I R E S.

Diosc. Foliorum succus, sanguinis reiectiones supprimit, dysentericis auxiliatur, tum porus, tum quoq; infusus, mensium abundantiam sistit in pello: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita redoler. qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit. Viscis tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita eorum asperitatem cohibeat.



LYSIMA-

LYSIMACHIA altera, Italis, *Lisimachia secunda*. Germanis, Braun Weiderich.

LYSIMACHIA ALTERA.

FORMA.


Caule prouenit recto, qua- *Matth.*
drangulari, bicubitalique, fo-
lijs salicis, flore spicato rufe-
scente.

LOCVS.

Nascitur prope fluentes a- *Idem.*
quarum riuos, & vliginosis
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Adstringit, refrigerat, co- *Idem.*
hibet, & omnia potest. quæ &
altera.



POLYGO-

POLYGONVM, Græcis, Πολύγωνον. Aphris, Bassalragi. Italis Poligono, seu Correggiola. Germanis, Weggras. Hispanis, Corrisla. Gallis, Correggiale.

GENERA.

Marth. Trium est generum. Mas, Fœmina, Minus.

FORMA MARIS.

Diosc. Caules mittit teneros obsequiosos, rotundos, geniculatos, humi graminis modo repentes: folia oblonga, ligularum modo. semine sub folijs turgescente: Flos verò ei candidus, & exiguus.

LOCVS.

Idem. In campis, ædificiorum aereis, hortis, publicis vijs, ac ferè vbiq; crescit.

QUALITATES.

Gal. 8. Polygonum vti adstrictio-
simp. me. nem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est & exiccatorium: Est quoq; inas ad omnia validior, quam fœmina.


V I R E S.

Diosc. Succus epotus spissat, ac refrigerat. Prodest cruenta excreantibus, cholera, alui fluxionibus, & vrinæ stillicidio. Auxiliatur ex vino potus, serpentium morsibus. Fœminarum profluua in potu sistit. Instillatur vtiliter purulentis, dolorosisq; auribus. Ex vino, & melle decoctus, facit eximie ad pudendorum vlcera. illita folia stomachi feruores extinguunt, sanguinis reiectiones sistunt, & vlcera serpentia, sacros ignes: collectiones, tumores, & recentia vulnera sanant.



POLYGONVM fœmina, Græcis, Πάλυγον θήλη. Italis, Poligono, & Correggiola fœmina. Germanis, Kanten Kraut. Gallis, Pin aquatic.

POLYGONVM FOEMINA.



FORMA.

Vno tantum caule fruticat, DIOSC. arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo fæctis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes: radicis nullus vsus.

LOCVS.

In aquosis, & humentibus Matth. locis prouenit.

QUALITATES, ET VIRES.

Refrigerat, siccant, inspissat, DIOSC. & ad ea quoq; præstat, ad quæ mas, sed inefficacior est.

POLYGONVM minus, Græcis, Πολύγωνον μικρόν, & nostro tempore, *accedon*.
Nonnullis millegrana, quibusdam Herniola, vel Herniaria. Italis, *Conte-*
giola minore.

POLYGONVM MINVS.

FORMA.

Math. Ramos edit exiles, humi re-
pentes, geniculatosque; folijs
pusillis, longiusculis, semine
pumilo, rotundo, minuto, al-
bicante; racemoso, adeoque co-
piofo, vt vniuersa planta semi-
ne pragnare conspiciatur.

LOCVS.

Idem. Nascitur arido solo, & in
siccis torrentium alueis.

QUALITATES ET
VIREs.

Idem. Vrs illi est conglutinandi,
siccandi, refrigerandi, proin-
de semen potui datum diebus
pluribus, commodissime præ-
stat ad enterocellas, vniuersæ
planæ pulvis ex vino haustus,
non solum vrinam cit, sed cal-
culos frangit, vbi diutius su-
matur. * Iecori obstructo
prodest & ictero, quem aqua
eius sanat pota ad octo dies. *



*POLYGONON marinum & *cocciferum, Polonis *Kosmaczek*.

F O R M A.

Marinum prouenit viticallis vulgaris polygoni subrubentibus, quæ internodijs nigris distinguuntur & squamulis tenuissimis exalbidis, folia habet magis alba & densiora, flosculi pulchri rufescent & semen gignunt triangulare nigrum, vt oxalis. Radix excedit palmum, dura, lignosa, contorta, crassa, valde nigra.


Cocciferum tenuissimis prodit folijs & mucronatis, cauliculis nodosis exalbidis, & flosculis in summitate candidis inter squamas virescentes. ad radices ipsius coccum adnascitur elegantissimo rubore commendatum.

L O C V S.

Marinum, vbi nascatur cognomento prodit, cocciferum in arenosis Poloniae locis reperitur. *

Xx 2

POLY-



POLYGONATUM, Græcis, Πολυγονον. Italis, *Frafinella*, seu *Ginocbietto*. Germanis, *Weiß Wurk*. Gallis, *Geniculiere*.

POLYGONATUM.

F O R M A.

Matth.

Caule est cubitali, rotundo, ac lævi, circa quem folia exeunt lauri effigie, sed latio-
ra, strijs compluribus secun-
dum longitudinem proten-
sis, firma, dispari exortu pro-
deuntia, sapore quadantenus
adstringente. flores edit can-
didos, à quacunque foliorum
cavitate: baccas pisi magnitu-
dine, rubentes, & quandoq;
purpureas. Radice nititur
candida, arundinacea, tene-
ra, frequenter geniculata, di-
giti crassitudine, summa rel-
lure vagante, sed odore qua-
dantenus graui.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in collibus, &
montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8.

simp. me.

Mistam habet: tum facul-
tatem, tum qualitatem, habet
enim adstrictionis, pariter & acrimoniæ, & amaritudinis quippiam, & indi-
cibilis cuiusdam insuauitatis.

DROSC.

Matth.

Radix vulneribus efficaciter illinitur, quin etiam maculas in facie dele-
re. Quæ de remulieres è radicibus aquam stillatitiam parant, qua ad faciei niro-
rem vtuntur. sunt & quæ saccharo radices ipsas condiant, ad sistenda alba vtri
profluua.

C E N S U R A.

Manifesto errore ducuntur, qui polygonatum, Arabum seccacul esse con-
tendunt.



*POLYGONATUM VULGATIVS.

F O R M A.



Radice nititur candida, nodosa transuersim sub terra serpente, vt prior, succo viscido turgente, quæ verno tempore suos mittit asparos, molles exalbidos, folia in his initio conuoluta, sed postea vbi teretes coliculi grandescunt, explicantur & figuram referunt foliorum Hippoglossi. Ad horum exortus enascuntur flosculi albi nonnihil herbacei habentes, oblongi, qui deflorescentes vertuntur in baccas nigras, hederæ bacis vel vaccinijs nõ absimiles. in quibus alba duræq; continentur semina.

L O C V S.

Nascitur locis riguis, etiam in planitie. *

CLEMATIS, Græcis, *Kλημάντις δακρυοειδής*. Nonnullis, *vinca peruinca*. Italis, *Prouenca*, & *Prouencola*. Germanis, *Singrün*. Hispanis, *Peruinqua*. Gallis, *Lyserum*.

CLEMATIS.

F O R M A.

Matth. Viriculas spargit tenues-
laues, humi iacentes, è qui-
bus folia exeunt per interval-
la, pari vtrinque exortu, robu-
sta, oliuæ modo oblonga, lau-
ri minora, virentia, è quorum
origine, primo statim vere
flores emicant cærulei. Radi-
ces fundit numerosas, albi-
cantes, summa tellure repen-
tes. Herba est perpetuo vi-
rens.

L O C U S.

Diosc. Nascitur in terrenis, & pro-
Matth. pè sepes, atque in scrobium
ripis.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Refrigerat, siccat, robo-
rat, cohibet.

V I R E S.

Diosc. Folia cum caulibus ex vi-
no pota, alui profluvia, & dy-
senterias sedant. subdita in pecto, cum lacte, aut rosaceo, cruciatibus vultus me-
duntur: dolores dentium commanducata finiunt: imposita, serpentium mori-
Matth. bus leuamentum præstant. Fœmoribus adalligata viridia folia, mensum aban-
dantiam cohibent. & conceptus adiuuant. Capiti adalligata, & collo, gulæ
circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adduntur quoque vili-
ter vulnerarijs emplastris, & potionibus.



* CLEMATIS FLORE MULTIPLICA

F O R M A.

Conuenit cum priore tota effigie, sed flore differt, qui multiplici florum factu spectatur plenior, & è cæruleo magis ad purpureum vergit colorem, peritq; sine semine.

L O C U S.

Allata ex Austria in hortis nostris virefcit.*



CLEMATIS altera, Græcis, Κλημάτις ἑτέρα. Italis, Vitalba porpurea.

CLEMATIS ALTERA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Alterum flore purpureo, Alterum candido.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Viticulosos fundit caules, rubescentes, lentos: folia hederæ modo diuisa, gustu admodum acri, ac exulcerantia.

Matth. Flores purpureos crucis in modum diuisos, repitque per arbores, vt smilax.

L O C V S.

Matth. Oritur in syluis, & in frutetis, dumetisque.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Folia acrem, adurentem, siue causticam facultatem habent, aded, vt lepras excoerent: fuerit itaque hæc planta, in quarti ordinis excalficientium initio.



V I R E S.

Diosc. Semen tritum, piritam, bilemque detrahic, in aqua, aut hydromelite potum: folia eius illita lepras purgant: cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMATIS tertia. Italis, *Vitalba*. Germanis, *Eynen*/Baldreben.

CLEMATIS TERTIA.



FORMA.

Viticulis repit prælongis, *Matth.* obsequiosisq; folijs præcristæ quadrantenus similibus, acri gustu, ac exulcerandi facultate præditis: floribus racemosis, candidis, odoratis; & myrti adeo similibus, ut differentia ferè nihil intersit. Hos deinde capillacea, incanaq; sequitur coma, quæ tandem vento excussa, nudum relinquit fructum, angulosum, simulque compactum: subnigro colore, atq; acerrimum.

LOCVS.

Nascitur passim in sepibus, *Idem.* & in sylvis arboribus se circumvoluens, & per eas repens.

QUALITATES, ET
VIRE.

Viribus. iisdem præstat, *Idem.* quibus & superior.

Xx 5

FLAM.

FLAMMVLA, nonnullis Flammula Iouis. Italis, *Flammola*. Germanis, *Blitzkeg*.

FLAMMVLA.

FORMA.

Matib. Folijs, floribus, fructuque adeo tertiam clematidem æmulatur, ut nihil prorsus differentię intercedat: differt ab ea, quod caules edat rectos, haud vnquam repentes, sesquicubitales. Folia, & flores acerrimo sunt gustu, ac admodum feruenti.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campis, collibus, & frutetis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccatur excessu quarto.

VIRE S.


Idem. Cutem, carnemq; semicon-tusa illita, exulcerat. Ischiadicos iuuat imposita. Idem præstat oleum, in quo folia sub calente sole diu fuerint macerata, sed rosaceum oleum ad hoc requiritur. Idem non modo inunctum, sed etiam infusum, opitulatur articulorum iliorumque doloribus, ac etiam nephriticis. Scillatitia foliorum, & florum aqua, eadem ferè acrimonia pollet. Hanc non desunt, qui propinent quartana febre laborantibus, parùm ante accessionem.



SYMPHYTUM petræum, Græcis, Σύμφυτον πετρῶν. Italis, *Simplif. petræ.*

* Monspelientes hanc plantam Corin appellant.*

SYMPHYTUM PETRÆVM.



FORMA

Ramis exit tenuibus, par- DIOSC.
uis, origano similibus, capitu-
lis, & folijs thymi: lignosum
totum, odoratum, gustu dul-
ce, ac adstringens: radice lon-
ga, subrufa, seu subpurpurea,
digitali crassitudine.* Hic ap-
picta nō astringit, sed amarum
& nitrosum saporem habet,
flosculos cæruleos, semina ni-
gra angulosa.*

LOCVS.

Nascitur in petris, & petro- DIOSC.
sis montibus.* Quæ hic pingi- Math.
tur in littorib: crescit in arena;
ita vt ferè lateant ramuli & flo-
res tantum emineant.*

QUALITATES.

Ex contrarijs constat viri- Gale. 8.
bus. Habet enim incidendi simp. me.
vim quampiam, qua colle-
ctum in pectore, & pulmone
pus expurgare potest. habet
etiam quandam contrahendi
vim, qua reiectionibus sangui-

nis auxiliatur. & tertia ad eas ineſt humiditas quædam non immodicè calida,
per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum.

V I R E S.

Decoctum eius ex aqua mulſa paratum, potum, pulmonis vitia purgat: san- DIOSC.
guinem reiſcientibus, & renum malis ex aqua datur ad dysenteriam, rubraque
feminarum profluvia, in vino decoctum: vulnera recentia, enterocellâsq; glu-
tinat, & illitu cohibet. carnes cum eo decoctæ coalescunt.

SYMPHYTUM maius, *Gæcis*, Συμφορὰ ἑρέποι. *Ital.* *Consolida* maggiore. *Germanis*, *Waltwurz* / seu *Schwartzwurz*. *Hispanis*, *Suelda* maior, sine *Consolida* maior. *Gallis*, *Oreille de Asne*.

SYMPHYTUM MAIUS.

F O R M A.

Diosc. Caulem emittit cubitalem, aut
Matth. maiorem, crassum, angulosum, inanem: circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt oblonga; lataque, buglosso proxima hirsutaque. Caule secundum angulos quosdam striato, ramis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, quandoque verò purpurei, nonnunquam verò albi, diuersis in plantis spectantur. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radicem fundit crassam, multifidamque, nigro exterius cortice, interna verò pulpa candida, glutinosoque succo mader.

L O C U S.

Matth. Nasçitur frequens in pratis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3. Similem petrae vim habet. non
syn. me. tamen gustantibus dulce est, nec olfacientibus odoratum. Cæterum quatenus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet scillæ simile est. eoque vruntur ad omnia, ad quæ iam dicta

V I R E S.

Diosc. Tritæ radices & potæ, cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt: recentia vulnera illitæ conglutinant: inflammationibus, præsertim sedis, cum lectionis folijs, vtiliter illinuntur. Coaluntur etiam carnes cum ijs coctæ. Ossium fracturas sanant, si contritæ imponantur, & stricta fascia ligentur.




*SYMPHYTUM radice tuberosa.

F O R M A.

Menſe Martio flore luteo
prodit colore tantum à prio-
ris flore differens, folia quoq;
ſimilia ſunt maiori Symphiro
& cauliculi, ſed omnia mino-
ra, radice discrepat, quę protru-
berantibus quibuſdam nodu-
lis inæqualis eſt & quoquo
verſum ſerpit.

L O C U S.

In hortis ſponte naſcitur
circa ſepes. *



Con-

CONSOLIDA media, Herruscis, Morandola, seu vt alijs, *Consolida Mezzana*, fm
herba Laurentina. Germanis, Göllden Günsel.

CONSOLIDA MEDIA.

F O R M A.

Matth.

Folia profert minoris solidaginis, latiora, mollioraq; aduersa parte subpurpurea, caulem pedali longitudine, pilosum, quadrangulum, in-
anem : flores cæruleos, qui partim inter folia, quæ cau-
lem ambiant, partim in cacu-
mine spicata congerie pro-
deunt. Radix illi est multifi-
da, haud altè descendens.

L O C V S.


Idem.

Nascitur in hortis, & vi-
neis, alijsq; locis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Datur vtiliter foliorū suc-
cus ab alto deuolutis, item
ruptis confractisque, quin
etiam ad intestina vulnera, &
illinitur ad externa. sanguinis
grumos, vbicunque sint, dissoluit. folia in collutionibus addita faciunt ad oris,
& gingiuarum vlcera. Idem quoque præstant ad vlcera pudendorum vtriusq;
sexus.



CONSOLIDA minor, Prunella. Italis, *Consolida minore*. Germanis, Brunellen.

CONSOLIDA MINOR.

FORMA.

Caulibus exit quadrangu- *Matth.*
lis hirsutis, spithamæ longitu-
dine, folijs menthæ proximis,
sed subasperis. flores gerit in
ramusculorum fastigijs, spica-
tos, purpurascētes, & quan-
doq; candidos. Radicem mul-
tifidam, ac tenuem.

LOCVS.

Prouenit in montibus, col- *Idem.*
libus, & ferè vbique.

QUALITATES, ET
VIRÆ.

Additur in medicamentis, *Idem.*
quæ parantur ad linguæ, fau-
cium, & gutturis inflamma-
tiones, & vlcera. & in omni-
um morborum vsus venit, in
quorum affectibus præstat
solidago media, namque suas
vires illi conformes habet.

DENTA-



DENTARIA minor, siue Sannicula quinque folia. Italis, *Dentaria minor*.
Germanis, *San Kraut*.

DENTARIA MINOR.

F O R M A.

Matth.

Exit hæc folijs pentaphylli, sed longè maioribus: radice candida, tam miro naturæ ordine, nodulis, ac lacinijs quibusdam elaborata, ut non parùm admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur atque examinant.


L O C U S.

Idem.

Nascitur in montibus, syluosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.*Idem.*


Radix glutinat, cohibet, roborat. Eadem datur vtiliter poranda ad enterocellas, quotidie drachmæ pondere, ex vino austero diebus quadraginta continuis. præstat quoque ad interna vulnera, cum thoracis, tum etiam intestinorum, ex aqua equiseti eodem pondere sumpta.



DENTARIA maior, Græcis, ΑΨΥΛΛΟΝ, quodd sine folijs proueniat. Germanis, Döslat; Schuppenwurk.

DENTARIA MAIOR.

FORMA.



Germinat primo statim ve- *Matth.*
 re: caules profert dodranta-
 les, teneros, fragiles, succo-
 sos, orobanche quadamtenus
 æmulos. In quibus à medio ad
 summum flores excunt sub-
 purpurei, hirsutiq; , è quibus
 calyculi oriuntur, exiguo in-
 tus semine. Radice consistit al-
 bicante magna, succosa, fragi-
 li, compactili squamarum cõ-
 gerie, miro sanè naturæ artifi-
 cio, acerbo gustu ac subama-
 riulculo.

LOCVS.

Prouenit in opacis syluis, *Idem.*
 & alijs vmbrosis locis.

FACULTATES, ET
 VIRES.

Adstringit, refrigerat, & *Idem.*
 abstergit; deuorata verò sopor-
 em facit.

* Magnus vsus Aquæ destil-
 latæ in fluxibus & Epilepsia. *

Yy

AVRI-

AVRICVLARIS, siue Sannicula altera. Italis, *Orecchia de Orso*. Germ. *Wagelnickel*/Stublümlein.

AVRICVLARIS

FORMA.

Matth.

Folia fert plantaginis, sed carnosiora, sensim per ambitum sinuata subflavis circumquaq; oris: caulem edit, & flores primulae veris vocatae per omnia similes, odoris eximij: Radice nititur multifida, albi cante, Ellebori modo fibrata.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in altis, & saxosis montibus, inter ingētia saxa.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem.

Refrigerat, siccatur, glutinat, cohibet: Pota herba cum radicibus enterocellis vtiliter medetur: acetiam intrinsicis quibuscunq; vulneribus tum herba ipsa deuorata, tum in potionibus addita. Folia recentia vnà cum radice tusa, atq; supposita nō solum mensum abundantiam cohibent, sed vulnam mirum in modum concludunt.



HOLOSTE

HOLOSTIVM quorundam, siue Holestium, Græcis, Ολόστιον, & δολέστιον. Italis,
Holestia.

HOLOSTIVM.

FORMA.

Folia habet longa duarum vel triumvnciarum digiti, latitudine ferè digiti, incana, pilosa & astringentia. Radix ei longa, crassa nigricans, caules vnius palmi in quo flores & semina similia cornu cervi vel planragini.

LOCVS.

Nascitur in collibus prope Monspelium, secus vias.

QUALITATES.

Gal. 7. simpl. Suo Holotheo desiccandi vim, cum adstrictione tribuit.

VIREs.

Vfus eius ad rupta efficax est in vino pota. Nam & carnes coguntur, quæ cum ea confuerbuerint.

APPENDIX.

Non facimus Holestium hoc genuinum, sed notius pro minus noto autotis substituimus.



PILOSELLA, Italis, Pelosella. Germanis, Meusß Dhr. Gallis, Piloselle, seu Ortille de Rat.

PILOSELLA.

F O R M A.

Matth. Planta est humi decumbens, radiantibus circumquaq; folijs, oblongis, incanis, euidenter pilosis, cauciculos repentes mittit funiculi faciem referentes, hirsuta canitie obductos: flores aureos stipatos, qui maturescences in papposam lanuginem euolant. Radicibus nritur numerosis tenuibus, humi pertinaciter inhaerentibus. Lactem succum fundit amaro sapore.

L O C V S.

Idem. Nascitur extenuato, & arido solo, in collibus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Lacteus eius succus amaro est sapore, id quod extenuantis facultatis, atq; etiam abstergentis inditum præbet. Herba gustu est adstringenti, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur.

V I R E S.

Idem. Dysenterias, & vteri profluvia sistit: ex vino austero pota, vulnera tam intricata, quam extrinseca sanat: auxiliatur cæliacis, & biliosa vomentibus, quin etiam enterocellis, sanguinem reiicientibus, & omnibus in vniuersum fracturis. Additur vtiliter in vulnerarijs emplastris, & vnguentis. Foliorum succus non solum recentia vulnera sanat, sed etiam vulnera quoq; contumacia, & præteritum oris, & pudendorum.



*PILOSELLA maior, Italis *Pelofella maggiore*. Germanis, *Groß Meusbohr*.

PILOSELLA MAIOR.



FORMA.

Priori non est abſimilis ſed multo maior, erectiorq; nec tam canis folijs, quamquam ſatis hirsuta hæc ſint, & pilis obſita. Longitudine digitum ſuperant, cauliculi florem ſuſtinentes vltra dodrantem aſurgunt cæteri repunt vt in præcedente.

LOCVS.

Ad riuiulos in aggeribus herbosis naſci gaudet.

VIREs.

Valer ad dyſenterias, vulnera, ſanguinis vomitum, enterocelas. ſiue pota ſiue impoſita, extrinſecus. Eius aqua etiam vtiliter in doloribus mammillarum adhibetur. Et vt ſummatim dicam, eadem poteſt quæ prior.*

SCABIOSA, Italis, *Scabbiosa*. Germanis, *Apostemen Kraut*. Gallis, *Scabieuse*.

- SCABIOSA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maior
& Minor.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Primo statim exortu folia
profert oblonga, minimè la-
ciniata: ceterum, quæ his suc-
cedunt, plu maioris modo in-
cisa spectantur: quæ verò in
caule, & ramis sunt, longè mi-
nora, ac magis dissecta visun-
tur: capitula summis caulibus
profert in acutum desinen-
tia, compactili squamarum
ordine obducta, Cyani mo-
do, è quibus flores prodeunt
etiam similes, sed ex purpura
sabbrubentes. Radicem habet
pollicari crassitudine, & sæpe
maiorem brachiatamq;, sapo-
re subdulci, pastinacæ proxi-
mo.



L O C Y S.

Idem. Nasclitur inter fruges, & in
campis non cultis argillaceo solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem. - Excalfacit, extenuat, aperit, digerit, abstergit.

V I R E S.

Idem. Radix valet peculiari quadam dote mirificè ad lichenosos, etiam si morbus
à Gallica lue prouenerit, si eius decoctum morbofi bibant quotidie in quadra-
gesimum diem vsq;, sex vnciarum pondere. Idem præstat eiusdem radices pul-
uis quotidie drachmæ pondere ex sero haustus.

SCABIOSA MINOR, Græcis, *Ψάρα*. Italis, *Scabiosa minore*. Germanis, *Apostemen Kraut*.

SCABIOSA MINOR.

FORMA.

Folijis crescit inferioribus *Matth.* per ambitum denticulatis, humi accubantibus, subalbicantibus, oblongis, & subhirsutis. verum quæ in caule sunt, tenuiora, & magis diuisa spectantur. Caulem mittit tenuem, teretem, rectum, ramosum: flores cæruleos, stipatos, aut pallidos, è quibus capitula oriuntur colore subuiridi, speciosè obducta ocellis. Radix est illi palmaris, multifida, subcandicansq;.

LOCVS.

Nascitur in agris non cultis, secus itinera, & in colibus terrenis.

QUALITATES.

Sapore est amaro: quare ex *Idem.* calfacit, extenuat, abstergit, aperit, & crassa, lentaq; expectorat.

VIRES.

Herba ipsa in puluerem pota, aut succus ex melle delinctus, pectus, & pulmones abstergit, crassaq; ac glutinosa per os eijcit. Idem præstat eius decoctum potum. scabiem sanat. Id quod & succus facit in vnguentis additus. Folia cruda tontusa, & pestiferis carbunculis admoda, mirificè eorum perniciem coercent: Datur vtiliter earundem succus, quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ drachma pestilentia affectis, prima statim die, verum à portione ægros sudare oportet: & iterum, atq; iterum medicamentum repetere. Datur item contra serpentium venenosorum morsus, herba verò exeriùs imponitur. Illitus scabiosæ succus, cum chrysocolia, & caphuræ momento, lentigines, alphas, impetigines, & cæteras cutis infectiones abstergit, oculorumq; per se, & cum succo fœniculi, albugines delet.

CLYMENVM, Græcis, Κλύμερον. Italis, Climeno.

CLYMENVM.

FORMA.

Diosc. Caulem fert fabæ, quadratum, folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, vt in polyporum cirrhis.

LOCVS.

Matth. Nascitur incultis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Diosc. Succus è tota planta expressus efficax est ad sanguinis reiectiones, & ad cæliacos affectus, fœminarum profluvia cohibet: sanguinem è naribus erumpentem sistit: trita folia, aut siliquæ, recentibus vulneribus illitæ, ea ad cicatricem perducunt.

CENSURA.

Errant qui saponariam, vulgo dictam clymenum faciunt. cæterùm tametsi ego minimè compertum habeam, quæ nam planta legitimum sit clymenum, volui tamen hanc imaginem hic ostendere, vt de ea aliorum quoq; sit iudicium.



PERICLYMENVM, Græcis, Περικλόμενον. Italis, *Matrifelua, seu Vincibosco*. Germanis, *Geißblatt*. Hispanis, *Madresylua*, Gallis, *Vincibosse*.

PERICLYMENVM.

FORMA.

Simplex fruticat, ex inter-DIOSC.
nallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederaceaque: inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ hederæ similes: flos fabæ candidus, aliquantulum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, quod non facile euellatur, radice rotunda, crassa.

LOCVS.

Nascitur in aruis ac sepibus, Idem.
conuoluens se adminiculis propè emergentibus.

QUALITATES.

Tum fructus, tum folia Gal. li. 8.
tilia sunt, aded vehemèter insimp. me.
cidentis, simul & excalfacientis facultatis, vt si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam cieant: semen quoque desiccatur.

VIRES.

Maturum semen in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in vino quadragenis diebus, lienem absorbet, lassitudinem discutit, sed urinam ciet statim à sexto die cruentam: Orthopneæ, & singultui prodest, partum accelerat. Folia sunt iisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus pota, sterilitatem facere produntur. Eadem ex oleo peruncta, febrium algores abigunt. Folia & Matth.
earum succus, veniunt vtiliter in vnguenta, quæ ad capitis vulnera parantur, & ad vlcera quæ in cruribus eueniunt.

TRIBULVS, Græcis, Τριβύλλος. Italis, Tribolo. Arabibus, Hafsch. Germanis, Erdstetten/Burzelborn. Gallis, Saligotz terrestres.

T R I B U L V S.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum. Terrestris, & aquaticus.

F O R M A T E R R E S T R I S.

Idem. Folijs exit portulacæ proximis, tenuioribus tamen: viticulis longis, in terra stratis: spinis secundum folia, rigidis, præduris.

L O C U S.

Idem. Iuxta amnes, & rudera nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. In terrestri superat terreum
simp. me. frigidum, quod & adstringens fuerit. Fructus tenuis est parvum, quare calculos in renibus comminuit.

V I R E S.


Diosc. Drachma terrestris tribuli pota, illitave ictos à vipera recreat, contra ventena, cum vino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Cætera cum aquatico communia habet.



TRIBVLVS Aquaticus, Græcis, Τρίβλος ἁγρός. Italis, Tribolo aquatico. Germanis, Wassernuß. Hispanis, abroyos, seu Abrollos. Gallis, Castaignes d'Eau.

TRIBVLVS AQUATICVS.

F O R M A.



Folijs prouenit latis, subro *Matth.* tundis, crassis, & aduersa parte maculosis, nervosis, & per ambitum serratis, prælongis, & crassis pediculis nitētibz. Caulem edit crassum, pingue, sed in summitate longè vegetiorem. Fructum profert nigrum, castaneæ magnitudine, triplici armatū mucrone, putamine membranoso, alba inrus medulla, castaneæ sapore. Radix illi prælonga, comantibus spicatis capillamentis.

L O C V S.

Nascitur in fluminibus, la- *Idem.* cubus, & in mari.

Q U A L I T A T E S.

Ex humida essentia modicè *Galen. 7.* frigida, & sicca non mediocri- *simp. me.* ter, & ipsa frigida cōponitur.

V I R E S.

Inflammationes omnes cataplasmate iuuat: vlcera oris, gingiuas, tonsillasq; *Diosc.* persanat. Thraces Strimonæ amnis accolæ, eius pabulo equos sagināt, è fructu verò esculentum faciunt panem.

SAXIFRAGA, Græcis, Σαξίφραγος. Italis, Sassi fragia. Germanis, Steinbrech.
Gallis, Perce pierre.

SAXIFRAGA.

G E N E R A.

Math t. Plura, diuersa que reperiuntur genera, quorum nos quinque describemus.

F O R M A P R I M A.

Diosc. Frutex est furculosus, thymo similis.

L O C V S.

Idem. In petris, & asperis locis nascitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. In vino coctus, mox potus, febricitantibus opitulatur. Straguriz prodest, singultum sedat, calculos vesicæ frangit, & vrinam ciet.



SAXIFRA.

SAXIFRAGA secunda, Italis, *Saxifragia secunda*.

SAXIFRAGA SECUNDA.

FORMA.

Folia in cauliculis per inter- *Matth.*
ualla gerit parua, angusta, ac
lôgiuscula, cunilæ æmula, con-
comitâtibus alijs longè mino-
ribus, in cacumine tamen co-
piosiora sunt: & breuiorib. in-
teruallis distincta, flores edit in
summis caulibus purpureos,
odoris non iniucundi.

LOCVS.

Prouenit in saxis, & saxosis *Idem.*
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cit vrinam, calculos inre- *Idem.*
nibus frangit, & ei jcit, visum a-
cuit, si edatur.

*APPENDIX.

Cùm nondum visa mihi es-
set eiusmodi Saxifraga, qualem
autor hic depinxerat, malui

substituere hanc plantam, quæ *Satureia* durior nonnullis vocatur, quam igno-
tam effingere, præferrim cum deliniationi pulchrè conueniret. Prouenit enim
Monspelij non longè à Castelnèuf in montibus inter saxa: Folia habet multò
duriora, & minora, quàm cunila vel *satureia* satiuæ & à radice plurimos emittit
ramos tenues foliosos, spicam similem ferè hyssopo, in qua sunt flores albi, solo
colore differentes ab Autoris descriptione: tota plâta viridior est *Satureia*, nec
ita nigricans. Radix valde lignosa, & hortorum cultui faciliè assuescens, ac per
hyemem durans.*

SAXIFRAGIA tertia. Italis, *Saxifragia terza.*

SAXIFRAGIA TERTIA.

F O R M A.

Matth.

Folia mittit capillacea, fœniculizemula, sed longiora, tenuiora, rarioraq;: caulem pariter fœniculaceum, sed tenuē ac pumilum, umbellā in summitate, semine petrosilini vulgaris simile, sed longiusculo, & odorato. Radicem albicantem, pastinacæ sapore.


L O C U S.

Idem.

Nascitur in magnis faxis, & sicco ac extenuato solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Excalfacit, attenuat, aperit, prouocat, abstergit. Tota plāta subacris est, & subdulcis. Radix vrinam ciet, & menses quouis modo sumpta: visum acuit, & obstructions iccoris reserat.



SAXI-

SAXIFRAGIA quarta. Italis, *Sassifragia quarta*. Germanis, *Weisser Steimbrech*.

SAXIFRAGIA QVARTA.

F O R M A.



Folijs est terrestribus hædere, *Matth.* minoribus tamen, circumser-ratis, humi accubantibus. Cau-le tenui, rotundo, recto, pilo-so, dodratali, à quo rari oriun-tur ramuli, in quib. flores pan-duntur candidi, ocimoidis mo-do, è quibus nullum oritur se-men. Radix illi multifida, te-nuisque, in cuius fibris grana quædam rotunda, albicantia, ac subpurpurea coriandri se-minis magnitudine spectatur, quæ eius esse semen quidam affirmant. Mira sanè plantæ na-tura, quodd semen in radicibus gerat.

L O C V S.

Nascitur locis non cultis, *Idem.* sterili solo, ac pariter inter sa-xa.

Q V A L I T A T E S.

Grana, quæ radicibus hæ- *Idem.* rent, amara sunt. Ideo quæ excalfaciunt, attenuant, abstergunt, aperiunt.

V I R E S.

Herbæ & radicis decoctum ex albo meraco paratum, renum calculos fran- *Idem.* git & educit: vesicam mundat, & vrinam prouocat, efficacius tamè, si ex eodem decocto granorum radicum farina drachmæ pondere propinetur. Cæterum longè feliciter curatio succedit, si bibatur medicamentum, dum affecti balneo se fouent.

SAXIFRAGIA magna, Italis. *Sassifragia maggiore.*

F O R M A.

Marb.

Caule est lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, densisque furculis, ipsisq; tenuibus, stipato: folia fert exigua, oblonga, in acutum definentia, flosculos albos, & calyculos exiguos, ocimoidis modo, ore circumquaq; serrato, in coronæ modum, in quibus semen continetur rubrum admodum exiguum. Radix in petris adeo pertinaciter concluditur, ut inde auelli non possit, nisi mucronatis ferramentis.

L O C U S.

Idem.


Prouenit in saxis, & antiquis urbium mœnijs.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Mirificè tota plâta calculos comminuit & expellit.

SAXIFRAGIA MAGNA.



LIMO.

LIMONIVM, Græcis, Λιμόνιον. Italis, Limonio. Officinis, falso Behen rubrum.

LIMONIVM.



FORMA.

Folia habet betæ, tenuiora, Diosc. & longiora, decem, & sæpe plura, caulē tenuem rectum, seminibus rubris scatentem, adstringenti gustu. Radix est Matth. illi vegeta, rubraq;

LOCVS.

Nascitur in pratis, & palu- Diosc. stribus.

QUALITATES.

Semen utpote austerum au- Galen. 7. xiliatur, ubi adstrictione sit o- simp. me. pus.

VIREs.

Semen tritum, & ex vino a- Diosc. cetabuli mensura potum, dy- fentericos ac cœliacos iuuat: quin etiam rubra fœminarum profluvia sistit, & sanguinem expuentibus subuertit.

CENSURA.

Explodenda est seplasiariorum opinio, qui Limonij radicem, Behen rubri Galen. vice in medicamentis supponunt. Cæterum longè melius facerent, si bistortæ radice uterentur.

Non defunt rei plantariae
scriptores: qui plantam, cu-
ius hic imago spectatur, limo-
nium faciunt. De qua poterit
esse etiam aliorum iudicium.



PYROLA, *Italica*, *Pirola*. Germanis, Wintergrün.

PYROLA.

FORMA.

Folijis est pyri, minoribus *Matth.* tamen, ac perpetuo virescentibus, caule dodrantali, tenui, tereti, in quo per intervalla flores spectantur candidi, stela figura, capillamentis è medio emergentibus: Radix & illi subalbicans.

LOCVS.

Nascitur in montibus vni- *Idem.* brosis, & in sylvis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Desiccatur, adstringit, glutit- *Idem.* nat: Foliorum succus illitus recentia vulnera sanat. Idem præstant & folia. Eorundem quoque decoctum ex vino paratum, sanat porum intestina vulnera, quare additur commodissime vulnerarijs potionibus.

Zz 2

Lago-



L A G O P V S, siue pes Leporinus, Græcis, Λαγόπους. Italis, Lagopo, seu Pie di Lepre. Germ. Hasenpfötlin.

L A G O P V S.

F O R M A.

Diosc. Herbula est caule tenui, hirsuto, rotundo, ramoso, folijs trifolio proximis, sed minoribus. Paniculis in summitate villosis, & tractu mollibus, perinde ac leporini pedes.

Matth.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in campis inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Qualitatis est, exiccantis, **simp. me.** adeo, ut fluxus alui probe exiccet.

V I R E S.

Diosc. Ad alligatur tota planta in guinibus contra eorum inflammationes. Folia, & paniculae dantur vtiliter ex vino austero, aut ex succo punici mali contra dysenteriam. vniuersae plantae decoctum, additis maluae folijs è dulci vino paratum, datur commodè ad vesicae morbos, & vrinæ ardores: semen auxiliatur sanguinem reiicientibus. Peculiariter cinis illitus hæmorrhoidas fluentes sistit. Sunt qui paniculis vtantur ad extergendam dysentericorum sedem.

Matth.



CARYOPHYLLATA, *Italica, Garofanata.* Germanis, *Benedictenwurk.* Gallis, *Benoyste, Galliot, seu Resiſe.*

CARYOPHYLLATA.



G E N E R A.

Trium est Genesum, Cam-
pestris, palustris & Montana.

F O R M A C A M P E S T R I S.

Folia fundit subaspera, hir- *Matth.*
suta, tripartita: duobus etiam
longè minoribus auricularum
instar in posteriori parte adna-
tis, atq; omnibus per ambitum
laciniatis: caule est ramoso, ro-
tundo, haud crasso, sesquicu-
bitali, geniculato, subaspero-
que: florib⁹ aureis, pentaphyl-
li æmulis, villosis: succedenti-
bus inde capitulis, in quibus
semen continetur. Radicibus
nititur copiosis, tenuibus, sub
rufis, caryophyllorum odo-
rem spirantibus.

L O C U S.

Nascitur secus vias, propè *Idem.*
hortorum, & agrorum sepi-
menta, locis potius opacis,
quàm apricis.

Q U A L I T A T E S.

Radix, cuius est usus, excalfacit, & siccatur, aperit, & roborat.

Idem.

V I R E S.

Radices præstant ad sananda vulnera, & vlcera, & præsertim ad intrinseca vul- *Idem.*
nera, si in potionibus addantur. Earundem succus cum ærugine infusus, præstat
ad cuniculosa vlcera. Eadem olfactu & vitales spiritus recreant, & frigidum iu-
vant cerebrum. Earundem pulvis epotus, prodest celiacis, dysentericis, & san-
guinem expuentibus.

* CARYOPHYLLATA aquatica. Germanis, Wild Benedictwurk.

CARYOPHYLLATA AQUATICA.

F O R M A.

Folijs caule & nascendi figura similis est hæc plâta præcedenti Caryophyllatæ, ut vix dignosci queat. Verum discrepantiam facit radix dodrantalis, digiti crassitudine minus fibrosa, colore purpurascente, & sapore amariuscule sine manifesto odore. Deinde flores pallescentes, nonnihil purpurei habentes, qui nolæ effigiem repræsentant. Tandem semen pilosum grandius capitulum efformans, quam quod campestris Caryophyllata gignit, quod plerumque etiam calyci purpureo à flore decidente relicto insidet. Huius flores aliquando pluribus folijs insignes fiunt & rubent magis, ac folijs inferne quinque aut senis herbaceis pulcre coronantur.

L O C U S.

Nascitur in sylvis & pratis humectis, alijsque locis palustribus.*




CARYO-

CARYOPHYLLATA montana. Italis, *Garofanata saluatica.*

CARYOPHYLLATA MONTANA.

FORMA.



Folia gerit alterius crassiora, crispiora, hirsutiora q̃, plura ab vna radice prodeuntia, longisque pediculis inhærentia. tactu subaspera, & circumquaque laciniata, humique procumbentia. Caules tenuis, nullis adnatis ramis, in quibus pusilla, sed rara folia spectantur. In caulium summitatibus vnicus tantum flos emicat aureus, pentaphylli similis, sed maior paulo, qui flaccescens, pinnatum efficit orbem, non paruo naturæ opificio: Radice nititur dodrantali, digiti crassitudine, subrufa: caryophyllorum odore.

LOCVS.

Nascitur in Boemix mon- Idem.
tibus, è quibus Albis fluuius
oritur.

QUALITATES.

Radix non solum excalfacit, & siccat, sed etiam cohibet, ac roborat.

Idem.

VIREs.

Iisdem cum altera pollet viribus, sed præstantioribus.

Idem.

CORTUSA, *Italica*, *Cortusa*.

F O R M A.

Matth.

Folijs prouenit ferè vitigineis, sed longè minoribus, subrotundis, atq; subasperis, adstringenti quadantenus sapore, caules editi tenues, rectos, glabrosq; in quorum cacumine flores exeunt exterius purpurei, interius verò aurei, staminibus pariter aureis referti: Radices fundit numerosas, tenues: ac longas. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores gerat. sed prima frequentior habetur.

L O C V S.

Idem.

Nascitur locis vmbrosis, cretaceo, & albicante solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Tota planta dum recens est, gratissimo fragrat odore, mellei faui ferè simili, sed longè admodum graviori: in sicca verò odor euanescit: subtilem est partium, qua re exalfacit magis recens, quam sicca; primo tantum excessu.


V I R E S.

Idem.

Mulcet neruorum, & articulorum dolores; à quauis causa oriuntur. Ad hoc autem macerantur flores recentes in oleo dulcium amygdalarum, & rosaceo, quod completum vocant, diuq; insolantur. Oleum egelidum deinde illini præstat, repetitijs illitionibus.


M E D I -

C O R T U S A.



MEDIVM, Græcis, Μήδιον. Italis, Medio, nonnullis *Viola marianna*. German. *Glockenblum*.

M E D I V M.



F O R M A.

Folia habet intubi, caulem dioscor-
tricutibitalem, & in eo florem
grandem, purpureum, rotun-
dum, semine Cnici simile, mi-
nuto: Radicem dodrātalem:
crassitudine baculi, gustu a-
cerbo.

L o c u s.

In saxosis & opacis nasci-*Idem*.
tur.

Q U A L I T A T E S.

Medij radicem contra atq; *Gal. li. 7.*
semen ipsum temperatū esse *simp. me.*
contingit: nam illa quidē au-
stera est, & fluxiones cohibet,
cū alias, tum profluviū mu-
liebre. At semen tantū abest,
vt tale quid efficiat, vt etiam
mēses cieat, vt pote, quod te-
nuium partium, & incidentis
est facultatis.

V I R E S.

Radici farina, ex melle cocta, rubros sēminarum mēses cohibet, eclegma-*Idem*.
te per aliquot dies sumpto, sēmen verò in vino potum eisdem pellit.

A N N O T A T I O.

Medium folijs iridis provenire depravatus Dioscoridis Codex legit: At Ori-*Matth.*
basius, qui ab eo transcribit, non irides, sed seridis folijs ipsum provenire ait,
quod in suo Dioscoridis exemplari legerit, *seridis*, non autem, *iridis*, cui & nos ad-
stipulamur.

GLADIOLVS, Græcis, *Ξίφος*. Italis, *Gladiolo*. Senensibus, *Monacucie*. Mauritanis, *Kassfon*. Germanis, *Schwertel*. Gallis, *Glai*, *sive Glaitel*.

F O R M A.

Matth. Folia ei sunt iridis, breuiora tamen & angustiora, striata, & in mucronem definitia. Caulis cubitalis, leuis, succosus, in quo flores exeunt purpurei paribus spatijs vtrinq; distantes, Iridis emuli, sed longè minores: colore verò puniceo diluto, è quibus rotundum prouenit semen: Radicibus cohæret geminis, bulbosis, rotundis, pressis verticillari specie, altera, alteri insidente. Hæ capillaceo conteguntur involucrio, subrufoq;ue.

L O C U S.

Idem. Nascitur in aruis, & inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 3. Radix quæ superior est, attractiua, hentem, digerentem, & exiccantem facultatem habet.

V I R E S.

Diosc. Superior radix cum thure illita, admisto vino, spicula, & aculeos è corpore eximit: panos cum Lolij farina, & hydromelite discutit: menses supposita trahit. Eadem ex vino pota venerem stimulat. Contrà verò inferior, quippe quæ sterilitatem faciat. Datur superior vtiliter cum aqua potanda ad puerorum enterocellâs.

A N N O T A T I O.


Tametsi scripserit Dioscorides superiorem gladioli radicem inferiorem magnitudine superare, plerumque tamen contrarium visitur.

* GLADIO-



*GLADIOLVS Indicus quibusdam vocata planta, vel Canna Indica.

GLADIOLVS INDICVS.



F O R M A.

Folia ei sunt pulcra, lata, venosa, in mucronem collecta, in inferna sui parte caulem ambiētia. Caulis in multam altitudinem attollitur, laevis, arundinaceus, in quo flores exeunt pulchrè rubentes, Gladioli ferè florib. similes, aut cancrorum forpiculas quodammodo referentes, è quibus rotundum, nigrumque prouenit semen. Radicibus nititur multis, nodosis, in capita rotunda proruberantibus.

L o c u s.

Nascitur in riguis, & apud nos hortulanorum diligentia eget, vt in fictilibus hic me rectè afferuerur.*

SPARGA-

SPARGANIVM, Græcis, Σπαργάνιον. Italis, Sparganio. Mauritanis, Sagarberamon.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet gladioli, sed artiora, & in terrâ magis procumbentia, in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen.

L O C V S.

Matth. Nascitur ad montium radices, humecto solo, & circa scrobes.

F A C U L T A T E S.

Gal. li. 8. Eripsum desiccantis est farsimp. me. cultatis.


V I R E S.

DIOSC. Datur radix ex vino contra serpentium venena.

C E N S V R A.

Quâquam ferè omnes, qui de materia medica scripserunt, hanc plantam sparganium faciunt, nos tamen non parum dubitamus, an rectè senserint, quum hæc folia gladioli latiora gerat, non angustiora, sursum spectantia, non humi procumbentia.


SPARGANIVM.



XYRIS,

XYRIS, Græcis, *Ξυρίς*. Italis, & vulgo, *Spatola fetida*. Germanis, *Wandscup*,
frant. Hispanis, *Lirio spadanal*. Gallis, *Glaicyl*.

X Y R I S.



F O R M A.

Folia habet Iridis latiora, Diosc.
& in cacumine mucronata, è
quorum medio caulis erum-
pit satis crassus, cubitalis, ex
quo siliquæ triangulares de-
pendet, in quibus purpureus
flos, & in medio-puniceus, se-
mé in folliculis simile fabis,
rotundum, rubrum, acre. Ra-
dix longa, geniculata, rufa.

L o c y s.

Nascitur in aquosis, & hu- Matth.
mectis locis.

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est parrium, at- Gal. li. 7.
tractorix, digerendi, ac nimi- simp. me.
rum etiâ desiccandi est facul-
tatis, cum radix, rum multò
etiâ magis eius fructus.

V I R E S.

Valer ad capitis vulnera,
fractaq; efficax est: aculeos, &
spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radi-
cis centaurij, & mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto
medetur. Radix bibitur ex passo ad consuulsa, rupta, coxendicum dolores: stran-
gurias, & alui profluvia: semen tribus obolis potum, vrinam vehementer im-
pellit, & cum aceto lienem absumit.

ANCHUSA, Græcis, ἀγγυσα. Italis, Anchusa. Germanis, Rot Dähsenjungem. Hispanis, Sagem. Gallis, Orchanette.

ANCHUSA.

GENERA.

Diosc. Trium est generū, magnitudine, & exilitate foliorum, & caulium differentium.

FORMA PRIMÆ.

Idem. Folia habet lactucæ, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoque versum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis, quæ estate pronenit, & manus inficit sanguineo colore.

LOCVS.

Diosc. Nasctur læto solo, & locis
Matth. incultis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Radicem habet admodum
simp. me. refrigerantē, & desiccantem, tum adstringentem, & submaram, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergendis humoribus, corporibusque condensandis. Folia radice quidem sunt imbecilliora, cæterum adstringunt & ipsa, & desiccant.

VIRES.

Diosc. Radix adstringit: ex oleo, & cera, efficax est ad ambusta, & vetera ulcera. Medetur igni sacro, cum polenta illita. Illinitur quoque ex aceto, lepris, & vitiliginibus: partus supposita extrahit. Datur eius decoctum vtiliter potandum calculosis, lienosis, & bile suffusis, & si febris sit ex aqua mulsa. Folia ex vino potalum sistunt.



ANCHUSA altera, Garcis, *Zyzyra interea*. Italis, *Anchusa secunda*.

ANCHUSA ALTERA.

FORMA.

Minoribus hæc exit folijs, Diosc.
quàm prima, similiter ramem
asperis: ramulis exilibus, in
quibus flos purpureus in pa-
nicem vergens conspicitur.
Radices habet rubras, præ-
longas, quæ mellebus sangui-
neum succum fundunt.

L O C U S.

In sabulosis nascitur.

Idem.


Q U A L I T A T E S.

Calidior altera est, & ma- *Galen. 6.*
gis medicata: nam plusculum *simp. me.*
habet & gustu ipso protinus
acrimoniæ.

V I R E S.

Vires folijs, radicibusq; in- *Diosc.*
sunt, quæ, contra virus, cum
reliquorum serpentium, tum
maximè viperarum auxilien-
tur, siue cibo, siue potu, siue

alligatu, illinitive: nam si quispiam mandens, in serpentis os inspuat, eum ne-
cabit.



ANCHVSA tertia, Græcis, ἀγκυσα τρίτη. Italis, Anchusa terza.

ANCHVSA TERTIA.

FORMA.

Diosc. Est & hæc alteri non dissimilis, sed puniceo, ac minori semine.

LOCVS.

Matth. Nascitur arido, ac sabuloso solo.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Parua hæc, etiam altera, ca-
simp. me. lidior est, quæ & amarior, &
magis etiam medicata.

VIRES.

Diosc. Commanducatum semen,
si in serpētis fauces expuatur,
eum interficiet. Radix aceta-
buli mensura, cum hysopo,
& nasturtio pota, latas vētris
rinæas excutit.



ECHIUM.

ECHIVM, Græcis, Εχίον. Italis, Echio, & Buglossa saluatica. Germanis, Wild
 Ochsenjung. Hispanis, Yerua della biuora. Gallis, Buglossa sauvage.

E C H I V M.

F O R M A.



Folia habet prælonga, aspe- DIOSC.
 ra, aliquantum tenuia, an-
 chusæ proxima, minora ta-
 men, subrubra, & pingua,
 spinulis tenuibus horridula:
 cauliculos exiles, numero-
 sos, minutaque utroque la-
 tere folia, expansa pinnata-
 que, nigra, in summo caule
 proportionem minora. Flores
 secundum folia purpureos,
 in quibus semina capiti vipe-
 rarum similia insunt. Radix
 nigricat digito tenuior.

L O C V S.

Nascitur secus itinera, in Matth.
 agrorum marginibus, & sic-
 co, inculto, & exoluto solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Radix non modo percus- DIOSC.
 sis à serpente ex vino pro-
 dest, sed eos, qui antea biberint feriri non patitur. Idem præstant munus,
 folia, & semen. Lumborum dolores sedat in vino, aut sorbitione sumpta.
 Lac extrahit.

F O R M A.

Echium aliud albis floribus
præcedenti simile, sed multo
maius & asperius fere, rectum
in alas valde deuaricatum.

L O C V S.

Hic ipsi cum priori commu-
nis est, sed ob raritatem in
hortos transferi solet.*




O C I M O I-

OCIMOIDES, siue Ocimastrum, Græcis, *Οκμοιδες*. Italis, *Basilico saluatico*, siue *Ocimoide*. Hispanis, *Alba haqua montefina*. Gallis, *Basilic sauage*. Germanis, *Je lenger je freundlicher/ Eiedweich*.

O C I M O I D E S.

F O R M A.



Folijs exit ferè satino Oci- DIOSC.
mo similibus, ramulis hirsu- Matth.
tis, quadrangulis, cubitali
longitudine, in quorum sum-
mo flores emicant candidi, &
nonnunquam purpurei, è qui-
bus calyces erumpunt hyo-
scyami figura, capaci ventre,
arctis faucibus per ambitum
denticulatis, in quibus semen
includitur nigrum, melantherio
ferè simile.

L O C U S.

Nascitur passim inter sege- Matth.
tes, propè septa, & agrorum
marginibus.

Q U A L I T A T E S.


Radix superuacanea est: at *Gal. 8.*
semen tenuium partium, & *simp. me.*
desiccantis citra mordacita-
tem facultatis est.

V I R E S.

Semen in vino potum, tum viperarum, tum cæterarum morfibus medetur.
Datur Ischiadicis cum vino, melle, myrrha, & pipere.

F O R M A.

Habetur quædam varietas in floribus Ocimoidis, qui pulchrè foliorum fœtura insigni exornantur. Herba ipsa nihil differt ab altera, quæ simplici florum natura constat, cuius appinimus ramulum proferentem rubros flores, vt posset animaduerti quid hi ab alijs, qui candidi sunt, differrent.*



GRAMEN,

GRAMEN, Græcis, *ἄραβις*. Arabibus, *Vagem*, *Negen*, seu *Nagien*. Thelkel, & *Negil*. Italis, *Gramigna*. Hispanis, *Grana*. Gallis, *Den de chien*. Germanis, *Graaf*.

G R A M E N.



G E N E R A.

Complura graminis visum- *Matth.*
tur Genera, de quorum non-
nullis dicitur.

F O R M A P R I M I.

Geniculatis serpit ramulis, *Diosc.*
à quibus radices sparguntur
dulces, articulis præcinctas.
Folia acuminata, dura, & vt
arundinis parua lata, eaq; iu-
menta, & boues pascunt.

L O C V S.

Prouenit in campis, & in- *Matth.*
cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Radix mediocriter frigida *Gal. 6.*
est, & sicca, mordacitatem *simp. me.*
quandam exigua, & parti-
um tenuitatem obtinens: her-
baverò primo quidem exces-
su refrigerat: in humiditate,
& siccitate moderata. Semen

imbecillum est. Radix esculenta est viridis. Dulcis enim est, instar aquæ, sed
ære quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem.

V I R E S.

Trita radix illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus me- *Diosc.*
detur, atq; vrinæ difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa commi-
nit. Idem porum interaneorum vermes necat. *Matth.*

GRAMEN manna, Italis, Sanguinella, siue herba Capriola. Germanis, Summtate / Schwaden.

GRAMEN MANNA.

F O R M A.

Matth.

Folijs, ac radicibus exit alterius tenuioribus: caule geniculato, prælongo, spicis numerosis in cacumine referro, ipfisq; sensim aculeatis, aded. vr. naribus indita, manuque agitata, sanguinem eliciant. Semen ijs inest minutum albicans, panico longè minus, orizæ fe. è sapore, quod à Germanis estur in pingui iure decoctum, quod per quàm bellè placeat. Quare hoc semen Mannam appellant.



L O C U S.

Idem.

Seritur in Germania, & diligenter colitur in cāpis: quin etiam sponte per se nascitur in incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Semen orizæ qualitates habet, quare mediocriter ventrem adstringit.

V I R E S.

Semen ex pingui iure decoctum, & illitum mammarum durities resolvit. In cibis mediocriter alit.

C E N S U R A.

Errant profectò qui hanc plantam coronopum faciunt.

*GRAMEN

* GRAMEN floridum, Græcè ἀγρὸς λευκάνθεμος. Germanis, Augentrost
Graf.*

GRAMEN ALTERVM.

Est & Alterum, quod floridum appellari potest, folijs & caulibus cæteris similibus: floribus in summitatibus stellarum instar radiantibus, candidisque: Radice tenui minime geniculata.



GRAMEN Parnasi, vulgo vnifolium. Græcis, *ἑνὸς ἰνὴ παρνασσῶ*. Italis, *Gramigna de Parnaso*. Germanis, *Einblat*.

GRAMEN PARNASI.

F O R M A.

Diosc. Densius hoc fruticat, folijs hæderaceis, flore odorato, candido, femine paruo, non inutili: radicibus quinis, aut fenis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus.

L O C U S.


Idem. Prouenit in monte Parnaso.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Semen desiccatorium, tenuium
fimp. me. partium, & subacervum est.

V I R E S.

Diosc. Succus cum pari melle, & myrrhæ dimidio decoctum, adiectis piperis, & thuris tertijs portionibus, probatissimum erit oculorum medicamentum: præsertim si in æneapyxide recondatur. Decoctum radicis idem, quod herba præstat. Semen vehementius urinam impellit, aluum vomitioneque sistit.



GRAMEN

GRAMEN aculeatum, Italis, *Gramigna spinosa*. Græcis, ἀγρὸς ἀκροτάτης.

GRAMEN ACULEATVM.



FORMA.

Folia, caules, radices primi Matth. graminis modo profert. In caulibus tamen singulis è folijs, aculei peculiariter exeūt, triplici apice constantes, ac suis nixi pediculis, tribulorū terrestrium instar.

LOCVS.

Prouenit inter rudera, & idem. in muris verustate collapsis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vires easdem habet, qui- Idem. bus pollet primam graminis genus.

SIDERITIS, Græcis, Σιδερίτις. Arabibus, Sidrichū. Italis, Siderite. German.
Wasserandorn.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluiz accedentia, minora tamen, & aspera. caules edit quadratos, dodrātales, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantum substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebræ, utin marrubio spectantur, & semen in eis nigrum.

L O C V S.

Idem. Nascitur in petrosis locis.


Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 3. Habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida, paucula verò inest adstringitio, quare phlegmonem sedat, & glutinat.

V I R E S.

DIOSC. Illita folia, suapte vi vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

S I D E R I T I S.



A N N O T A T I O.

Cum hæc planta humectis, ut plurimum, nascatur locis, non ausim eandem affirmare, legitimam esse primi generis sideritis, & si cæteræ correspondent notæ. Quo factum est ut sequentem deinde legitimam crediderim, esse primi generis sideritim.

SIDERITIS vulgaris. Germanis, Zeisigtraut.

SIDERITIS. VVLGARIS.

F O R M A.

Exit hæc caule quadrato, dodrantali, aut maiori, ramofoque, folijs marrubio lōgiōribus, ad ſaluia faciem accedentibus, crispis, albicantibus, ſapore haud ingrato: floribus verticillatim in caule ſummo prodeuntibus colore pallescente.

L O C V S.

Nascitur aridis locis.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Eadē illi ſunt vires, quas primo ſideritis generi tribuit Dioſcorides, & Galenus.



VIRGA aurea. Italis, *Virga aurea*, quibusdam herba Indica, siue Pagana. Germanis, Heydnisch Wundkraut.

VIRGA AVREA.

FORMA.

Matth.

Caulem edit bicubitalem, subrufum, lævem: folia oliuz latiora, circum minutissime serrata, flores in caulium fastigijs aureos, ac spicatos, qui flavescentes in pappos diffiliunt.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in collibus, in agrorum marginibus, & vineis.

QUALITATES.

Idem.

Subamara est, absterforiz facultatis, ac glutinatoriz.

VIRES.

Idem.

Additur vtiliter tota planta in vulnerum intrinsecorū potionibus: vulnera quæcunque glutinat: calculos comminuit, & vrinam ciet. Pota aut infusa alui fluxiones cohibet: eius decocto sanantur foris vlcera.



* VIRGA

*VIRGA AVREA folijs non serratis.

F O R M A.

Folia habet minora & sine
crenis vel saltem minus con-
spicuis, reliqua non differunt
à priore.

L O C U S.

Nascitur in opacis & ne-
morosis saltibus.*



ACHIL-

ACHILLEA, Græcis, Ἀχιλλεύς. Arabibus, *Sicbritis*, seu *Egilos*. Succus vero *Damalo chorten*. Italis, *Achillea*. Germ. *Grosse Garben* / *Schaffrip*.

ACHILLEA.

FORMA.

DIOSC. Scapos gerit dodrantes, aut maiores, fusorum effigie, minutulis folijs circūdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, Coriandri similitudine, subflauo colore, lentis, odore non insuauī, verū medicato, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit lato solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Viribus est Sideritis non simp. me. dissimilibus, cæterū adstrictione exuperat. quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebri profluvium conuenit.



VIRES.

DIOSC. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & exvellere subdita, cruenta vuluæ profluvia: bibitur ad dysenteriam vniuersæ plantæ decoctum, in quo etiam insident fœminæ yteri profluvio laborantes.

RVBVS, Græcis, Βάτος. Mauritanis, Buleich, seu Haleich. Italis, Rono. Germ. Bramen. Hisp. Carza. Gallis, Ronce. Fructus, Latinis, Mora Rubi. Græcis, Βάτρυς βατρία. Italis, More di Rono. Germanis, Brambeer & Kraßbeer.

R V B V S.

G E N E R A.

Plura rubi reperiuntur gene Theoph. ra, aliud.n.exit arboris instar. lib.3.de Aliud sepibus fruticisq; im-plan.hiff. plicatur. Aliud humi serpit, radiciturq; graminis modo. Aliud denique alijs modis in montibus, & sylvis vagatur. Cæterum nobis duorum tantum generum meminisse sat fuerit, nèpe vulgaris, & Idei.

F O R M A.

Qui passim in sepib. & fru- Matth. tetis nascitur, virgas edit quadrangulas subrubentes obsequiosas, aduncis vbiq; aculeis refertas. E ramulis pediculi exeunt aculeati, è quibus terna prodeunt folia fragariæ herbæ æmula, sed aspera, & in acutū desinentia, dorso auersa parte aculeato. Flores profert racemosos, albicantes, è quibus mora oriuntur. Radix illi est graminis modo repens.

L O C V S.

Nascitur in sepibus, dumetis, fruticisque. Idem.


Q U A L I T A T E S.

Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, ea- Galen. 6. que non obscura. Atqui folia recentè nata plurimum in se habent substantiæ simp. me. aquæ, parum verò adstrictionis, eadem ratione, & germina. Fructus immaturus acerbus est, & valdè exiccatorius: maturus verò non parum habet calidi temperati. Flos viribus est immaturi fructus. Radix cum adstrictione tenuium est partium, quare renum calculos comminuit.

V I R E S.

Ramorum decoctū potum, aluum stringit, & sceminarū profluvia: capillos nro sc. tingit, folia comanducata gingiuis, & oris vitij medetur. Serpentina vlcera cohibent, & quæ in capite manant. Illinuntur quoq; condylomatis, & hæmorrhoidibus. Eadem tria cardiacis, & stomachi doloribus vtiliter admoventur. Flores ex vino poti aluum sistunt.

RVBVS.



RUBVS IDÆVS, Græcis, *Βάρος ιδάα*. Italis, *Rauomontano*. German. *Himbeer*
vel *Hoolbeer*; Item, *Bocksbeer*.

RUBVS IDÆVS.

FORMA.

Matth.

Est altero longè clementior. Folia pfertlatiora, mollioraq; , virgas rotundas, fragiles, spinis nullis, aut omnino raris. Flores albos, alterius æmulos. Fructus rubi mora per omnia referunt: cæterùm differunt quod hi teneriores, mollioresq; habeantur: sapore, cum dulcedine quadam insipida, adstringente, non tamen iniucundo, rubicundo colore. * Nonnunquam flavescente vel penitus albo. * Tridentina rura, hæc mora vocant Ampomele, & fragorum vice ijs vescuntur.

LOCVS.

Idem.

Prouenit copiosus in montibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

PROSC. Eadem præstat, quæ supradictus. Illinitur flos cum melle oculorum collectionibus. Ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.



HELIXINE

HELXINE cissampelos, Græcis, Ελξίνη νισοδάμπελος. Italis, Vilucchio minore.
Arabibus, Acsin. Germanis, Mittel Winde. Hispanis, Campanelayerua.

HELXINE CISSAMPELOS.



FORMA.

Folijs est hederæ minori- DIOS.
bus, ramulis exilibus, longis, Matth.
quibus completitur quod-
cunque contigerit adminicu-
lum. Flores edit albos, lævi
tamen purpura perfusos, ca-
lathi figura, è quibus semen
oritur nigrum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, vineis, idem.
ac segetibus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem ha- Galen. 6.
bet. simp. me.

VIRES.

Foliorum succus potus al- DIOSC.
uum deijcit.

ELATINE, Græcis, *Elatyn*. Arabibus, *Athin*. Italis, *Elatina*.

E L A T I N E.

F O R M A.

Diosc. Folia habet Helxine similia, minora tamen, rotundiora, pilosa, tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis, senisive, à radice, foliosis, gustu adstringentibus.

L O C V S.

Idem. Nascitur in segetibus, & cultis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Modicè tum refrigerat, tum simp. me. adstringit.


V I R E S.

Diosc. Oculorum fluxionibus, inflammationibusque auxiliantur folia cum polenta trita. Eadem cocta, torbitionis usu, dysenteriam sistunt.



NUMVLARIA, siue Lunaria minor. Italis, *Lunaria minore*. Germ. *Egeltraut/*
Pfenningtraut.

NUMVLARIA.



F O R M A.

Serpit hæc humi, iuncea *Matth.*
cauliculis, cubito longiori-
bus, in quibus à radice ad sum-
mum, breuibus interstitijs y-
trinque folia exeunt, crassius-
cula, rotunda paruorum num-
morum instar, vnde illi no-
men: flores fert aureos, ac
speciosos.

L O C U S.

Nascitur in scrobium ri- *Idem.*
pis. & vlginis aggeribus se-
cus vias.

Q U A L I T A T E S.

Glutinandi, cohibendique *Idem.*
facultate prædita est.

V I R E S.

Herba ipsa illita, recentia *Idem.*
vulnera glutinat. Idem præstat eorum succus. Præcipua autem vis eius est, ad
puerorum enterocellas, cum illita, tum in puluerem hausta.

EUPATORIUM, Græcis, *Ευπατόριον*. Officinis, & Italis, *Agrimonia*. Arabib.
Cafat, Cifit, seu Gaser. Germ. *Odermeng*. Hisp. *Agramonia*. Gallis, *Agremoine*.

F O R M A.

E U P A T O R I U M.

Diosc. Fruticosa est herba, vnicum
 efferens caulem, lignosum, ni-
 gricantem, rectum, tenuem,
 hirsutum, cubitalem, inter-
 dum ampliorem, folijs per in-
 terualla quinquemfolijs, aut cā-
 nabis similibus, quinque par-
 tito, aut amplius diuisis, nigri-
 cantibus, & per ambitum ser-
 ratis. Semen medio caule e-
 rumpit, pilosum, deorsum
 spectans, quod siccatum ve-
 stibus inhæret. Flores gerit
 spicatos, aureos, radicem li-
 gnosam, subrubram penta-
 phylli modo.

Matth.

L O C U S.

Idem. Nascurt secus sepes, itine-
 raque, in agrorum margini-
 bus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Tenuium est partium, in-
 cidendi, extergendiq; faculta-
 tem, citra manifestam calidi-
 tatem obtinet, quo circa ob-
 struções hepatis expurgat:
 inest ei & adstrictio modica,
 propter quam robur visceri additur.

simp. me.



V I R E S.

Diosc. Folia contrita & cum suillo adipe imposita, vlceribus cōtumacibus meden-
 tur. Herba, aut semē in vino potum, dysenteria, tecinorijs vitijs, & serpentum
 ictibus liberat. Iocinorosos iuuat decoctum potum. Idem ex vino albo para-
 rum, cum saccharo sex vnciarum pondere tribus diebus potum, mirificè stran-
 guriā sanat, & vrinās impellit. Additur herba in potionibus, quæ ad intrin-
 seca parantur vulnera.

Matth.

EUPATORIUM vulgare, Officinis, *Eupatorium Auicenna.* Italis, *Eupatorio.* Germanis, *Königskraut*.

EUPATORIUM VVLGARE.



F O R M A.

Caulem edit tricubitalem, *Marth.* subrubrum, rotundum, folia cannabis, sed maiora, albicantia, hirsuta, amaro gustu, odore medicato, non insuaui. Flores exeunt in summitatibus, in umbellis subpurpurascens, qui flaccescens in pappos abeunt. Radix multifida illi est, sed superuacua.

L O C U S.

Nascitur vliginosis locis, & *Idem.* in scrobium aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, siccit, abstergit, *Idem.* incidit, aperit, & subtilium est partium.

V I R E S.

Præstat foliorum decoctum *Idem.* iocinoris doloribus, ac cæteris eiusdem affectibus ab obstructione prouenientibus: quin etiam lienis tumoribus, & obstructionibus. Datur idem diutina febre laborantibus.

Vrinas & menses pellit, scabiem, & pruritum sanat, præsertim cum sumaria, & caprino sero, sed succus fortior est. Is itaque potus incipienti elephantia medetur. Flores illiti vulnera recentia, & vlcera sanant: succus drachmarum duarum pondere in catapotijs sumptus, intestinorum vermes necat: Dantur folia vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelosis equis.

POTENTILLA, quibusdam Anserina. Italis, *Potentilla*. Germanis, *Gensberg*
ſue Grentſing. Gallis, *Agrimoine ſauvage*.

P O T E N T I L L A

F O R M A.

Matth. Folijs exit agrimoniz proximis, hirsutioribus, prona parte virentibus, ſupina verò albicantibus. cauliculos fundit humi repentes, è quibus aurei prodeunt flores: Radice conſtat exterius ſubrufa, interius verò candicans, aſte ro guſtu, & adſtringenti.

L O C V S.

Idem. Naſcitur humecto ſolo.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Refrigerat, ſiccatur, adſtringit, repellit, roborat.

V I R E S.

Idem. Fœminarum profluvia, & dysenterias cohibet, ac cæteras alui fluxiones. Datur vtiliter ſanguinè reiſcientibus. Herbz decoctum ex vino pararum, præſtat potum ad inteſtinorum tormina, & dorſi dolores. ſiccæ farina ex ſua ipſius aqua ſtillatitia pota, albas vteri fluxiones cohibet, ſed valentius, addito corallio, & ebore. Datur ad enterocellas, & bubonocellas. vulnera recentia, & oris, pudendorumque vlcera ſanat: ex aceto decocta. colluitur vtiliter ad commotos dentes: & laxas gingiuas, dentiumque dolores mulcet, & prolapſam columnellam reſtituit, addito aluminis momento.



QUINQUEFOLIUM, Græcis, Πεντάφυλλον. Italis, Cinquefoglio. Germanis, Fünffingkraut. Hispanis, Cinco entama. Gallis, Quintefueille.

QUINQUEFOLIUM.

GENERA.

Plura quinquefolij extant Matth. genera, colore, ac magnitudine differentia.

FORMA PRIMI.

Ramulos fert festucarum DIOSC. similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semen: folia menthæ, quina singulis pediculis, in ambitu serrata: floré ex candido pallescentem, auræ æmulum, subrubram habet radicem, oblongamq; nigro veratro crassiorē.

LOCVS.

Nascitur in riguis & aqua. Idem. rijs ductibus.

QUALITATES.

Radix vehementer desicc. Galen. 8. cat: nimirum verò acris est, & simp. ms. cum sit tenuium partium citra morsum desiccatur. Radix enim desiccatur ordine quodāmodo tertio, minimum habens evidētis caliditatis.

VIRES.

Radicum decoctum, collu DIOSC.

tionē, dentium dolores sedat, & vlceraputrida sistit, arteriæ scabritias gargari-
zatu laeuigat. Dysenterias, & cæteras alui fluxiones cohibet, quin etiam articu-
lorum coxendicumque cruciatus potu tollit. Coctæ in aceto, & illitæ, serpen-
tia vlcera reprimunt. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones
discutiunt. Ignes sacros, & condylomata sanant. Teneræ radice succus, ioci-
noris, & pulmonum vitijs medetur. pollet etiam aduersus venena: folia trice-
mis diebus pota, comitiales iuuant. Eorundem succus tribus cyathis diebus ali-
quot potus, celerrimè regio morbo medetur. Ex melle, saleque illita, vulneri-
bus, & fistulis auxiliatur. Medetur etiam enterocellis. Tota planta, & potu, &
illitu, sanguinem manantem sistit.

F O R M A.


Folia minora profert, angustiora & magis laciniata, incana tota; cauliculos erectos, in quibus flores lutei alterius similes sed minores. Radix rubra nigricat, & alte descendit sapore ceu glandium astringente.

L O C V S.

Nascitur in aggeribus, & secus arua, macro solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem illa quæ priori.*



QVINQUEFOLIUM

QUINQUEFOLIUM album, Græcis, Πεντάφυλλον λεύκον. Italis, Cinquefoglia
bianco. Germanis, Weiß Fünffingertraut.

QUINQUEFOLIUM ALBUM.

L I N N E U S

F O R M A.

Folij est incanis, hirsutis, *Matth.*
per ambitum sensim denticu-
latis, quinis ex vno quo-
que pediculo dependenti-
bus cauliculis mollibus, ob-
sequiosisque, flore candido,
radice squamosa, agnatis ex
obliquo prodeuntibus.

L O C U S.

Nascitur in saxis ingenti- *Idem.*
bus, & saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Adstringit, siccatur, robo- *Idem.*
rat, repellit: Radix subtili-
um est parrium.

V I R E S.

Ea omnia præstare potest *Idem.*
quæ alterum, quo tamen ad-
stringentior est.

Bbb s * QVIN-

B E T A T I A

* Radix cineræ, cinis, cinis, cinis


V. 100

* *QUINQUEFOLIUM* palustre fragiferum, vel *Heptaphyllum porphyranthemum*. Germanis, *Gensftraut* / *Sibenfingertraut*.

QUINQUEFOLIUM
PALUSTRE.

FORMA.

Oblongis quasi sarmentis se propagat serpitque per vliginem, angulos nonnihil & striatis nigris, in quibus ramuli nascuntur & folia pentaphylli quina interdum sed ut plurimum septena, subtus cinericia, superiore parte virentia, Floret per æstatem: flosculus cõponitur ex quinque aut sex folijs atrorubentibus, & paruo capitulo medium obtinente, cinctoque staminibus purpureis. Hoc subinde increfcit augeturque donec magnitudinẽ fragi feræ attingat, cui & figura & colore simile fit, nullo intus succo. Radicibus nititur longis, tenuibus, nigricantibus & in geniculis fibratis.



LOCVS.

Nascitur vliginosis, putridis & macris pratis.

QUALITATES.

Astringit tota herba, præsertim fructus. *

DIAPENSIA, siue Sannicula. Italis, Cinquesfoglio maggiore. Germanis, Sannicel.

D I A P E N S I A.

F O R M A.

Folia profert quinquefo- *Matth.*
lij maiora, vitiginea specie,
cauliculis rotundis, gracilibus,
obsequiosis, in quorum
summitate, & adnatorum fastigijs capitula prodeunt sub-
albida, fragorum figura: Ra-
dicibus constat numerosis,
gracilibusque.

L O C V S.

Nascitur in montibus, & *Idem.*
fylvosis collibus.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerat, & siccatur, cohi- *Idem.*
bet, reprimat, glutinat, &
roborat.

V I R E S.

Vniuersæ plantæ deco- *Idem.*
ctum, datur potandum ad in-
rinsca vulnera sananda, fistulas, & enterocellas. Idem quoque præstat fo-
liorum, & radicum farina.

* SANNICV-



* *SANICULA alpina*, siue guttata quibusdam. *Italica*, *Vmbilicus Veneris*. *Septentrionalium* alijs, *Hepatica montana*. *Valesijs*, *L'herba Sante Condria*, vel *Sans-Coutura*. *Germanis*, *Wilde Schelkraut* / oder *weiß Sanickel*.

SANICULA ALPINA.

F O R M A.

Elegans est planta, floribus albis, qui guttulis asperguntur sanguineis, figura quodammodo *Hyperici* floribus correspondentes, cui & semen simile est, caulis hæc sustinet sesquipedalis, cui folia subsunt hederacea, rotunda, crenato ambitu, prona parte candidiora utraque hirsuta nonnihil exiguis pilis candidis, qui tamen cultura penè evanescent. radix interdum minimi digiti longitudinem æquat, crassiuscula, subrufo colore.

L O C U S.

Crescit copiose in monte Iura & monte Mola, locis umbratis & humidioribus. Reperitur etiam in montanis Pannoniæ.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Astringit & ferè insipida est. Ex parte prona folij cutem decorticant, & sic vulneribus illud imponunt. Eliciunt aquam è planta minutim concisa ad glutinanda vulnera, aut in pulvres redigunt flores, itemq; folia & ulceribus vulneribusq; inspergunt.*



FRAGARIA, Italis, *Fragolaria*: Fragaverò, Italis, *Fragole*, & *Fraghe*. Germanis, Erdbeer. * *Fragaria sylvestris* vel montana. Germanis, *Bergerds beer*. *

F R A G A R I A.

F O R M A.



Planta est humi repens, fo- *Matth.* lijs pentaphylli maioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, & per ambitum serratis: floribus candidis, rubi æmulis, è quibus fraga oriuntur: cauliculos habet tenues, hirsutos, obsequiososque: radices habet numerosas, & tenues adstringentis gustus. * *Sylvestrior* exigua est herbula, & strigosior: tota, fructu minore & minus lapido rubro. *

L O C V S.

Proueniunt in montibus, *Idem.* collibus, syluis, secus itinera, & prope sepes.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerat excessu primo, *Idem.* & siccatur secundo.

V I R E S.

Folia, & radix vulnera, & vlcera sanant, muliebres fluxiones, & dysente- *Idem.* rias cohibent. vrinam cient, & lieni conferunt. Eorundem decoctum potum præstat ad iocinoris inflammationes, & ad renum vesicæq; sordes. *Idem* in ore contentum gingiuas roborat, commotos dentes stabilir, & destillationes sistit: At fraga, præter id quod æstare deuorata maximè placent, biliosis, æstuantibusque ventriculis præsunt, siticulosisque opem ferunt. Vinum quod ex eis elicitur, vlcusculis faciei mirificè medetur, illirum, quin & varos, & oculorum fluxiones calidas impositum tollit.

* F R A G A

FORMA.

Priori similis herba sed minor & magis cana, hos fructus profert, qui colore solo à præcedentis Fragariæ fructu differunt.

LOCVS.

Rarior est quam superior, & propterea ad hortorum cultus expetitur. Nec dubium est, alicubi sponte nasci & iisdem locis gaudere quibus vulgatio. *



EVFRA-

EVFRAGIA, Italis, *Eufragia*. Germanis, *Augentrost*. Gallis, *Eufraise*.

E V F R A G I A.

F O R M A.

Tenuis est planta ad spitham *Matth.*
 mæ altitudinem assurgens,
 folijs minutis, crispis, & per
 ambitum crenatis, gustu ad-
 stringentibus, & subamaris.
 caule tenui, rubentique: flo-
 re inter purpuram, & aurum
 albicante, quem mittit in fi-
 ne ætatis.

L O C U S.

Nascitur in pratis, & in syl-
 uis.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit parum, siccatur
 magis, abstergit, & cohibet.

V I R E S.

Præstat tam in cibis, quam
 in medicamentis sumpta,
 cum recens, tum sicca, ad omnia oculorum impedimenta, & præsertim cum
 in cibis, aut potu sumitur diutius. Vinum ex ea paratum idem præstat po-
 tum. Eius enim usu senum oculi reuiuiscunt. visus mirificè acuitur. & cæcu-
 tientes ad lucem redeunt, & præcipuè in pinguibus, & pituitosis corporibus,
 hæc omnia præstat.

PHOENIX,



PHOENIX, Græcis, *Φοινίξ*. Quibusdam lolium murinum: Italis, *Gioglio saluatico*. Germanis, *Daubentweiß*/Meußtorn. Gallis, *Turage sauvage*.

P H O E N I X.

F O R M A.


Diosc. Folia habet hordei sed breviora, & angustiora, spicam lolio similem, calamus fenum digitorum, radici adnolutos, septenas, octonasve spica.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in aruis, tectis,
Matth. recenter illitis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.


Ex vino austero pota alui profluuium, & mensium abundantiam sistit: vrinae impetus cohibet, in puniceo vellere adalligata: collo suspensa (vt aiunt) sanguinem manantem sistit.



RHODIA

RHODIA radix, Græcis, Ροδία ρίζα. Italis, Radice rodia. Germanis, Rosen-
wurk.

RHODIA RADIX.



F O R M A.

Caules mittit teretes, cu- *Marth.*
bitales, folijs vbiq; stipatos,
longiusculis, in acutum defi-
nentibus, portulacæ, seu mi-
noris sedi instar pinguibus,
minutim per ambitum serrat-
is. Umbella in cacumine vi-
ridi tithymali cyparissæ mo-
do. Radix ei inæqualis, stru-
mosa, crassa, laui cortice ob-
ducta, splendescens. Substan-
tia intus subrufa, rosarum o-
dore. Radix est omnium vi-
uacissima. Siccis enim locis
mensibus pluribus asseruata,
& deinde sata, statim repulu-
lat.

L O C U S.

Nascitur in altissimorum *Idem.*
montium rupibus, saxosis, ac
præruptis locis.

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est partium, & *Gale. 8.*
discurientis facultatis, in ca- *simp. me.*
lesaciendo verò, secundi re-
cessus censenda est, aut certè
tertij incipientis.

V I R E S.

Vtilissima est, capitis doloribus, si madefacta fronti ac temporibus, cum ro- *Diosc.*
saci momento imponatur. Vbi aut dolor à calida prouenerit causa, tusa, & *Marth.*
rosacea aqua madefacta imponi debet. vbi verò à frigida, ex amaraci aqua illini
præstabit.

EQUISETVM, Græcis, ἵππουρος. Arabibus, Dhenben alcait, Dhemb alchi, siue Deneb alchail. Italis, Coda di Cauallo. Officinis, Cauda equina. Germ. Rosschwanz. Hispanis, Goda de mula, siue Rabo de mula. Gallis, Queue de Cheual, siue Pèla.

EQUISETVM.**GENERA.***Matth.*

Aliquot nobis sunt genera.

FORMA PRIMI.

Profert cum primum è terra erumpit quoddam tenerimum germen oblongum, iuglandium iulo non absimile, subnigricanti colore. & deinde caules inanes, geniculati, subrubefcentes, leniter scabri, iuncea circa eos coma, aspera, exilis, setarum instar. adeo ut equorum instar caudæ appareat. Radicem lignosam, duram.

Locvs.*Idem.*


Nascitur aquosis, & humidis locis, in riguis, & scrobibus.

QUALITATES.*Gale. 6. Simp. me.*

Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde valenter simulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera maxima imposita conglutinat, etiam si præfectos nervos esse contingat.

V I R E S.*Diosc.*

Herbæ succus sanguinem è naribus erumpentem sistit: prodest dysentericis ex vino perus: urinam ciet. Trita folia, & illita sanguinolenta vulnera glutinât. Radix cum sua herba ruffim, orthopneam, ruptaq; adiuvat. Folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ, & intestinorum, enterocellâsq; in vnum coalescere, cogique ferunt.

EQUISE-

EQUISETVM alterum, Græcis, *ἰσχυρὸς ἐρέα*. Italis, *Coda di Cavallo minore*.

EQUISETVM SECVNDVM.



FORMA.

Caulis est rectus, cubito *DIOS* maior, inanis: comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus.

LOCVS.

Prouenit humectis locis, *Matth.* & viginosis pratis.

QUALITATES ET VIRE.

• Valet ad omnia, ad quæ *DIOSC.* nus alterum.

Ccc 2

EQUI-

EQUISETVM tertium, Græcis, *ἰσσοπέδι τρίτον*. Italis, *Coda di Cavallo*.

EQUISETVM TERTIVM.

FORMA.

Matth. Caulem edit geniculatum, striatumque, inanem, fragilem, à quo complures oriuntur rami. Et ipsi quoque geniculati, ac asperi, nulla circumstante coma.

LOCVS.

Idem. Prouenit & hoc palustri solo.

VIREs.


Idem. Iisdem cum alijs pollet viribus.



COCCVM

Coccum infectorium, Græcis, *Kermes Sapaîn*. Arabibus, *Charmens*, seu *Kermes*. Italis, *Grana da tingere*. Germanis, *Scharlachbeer*. Hispanis, *Grana per atennir*, seu *grana in grano*. Gallis, *Vermillon*.

C O C C U M I N F E C T O R I U M.



F O R M A

Frutex est furculosus, folijs *Matth.* oblongis per ambitum aculeatis aquifolij modo, sed longè minoribus, baccis rotundis, inanibus, puniceo colore.

L O C U S.

Gignitur in Galatia, Armenia, Asia, Cilicia, Hispania. *Matth.* Nascitur etiam in Cilicia è quercu. Quin etiam in Polonia, & Boemia, è quercubus legitur.

F A C U L T A T E S.

Adstringentem, simulque *Gale. 7.* amarâ facultatem possidet: *simp. me.* utraq; sine morfu deliccet.

V I R E S.

Vulneribus neruisq; prædioscis conuenienter ex aceto *Matth.*

tritum illinitur. Baccarum puluere feliciter vtuntur Italæ mulieres ad sætum roborandum, & abortum prohibendum ipsam ex ovo sorbili prægnantibus propinantes, addito thuris, aut masticeis momento.

C E N S U R A.

Non rectè sentiunt, qui *Coccum infectorium*, & *Chermesinum* idem faciunt.

*COCCIFERA ILEX, a. flosseparatus, b. ramus cum coccis.

COCCIFERA ILEX.

F O R M A.


Præterea habentur nonnulla in ea notatu digna. Primum maximæ glandes, maiores quam aliarum Ilicum, cuius cupulæ etiam asperiores, proueniunt in autumno. Postremo quædam genera excrementorum, si ita liceat vocare. Vnum quod ante alia prouenit, Mense Aprili & Maio, grana sunt in folijs rubra, partim rotunda, partim oblonga, ex ipsa ferè substantia foliorum facta, pisorum paruiorum magnitudine, quarum substantia intus alba est, non dissimilis multum à substantia fructuum oxyacanthæ, græte gustu; non-nihil velut acidi habentes, in quibus tandem nascitur vermiculus, suntque talia excre-scentiæ huius arboris paruæ, vt Gallæ in Quercu. Est secundum excrementum, rotundum, nigrum, exterius pellucens, satis durum, intus liquorem album habens cum vermibus, quod tandem inarescit,



vt plurimum, sic ramis copiose adhærescit satis leuiter. Circa eas baccas, vt sic dixerim, sæpe formicæ copiosæ conglomerauntur. Hoc etiam excrementum reperitur in maiore ilice, prouenit mense Maio. Huic simile in omnibus coccum tinctorium quod eodem tempore prouenit. In hoc differt, quod grana siue baccæ sint rubræ, si saltem abstergantur puluis albus, quo asperguntur, liquore item rubeo, scatentq; vermibus rubris, vnde Gallicè Vermillon. Prætereanon solet prouenire nisi in minore ilice, nec tanta copia, vt alia excrementa.*

PIMPINELLA, seu saxifragia hircina, Italis, *Sassifragia di becco*. Germanis, *Bibernel*.

PIMPINELLA SAXIFRAGIA.



G E N E R A.

Duo eius habentur genera, *Matth. Maius & minus*.

F O R M A.

Maior radice nititur longa, *Idem*. folijs, quæ ad radicem sunt, humi accubantibus, pluribus ex vno pediculo vtrinque emergentibus, & per ambitum serratis: caule quadrangulo, floribus in umbella candidis Radix illi longa digitali crassitudine, hircum quadratenus redolens, acri sapore.

L O C U S.

Nascitur in montibus, col- *Idem*. libus, & pratis non vliginosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix, in qua vis tora con- *Idem*. sistit, excalfacit, siccatque; ordine secundo complero, aut tertio incipiente, aperit, provocat, attenuat, digerit, incidi t

V I R E S.


Vtriusque radix præstat ad renum, & vesicæ incommoda: calculos enim in *Idem*. renibus genitos frangit, & eijcit: urinas pellit. succus radicis ex meraco haustus, præstat contra deleteria medicamenta, & virulentorum animalium ictus. Quare non desunt, qui radices etiam contra pestilentiam miris laudibus effertant.

FORMA.

Minor cognomento facile suam à maiore differentiam ostendit, radice tenuiore simplici prolizaque vermem imitatur. Folijs caulē floribus & colore præcedenti similis est, & magnitudine tantum ab illa vincitur, interdum etiam costæ rubescunt & cauliculi. semen paruum. Ammi refert. Huius varietas observatur alicubi in folijs quę minutissime laciniantur, ut Carifolia, ut rudioribus facile imponant, ne pro pimpinella hanc agnoscere possint, Flosculi quoque nonnunquam prius rubescunt.

LOCVS.

Locis arenosis exit, & montosis, ac rimis petrarum innasci gaudet.



QUALITATES.

Acrior est & valentior maiore, id quod sapor manifestus arguit.*

PIMPINELLA Sauguisorba. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorbastrella*. Germanis, *Hergotts Wärtlin*. Gallis, *Pimpinelle*.

PIMPINELLA SANGVISORBA.

G E N E R A.

Duum est generum: Maius, *Marth.* & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Folijis provenit ab vna ra- *Idem.* dice numerosis, compluribus ab vno tenui pediculo utrinque prodeuntibus, subrotundis, pusillis, ubique in ambitu crenatis, firmis, humi in orbem accubantibus, adstringenti gustu: cauliculos edit plures, tenues, subrubentes, rotundos dodrantales, atque maiores, in quorum summitatibus capitula exeunt squarola, subpuniceo colore. in quibus semen. Radice nititur lignosa tubrutescente, adstringentis gustus.

L O C V S.


Nascitur in agris non cul- *Idem.* tis, in collibus, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Degustata adstringit, sed mansa lentoris copiam fundit, glutinat, siccat; re- *Idem.* soluit & cohibet.

V I R E S.

Sistit pota rubra, albaq; foeminarum profluvia, dysenteriam, & ceteras alui *Idem.* fluxiones: biliosas vomitiones cohibet, sanguinis reiectiones sistit: vulnera, & ulcera sanat: vnguentis quoque vtiliter miscetur; quæ tum ad capitis vulnera, tum ad carcinomata parantur. Natar sæpe in poculis vino repletis, quoddam gratiam quandam, iucunditatemq; potantibus afferat.



Matth. PIMPINELLA, seu Sanguisorba maior. Ital. *Pimpinella*, seu *Sorbastrella* maggiore.

SANGVISORBA, SEV PIMPINELLA MAIOR.

F O R M A.


Idem. Facie ab altera non differt, nisi quod maior sit omnibus suis partibus, & folia longiora, latioraque proferat: caules proceriores, & capitula crassiora, oblongioraque.

L O C U S.

Idem. Prouenit in pratis, pascuis, & inculto solo.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Viribus iisdem prædita est, quibus & minor.



TRAGVN.

TRAGVM, Græcis, Τράγος ἡ γούρως. Italis, Trago.

TRAGVM.

FORMA.

Planta est dodrantalis, aut diosc.
amplior, fruticosa, humilis,
oblonga sine folijs, puillis
circaramos acinis, rufis, mul-
tis, tritici magnitudine, acuto
cacumine, gustu admodum
adstringente.

LOCVS.

Nascitur maximè in mari- *Idem.*
timis.

FACULTATES, ET VIRE.

Baccæ gustu sunt admodum *Idem.*
adstringenti. Racemorū bac-
cæ decem, ex vino potæ, cæ-
liacis, & fœminis fluxione
vulvæ laborantibus auxilian-
tur.

LYNCVS.



IYNCVS, Græcis, *Σχοινος*. Italis, *Giunco*. Germanis, *Vinken/Schmelen*. Hispanis, *Iunco*. Gallis, *Ionc*.

IYNCVS.

G E N E R A.


DIOSC. Duum est generum, Alterum læue, Alterum acutum; cuius etiam duo extant genera, vnum sterile, alterum fertile: Est & alterum *δαρδαίνος* vocatum, seu *Æthiopicum*.

F O R M A.

DIOSC. Caulis est læuis, viridis, in
Matth. cacumine aculeatus, alba in-
rus medulla: Semen gerit in
superiore caulis parte, è latere
prodiens racemosum, subru-
brum, adstringentis gustus.
Alter consimilis est, sed sine
semine prouenit. & tenuiori-
bus calamis.

L O C V S.

Matth. Nascuntur omnia genera
cum in mari, tum in flumini-
bus, lacubus, paludibus, ac cæ-
teris aquosis locis.



Q U A L I T A T E S.


Gal. lib. 2. Composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia, leuiter frigi-
sim. me. da, & aquea, leuiter calida, vt & inferna desiccare possint, & sensum frigidum ad
caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

V I R E S.

DIOSC. Semen tostum ex vino potum, aluum sistit, & rubra fœminarum profusiva:
vrinam ciet, capitis dolores facit: Quæ proxima sunt radici folia tenera, con-
uenienter illinuntur aduersus Phalangiorum morsus. Semen potum som-
num conciliat.

IUNCVS floridus. Italis, Giunco florido.

IUNCVS FLORIDVS.



FORMA.

Folijs exit ab vno cespite *Matth.*
 numerosis cyperi similibus,
 sursum spectantibus, cauli-
 bus pluribus, laevibus, iunci
 modo glabris, in quorum ca-
 cumine flores emicant spe-
 ciosi, subpurpurei, è quibus
 semen gignitur.

LOCVS.

Prouenit in fluuiorum li- *Idem.*
 toribus.

QUALITATES, ET
 VIRES.

Creditur ea omnia præsta- *Idem.*
 re posse, quæ cætera præstant
 genera.

LICHEN,

LICHEN, Gæcis, *Aschyn*. Officinis, *Epatica*. Arabibus, *ArZeZallacher*. Italis, *Lichene seu Epatica*. Germanis, *Stein Lebertraut*. Hispanis, *Epatica seu Figadella*. Gallis, *Epatique seu Porcorau*.

LICHEN.

FORMA.

Matth. Folijs est latis, robustis, asperis, nullis adnexis pediculis in cacumine tripartitis, asperginosis lapidibus pertinaciter inhaerentibus, radicibus numerosis perquam exiguis aduersa foliorum parte emergentibus: floribus paruis, stellarum figura.


LOCVS.

Idem. Prouenit in asperginosis saxis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Diosc. Adstringit, refrigerat, abstergit: illita folia languinis profluvia sistunt: inflammationes arcent. Impetigini medetur, Iuuant regio morbo laborantes, cum melle

Matth. illita oris, & linguae defluxiones inhihent. Præfertur maximè hæc planta ad iocinorosos affectus.



PULMONARIA, Italis, *Pulmonaria*. Germanis, *Lungenkraut*. Gallis, *Herbe aux
pulmons*.

PULMONARIA.

G E N E R A.

Duo eius habentur genera, *Marb.*
Arboreum alterum, Alterum
terrestre.

F O R M A A R B O R E Æ.

Similis est Licheni, sed ma- *Idem.*
iora, latioraque fundit folia,
varijs modis per ambitum la-
ciniata, ac si à vermibus erosa
fuerint, arefcentia, prona par-
te viridia, supina verò palle-
fcentia, ac subalbicantibus
maculis respersa.

L O C U S.

Provenit in densis, opacisq; *Idem.*
sylvis, in annosarum arborum
caudicibus.

Q U A L I T A T E S.

Adstringit, siccatur, abstergit: *Idem.*
vulnera glutinat.

V I R E S.


Præstat, (vt scribunt) ad tabem, pectoris, & pulmonis vlcera, & cruenta spu- *Idem.*
ta, quin etiam ad vulnera, & pudendorum vlcera, & ad vtrunq; muliebri pro-
fluvium, dysenteriam, & biliosos vomitus: Sunt qui ea vrantur ad suspiriosos,
& asthmaticos, cum dulcis radice succo, hyssopo, helenio, & scillino oxymeli-
te: Datur quoq; vtiliter à pastoribus ruffientibus pecudibus, cum sale.

PVLMONARIA altera, Italis, *Polmonaria*. Germanis, *Lungenkraut* / *Stechkraut* /
klein Walsurtz. Gallis, *Herne aux pulmons*.

PVLMONARIA ALTERA.

FORMA.

Matth. Folij affurgit borraginis
quadantenus æmulis, non
tamen crispis, nec hispidis,
oblongis, asperis, hirsutis,
albis maculis superna parte
resperfis, * aut non maculo-
fis, * borraginis sapore: cau-
lem gerit angulosum, atque
tenerum: in cuius adnato-
rum cacuminibus flores e-
rumpunt, * quandoq; pur-
purei, quandoque cærulei *
cynoglossi vulgaris modo.
* Semen in folliculis plerun-
que vnum aut alterum inue-
nitur, maturitate nigrescens,
Echij semini pene simile &
æquale. Radice nritur fusca
multis fibris terræ inhæren-
te. *



Locvs.

Idem.

Nascitur opacis locis, pro-
pe vlginosas sepes.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit: Præfertur ad pulmonis cum vlcera,
tum cæteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones: Datur totius plantæ de-
coctum ad suprascripta, magno auxilio, cum saccharo pluribus diebus: Idem
cum maiori quoque successu præstat foliorum succus potus.

PARONYCHIA, Ruta muraria, Græcis, Παρωνυχία. Italis, Paronicchia. Germanis, Mauertrauten.

PARONYCHIA.

FORMA.

Exiguus est frutex, in petris nascens, peplō similis, minor longitudine, sed maioribus folijs.

LOCVS.

Nascitur in petris.

Idem.

QUALITATES.


Vis eius est tenuium parti-um, & exiccatoria, morfu vacans. Talia enim sint oportet, quæ paronychia sanant: excalfacit ordine tertio. & siccat pariter.

VIRES.

Illita paronychijs, atque fa-uis, remedio est.

APPENDIX.

Quamquam non desint, qui hanc plantam vnâ mecum paronychiam faciunt, quum tamen sint, qui reclamatione dissentio vltius protrahatur, non Dioscoridis, sed nostram paronychiam eam esse volumus. Scimus enim non solum paronychijs ipsam mederi, sed ad ciendas vrinas, & renum calculos frangendos pellendosq; præstantissimam esse.



PARONYCHIA altera.

PARONYCHIA ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folia profert pepli, longiora, flores paruos, copiosos, racematim coherentes. albo colore. sed qui paronychiam florere scribat hactenus non legimus: quin etiã mihi incompertum est, an in saxis oriatur. Quo fit vt ne hanc quoq; legitimam paronychiam facere auisim.



HELICHRYSVM, Græcis, *Ελικορρυς*, Italis, *Helicriso*.

HELICHRYSVM.



FORMA.

Ramulum habet candi. Diosc.
dum, virentem, rectum, fir-
mum, folia, intercedentibus
spatijs, angusta, abrotano si-
milia, comam aureæ lucis in
orbem: umbella rotunda ve-
luti siccis corymbis depen-
dentibus: radice tenui.

LOCVS.

Nascitur in asperis, & tor- *idem*.
rentium locis.

QUALITATES.

Facultatis est incidentis, & Gal. 6.
extenuantis. *simp. me.*

V I R E S.

Coma ex vino pota, men- Diosc.
ses ciet: auxiliatur quoq; ser-
pentium ictibus, coxendi-
cum doloribus, & vrinæ stil-
licidijs. sanguinem in ventri-
culo, aut vesica concretum

absumit, destillationes sistit, cum mulso à ieiunis pota triobolari pondere: ve-
stibus interposita, eas à tineis tuetur.

Helichrysum Italicū hanc
plantā appellare libuit, quod
plurimum in Italia proueni-
at, & ijsdem sit facultatibus
præditum, quibus & præce-
dens.



HELL-

HELICHRYSVM creticum. Italis, *Helichriso di Candida*.

HELICHRYSVM CRETICVM.

FORMA.

Planta est exilis, folijs longis, angustis, hirsutis, striatisq; caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, diuulsaq; radice tenui, ac superuacua.

LOCVS.

Nascitur in Creta Insula. *Idem.*

FACULTATES, ET
VIRES.

Ea omnia hoc quoque, quæ *Idem.* supra scripta prestare posseditur.

* APPENDIX.

Hæc planta melius quadrat ad Dioscoridis descriptionem quam prior, nec in Creta solum sed etiam in Hispania & alibi nascitur.*



STOECHAS citrina. Italis, *Amaranto giallo*. Germanis, *Reinblumen* / *Stängling*
Mattenkraut.

STOECHAS CITRINA.

FORMA.

Matth.

Folia profert albicantia, hirsuta, longa, caules dodrantales, aut maiores, lanuginosos, incanos, in quorum summitatibus flores sunt aurei, globosi, odorati, in umbellæ diuisæ modum se se pendentes. Radice breui subnigricante.

LOCVS.

Idem.

Nascitur locis incultis, & in pascuis.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccit, aperit, & abstergit, vt amariusculus indicat sapor, nec adstringenti facultate vacat.

VIRE.

Idem.

Decocta coma, aut ex vino macerata, iocinoris obstructions aperit, proinde datur commodè eius decoctum, dilutùmve, regio morbo affectis. Idem potum interancorum vermes necat.

* Comas grandiores habentem breuiusculam plantam ex Creta missam accepi, cuius hic appinxi particulam.*



AMARANTHVS, Græcis, *Αμάρανθος*. Italis, *Amaranto*, seu *fior velluto*. Germanis, *Sammar Blum*. Gallis, *Passe velours*.

AMARANTHVS.

FORMA.

Folia profert ocimi, maior, Matth. ra, caulem crassum, pinguem subrubentem, striatum: florem spicatum, admodum purpureum; qui etsi quàm diu siccatus asservetur, haud quàm tamen colorem perdit.

*LOCVS.

Elegantia studio in hortis scriitur.*

QUALITATES.

Refrigerat, siccatur, repellit, Idem. cohibet.

VIRE.

Flores potus coeliacos, & dysentericos iuuat, mensium abundantiam sistit, & albos vteri fluxiones. prodest quoque sanguinem excreantibus.

* Commendatur etiam ad vlcera sanie manantia.*



YOUNG

Ddd 4

*AMA-

* AMARANTVS cristatus; Germanis, *Danen Rami*.

AMARANTVS CRISTATVS.

FORMA.

Venustior est hæc amaranthi varietas, vt separatim pingi mereatur. Panniculas habet in fastigio latiores & quasi compressas hilari florum purpuranitidas; vegetas, vt cristas imitentur; iucundissimo spectaculo. Folia, vt in priore, ocymo non absimilia sunt, aut folano, longiora tamen, & maculis plerumque rubris variegata. Semen atrorubens pusillum splendidum in nostris regionibus maturescit nisi pluuiosa cōstitutione anni corrumpatur.

L O C V S.

Rarior est & maiorem ob id gratiam in horris consequitur.*



CHRY-

CHRYSANthemVM, Græcis, Κριόανθεμον. Italis, *Chrysanthemo*. Germanis, Goldblum.

CHRYSANthemVM.



FORMA.

Herba est tenera, fruticosa, Diosc. laeues proferens caules, & multifida folia: flores luteos admodum splendentes.

LOCVS.

Propter oppida nascitur. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Flores cū cerato triti, stea- *Idem.* tomata discutere produntur. Ictericos breui ad bonum colorem restituunt, si sequente longo balnei vsu, post exitum ebibantur, caules manduntur olerum modo.

Ddd. 5

*CHRY-

*CHRYSANTHEMON minus. Germanis, Klein Goldblum.

CHRYSANTHEMON MINVS.

FORMA.

Minutioribus prouenit folijs, nec tam altè attollitur vt præcedens, quæ humanam altitudinem nonnunquam æquat, vel etiam superat. Semper est amarissimum, in flore & folijs nulla est aut minima amaritudo.

LOCVS.

In hortis satum facillè prouenit, forte etiam sponte alicubi nascitur.*



AGERA-

AGERATVM, Græcis, *ἀγέρων*. Officinis, *Eupatorium Mesue*. Italis, *herba Giulia*. Germanis, *Strembd Lebertraut*.

AGERATVM.



FORMA.

Fruticosa est herba, binū Diosc. dodrantū longitudinæ assurgens, simplex, humilis, organo maximè similis: umbellā gerit, in qua flos bullis aureis similis, helichryso minor: nomen ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, *Matth.* & in pascuis, * & in hortis plāta viget.*

QUALITATES.

Digerit, & inflānationes *Galen. 6.* quodammodo resoluit. *simp. me.*

VIRES.

Vis decocti fernēs, herbæ Diosc. vltz nidor vrinam ciet, & vul *Matth.* uæ duritias emollit. *Florum Mesue.* dilutū ex albo meraco paratū,

puerorum vermes necat duarū vnciarum pondere potum. Excalfacit ordine primo, & siccāt secundo. Bilem, & pituitam faciliè purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinem prohibet: resoluit sine attractione, obstructions reserat, & earum affectus sanat, diuturnis febribus mirificè medetur.

Adstringit, quare ventriculū, iecur, & cætera viscera roborat: cum sero lactis efficacius purgat.

CENSURA.

Medicam materiā non assequuntur, qui negant *Eupatorium Mesue* non esse *Dioscoridis Ageratum*.

*AGERA-

Varietas deprehenditur in Agerato. Nam quod sponte nascitur in Hetruria, multò minus est, nec adolefcit tantopere, vt hortense nostrum, quod & surgit altius & folia habet magis crenata, vt Cristagalli. Obseruatur etiã quedam Agerati species, quæ candidas prorsus umbellas gerit, sed rarior est cæteris.*



VERBE-

VERBENACA, Græcis, Πικραγέδων, ἢ ἰσὰ βοτάνη. Latinis, *Verbenaca supina*. Italis, *Verminacola*, *Berben*, & *Berbenaca*. Germanis, *Eisenkraut*. Gal. *Veruaine masse*.

VERBENACA.

FORMA.



Ramulos emittit cubitales Diosc. aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia exeunt quercus, sed minora, & angustiora, eiusdem in ambitu diuisuris, colore aliquatenus cæsis. Radix lōga, tenuis. Flores purpurei, graciles.

Locvs.

Nascitur secus vias in ciuitatibus, & oppidis, & in plateis. Matth.

QUALITATES.

Vim habet adeò desiccantem, vt vulnera glutinet. Gal. li. 8. Insigniter est amara: quare exal facit, & siccat, abstergit, aperit. simp. me. Matth.

VIREs.

Folia cū radice in vino potant, illitæve, serpentium ictibus auxiliantur. Folia bibuntur cōmodè ex vino vetere quadragenis diebus ad icteritiam: veteres tumores & inflammationes mitigant: sordida vlcera purgāt: tota in vino decocta, conssillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet: Datur potandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circumdantibus: quartanis quartum. Sacram vocāt herbam, quoniam multum ad amulera, expiationesque commendetur. Diosc.

HYACINTHVS, Græcis, *ἵακινθος*. Italis, *Hiacintha*. Germanis, *Merkensblumen*. Hispanis, *Maïos flores*. Gallis, *Vaccæ*.

HYACINTHVS.

G E N E R A.

* Aliquot genera habentur, è quibus sequentia depingi curauimus, nimirum vulgare hyacinthum, & peregrinos tres.*

F O R M A V U L G A R I S.


DIOSC. Folia habet bulbi: caulē dorantalem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruamque radicem quoque bulbaceam.

L O C V S.

Matth. Nascurur in campatribus,
• ferè vbique inter segetes.

Q U A L I T A T E S.


Gal. li. 3. Bulbosa radix exiccat ordine primo, & refrigerat secūdo completo, aut tertio incipiente: semen leuiter extergit, & adstringit. Exiccat autem quadantenus ordine tertio. Cæterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis.



V I R E S.

DIOSC. Pota radix aluum sistit, & vrinas propellit: phalagiorum moribus medetur. Semē adstringentius est, theriacis expetitur, cum vino potum ictericos iuuat.

*HYACINTHVS TRIPOLITANVS.



Flore pulcherrimo, phalan-
gij florem representante, cę-
rulei coloris prouenit, caule
gracili, folijs admodum an-
guistis. Radix illi bulbosa non
magna.*

HYACIN-

HYACINTHVS orientalis, Italis, *Hiacinto orientale*.

F O R M A.

Matth.

Folijs exit lilij, minoribus, angustiorib⁹, sursum spectantibus, pinguioribus, & in acutum desinentibus: caule crasso, in quo flores exeunt cærulei, lilij figura, sed parui. Radix illi bulbosa, squamosa quæ.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & colitur in fictilibus vasis, * imo nō opus est, ut in fictilibus asseruetur, cum nihil periculi ipsi à frigore immineat.*

HYACINTHVS ORIENTALIS.




HYACIN-

HYACINTHVS ORIENTALIS ALTER.

F O R M A.

Folijs est alterius latioribus,
pinguioribus, & in summitate
retusis. cætera cæteris per-
quam similia sunt.



Ecc

PAPA-

PAPAVER erraticum, Græcis, Μήλον ῥόδου. Ital. Papauero saluatico. Germ. Klapp-
per Rosen. Hispan. Amapollis, seu Papoulla. Gallis, Pauot sauuage, siue cerfanous.

PAPAVER ERRATICVM.

F O R M A.

Diosc. Folia habet erucæ, diuisa,
scabra: caulem iuncum, re-
ctum, cubitalem, asperum.
Florem sylvestris anemones
puniceum, interdum album:
capite oblongo. sed anemo-
nes minori, in quo rufum se-
men. Radix est longa, subal-
bida, minoris digiti crassitu-
dine, gustu amara.

L O C V S.


Matth. Nascitur plerimum in ar-
uis inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Refrigerandi, ac soporem
simp. me. inducendi illi potestas est.

V I R E S.

Diosc. Capita quinq; aut sex in vi-
ni cyathis tribus ad dimidias
decocta, potiùq; data, sopo-
rem faciunt: semen acetabuli
mensura ex aqua mulsapota, aluum leniter emollit: folia cum calycibus illita
inflammationes sanant: allicitur etiam somnus eorundem perfusione, & foru.
Matth. Flores in puluerem triti, & ex aqua dulci poti, pleuritidi commodè medentur.
* Aqua florum commendatur ad Erysipelata, & oculorum inflammationes.
Hac imbuta stuppa cannabina, vtilliter imponitur iccoris regioni ad compe-
scendum sanguinis fluxum è naribus.*



PAPAVER sativum, Græcis, *Μηκρόν* &c. Arabibus, *Thaythay*, seu *Caschar*.
 Italis, *Papauero domestico*. Germanis, *Magsamen*. Hispanis, *Dormidera*. Gal-
 lis, *Pauot blanc*, seu *Pauot priue*.

PAPAVER SATIVUM.



G E N E R A.

Tria cius habentur genera. Diosc.
 Hortense, cui candidum inest
 semen: & sylvestre, cuius duo
 sunt genera, quæ etiam serun-
 tur: His accedunt cornicula-
 rum, & spumeum.

F O R M A.

Hortense capitulum habet *Idem*.
 oblongum, & semen candi-
 dum, sylvestre verò caput ha-
 bet insidens, demissumq; , &
 semen nigrum. Tertium ma-
 gis sylvestre, multò his longi-
 us est, & productiore capitu-
 lo.

L O C U S.

Hortense in hortis, cætera Matth.
 in campis seruntur.

Q U A L I T A T E S.


Omnium facultas refrige- *Galen. 6.*
 ratoria est. sativi autè semen *simp. me.*
 mediocriter somnum concil-
 liat, visu candidù. Cætera ge-
 nera longe magis soporifera
 sunt.

V I R E S.

Omnium in commune na- *Diosc.*
 tura refrigeratrix: foliorum,
 capitumq; decoctum ex aqua paratum, somnum conciliat: calyces cum farina
 hordeacea triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus
 medentur. coquuntur quoque capita per se ad dimidias. coquiturque deco-
 ctum cum melle, quousq; eclegmatis modo crassescant. Hoc itaq; modo para-
 tur medicamentum ad tussim, arteriæ fluxiones, & cæliacos affectus, efficacius
 tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia: Cæterum nigri papaveris
 semen tritum cum vino bibitur contra citam alvum, & fœminarum profluvia,
 & fronti quoq; in peruvigiliis illinitur ex aqua. Opium autem, quod è papau-
 rum nigroꝝ capitibus paratur, magis refrigerat, inspissat, siccaturq;.

*PAPAVER MULTIPLICI FLORE.


In hortis cultioribus passim habetur hoc papauer, elegantiae gratia solummodo, nam densis foliorum lacinijs cirrisque luxurians aspectui mirè blanditur, sed capitula ferè inania, nec tanta seminum copia distenta exiguum foenus reddunt, ideoque ijs qui delectationi vtilitatem praeferrunt hoc papaueris genus non usque adeo expetitur.*



PAPA-

PAPAVER corniculatum, Græcis, *Μίνων Κερατίνος*. Arabibus, *Almacharam*. Italis, *Papauero cornuto*. Germanis, *Gelböl Magen*. Hispanis, *Dormidera marina*. Gallis, *Pauot Cornu*.

PAPAVER CORNICULATVM.



F O R M A.

Folia habet candida, hirsuta, verbasco similia. in ambitu syluestris papaueris modo ferrata: caule non dissimili: flore pallido (quandoq; puniceo) calyculo in corniculorum modum inflexo: semine papaueris, pusillo, nigroque: Radice per summa cespitum nigra, crassaq;.

L O C V S.

Nascitur in maritimis, & Idem. asperis. Cæterum quod flo. Matth. re est puniceo nascitur copiosum in campis, in Moravia, & Boemia.

Q U A L I T A T E S.

Vim habet incidendi, & abstergendî. Galen. 7. simp. me.

V I R E S.

Radicis decoctum, ad diem paratum, coxendicum & iocinoris affectus potu sanat: prodest his, qui crassa quædam, & arenosa cum lotio reddunt. Semen in aqua potum acerabuli mensura aluum leniter purgat. Illita folia, & flores, crustas emarginant, & iumentorum argemas, & nubeculas abstergunt.

HYPECOVM, Græcis, *ὑπεκοον*. Italis, *Hippocoo*. Germanis, *Benedigter Pappel*
Wetter Köpflin.

HYPECOVM.

FORMA.

Matth.

Folijs provenit rutæ paulò
 maioribus, si singulatim ex-
 pendentur, caulibus exilibus,
 mollibus, hirsutis, in quibus
 flores sunt pallidi, & propè
 calycem subpurpurei: flori-
 bus succedunt capitula, tenui
 involucrio contexta, in qui-
 bus semen recòditur nigrum,
 tactu asperum, pseudomelan-
 thio proximum.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in agris inter sege-
 tes, & legumina.

QUALITATES.

Galen. 8. Refrigerandi vim habet, ex

simp. me. tertio ferè refrigerantium ordine, adeò, ut parum absit à papauere.

Diosc.


VIREs.

Natura eadem, quæ papaveris succo.

APPENDIX.

Nullam hætenus plantam mihi videre licuit, quæ magis hypëcoum referat:
 tametsi etiam mihi per omnia non satisfacit.

HYOSC.



HYOSCYAMVS, siue Apollinaris herba, Græcis, *τοκωάκη*. Arabibus, Bengi-
Italis, *Iusquiamo*. Germanis, *Bilsam*. Hispanis, *Velenho*. Gallis, *Iusquiamo*, seu
Hanabene.

HYOSCYAMVS.

GENERA.

Tria sunt eius genera. Ni- Diosc.
grum, Album, & Flauum.

FORMA.

Flauifolia lata sunt, & ob- Diosc.
longa, diuisa, nigra, hirsuta.
Flores è latere caulis ordine
prodeunt, tanquam punico-
rum cytini, scutulis septi, se-
minum plenis, vt papaueris.
Flores ei sunt lutei, & semen
subflauum, & siliquæ mino-
res. In nigro autem flores spe-
ctantur purpurei, & cytini præ-
duri ac spinosi: radice alba di-
gitali crassitudine.

LOCVS.

Proueniunt secus itinera, Matth.
& in agrorum marginibus.


QUALITATES.

Cui semen atrum est, insa- Galen. 3.
niam, ac soporem affert. Huic simp. me.

propinquam habet facultatem, cui semen mediocriter est flauum. verum utri-
que fugiendi sunt, vt inutiles, & venenosi.

VIREs.

Flauifolium, vbi album non adsit, eius loco supponi potest, sed maiorem Diosc.
cautela vti eo præstat.



HYOSCYAMVS albus, Græcis, *ῥοκίαυς λευκός*. Italis, *Isquiamobianco*.

HYOSCYAMVS ALBVS.

F O R M A.

Matth.

Folijs crescit alterius non dissimilibus, sed subrotundis, pinguioribus, mollioribus, hirsutioribus, rarioribus, albicantibus. Flores illi candidi, aut subpallidi, e quibus eodem ordine, quo in cæteris, cyrini oriuntur, sed rariores, & clementiores, in quibus album concluditur semen.

L O C V S.

Idem.

Nascitur sponte, & feritur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 2.


simp. me.

Ad sanationes is vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium.

V I R E S.

Diosc.

Semen collyrijs, quæ dolorum sensum auferunt, commodissime inseritur: contra acutas, calidasq; fluxiones, aurium dolores, atque vuluæ mala profunt: cum farina autem hordeacea oculorum, pedumq; , ac cæterarum partium inflammationes placat. Idem tussi, deffillationibus, & oculorum doloribus efficax est. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem oboli pondere, cum papaueris semine, & aqua mulsa bibitur. Podagrjs inuenit, testibus inflatis, manimisq; à parturientibus, tritum ex vino illinitur. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, tum per se, tum cum hordeacea farina vtiliter imponuntur: recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur. Radix in aceto decocta dentium dolores mulcet.



HYOSCYAMVS tertius, seu potius quartus. Italis, *Iusquiamonucuo*, seu *Iusquiamo maggiore*: Germanis, *Wundt Dilsam*/gelb *Wundttraut*.

HYOSCYAMVS TERTIVS.

F O R M A.



Planta est insignis, caules *Matth.* dit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramulosq; folijs amplis, pinguibus, tenui pilo pubescētibus, mollib⁹, solani soporiferi speciem quadantenus referentibus, graui etiam odore. Flores edit pallidos, hyoscyami emullos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, quæ nonnullâ hyoscyami cognationem præferunt: similibus enim ferè scutulis concluduntur, coronato circumquaq; cacumine, & semine intus subflauo: Radice est alba spithamæ longitudine.

L O C V S.

Scratur in hortis.

Idem.

FACULTATES,
ET VIRES.

Refrigerat ordine tertio *Idem.*
completo: soporem inducit, adeo vt ea sit ei natura, quæ cæteris Hyoscyamis.

Ecc s.

*HYOSCYA-

*HYOSCYAMVS Peruvianus vulgo dictus, quondam Pontiana & Nicotiana. Hispanis, *Petun*, & *Tabaco*. Gall. *Herba de la Roine Mere*. Germanis, *Indianisch Wundkraut*. Indis, *Picielt*.

F O R M A.

Ampla pmit folia, sinuata per ambitu & in mucrone sen-
sim se colligētia, molli lanugi-
ne pubescētia, pinguia & mor-
dicantia linguā, si gustetur: flo-
res pētagonos in summo cau-
lis insidentes, ramulis cōplu-
ribus dilutiorē purpura rube-
scentes, quib. oblōgæ, teretes
acuminatæq; succedūt capsu-
læ, in medio habētes intersti-
tiū quoddā, paruo semine pul-
loq; refertæ. Cæles humanā
altitudinē vinct, & radicib.
diuaticatis albisq; terra herēt.

L O C V S.

Nascit in India locis humi-
dis & vmbrosis, & ex culro le-
uiq; solo. In hortis nostris se-
mel plātata, postea seipsā serit
hec herba, decidentibus ē va-
sculis seminibus, sed nisi per
hiemē in fictilib. afferretur,
eius iniurias ferre nequit.

Q U A L I T A T E S.

Ad eo diuersis facultatibus
præditā ex varijs partib. cōpo-
ni apparet. Recēs enim non-
nihil frigidi possidet, & nimio humore obtūdit latitantem calorem, quātamen
in arida egregie se profert, adiunctam siccitatem habet.

V I R E S.

Ad varios morbos, eosque diuersos celebratissima est. Folia Cephalalgiam ex frigore or-
tam sedant, si imponantur, & ventriculi dolores compescunt. Sed & soporem inducunt, pod-
agricis cruciatibus medentur, vermes intestinorum necant, matricis tormina discutiunt, impe-
tigines emendant, vulnera & vlcera sanant, canculos item & carbones. Aqua elicitor ex herba,
quæ eadem potest: colluuntur succo dentes, si dolent, syrupus ex hoc conficitur, tussientibus,
asthmaticis, & alijs eiusmodi morbis pituitosis conueniens. Nec non epilepticis & hydropi-
cis succus propinatur in Hispania, sed caute est agendum, nam robustissimis quoque validum
purgans fuisse obseruatum est. Vnguentum ex Nicotiana paratum apud alios autores videa-
tur. Indi fumum foliorum hauriunt ad recreandas vires.*



PSYLLIVM, Græcis, Ψύλλιον. Arabibus, Bazarachat hona, seu Bezzer cothume. Italis, Psillio. Germanis, Psillientraut. Hispanis, Zargatona. Gallis, Herbe à puce.

PSYLLIVM.



F O R M A.

Folijs est incanis, longis, *Matth.* hirsutis, coronopo æmulis, non tamen corniculatis. Ramis numerosis, dodrantalibus, rotundis, gracilibus, & foliosis, humi potius, quàm in altum sese diffundentibus, in quorum cacaminibus capitula oriuntur, scabiosa vocatz modo: flosculos edit pusillos, prætenues, lanuginosos, pilorum speciè referentes, albo colore, plantaginis angustifoliaz modo, semè pusillum nigrum, pellucidum, pulicem effigie.

L O C V S.

In aruis & incultis nasci. *Diosc.* tur.

Q U A L I T A T E S.

Semè admodum vtile est, *Gal. li. 8.* ex secundo refrigerantiū ordine, *simp. me.* in desiccando verò &

humectando, medium quodammodo est, & symmetrum.

V I R E S.

Visci ad refrigerandum, inspissandum, & emolliendum conueniens: articu- *Diosc.* lorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis cum rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocellis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Seminis mucago ex aqua parata, vehementer refrigerat: cōtra sacros ignes efficax est: cum adipe rufum sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat: succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle infusus prodest.

SOLANVM hortense, Græcis, Στεφύλον κηραϊόν. Arabibus, Hamebathanaleb, seu Hameb alcha chaich, seu Hanabalthaleb. Italis, Solatro, seu Herba morella. Germanis, Nachtschatt. Hispanis, Terna mora. Gallis, Morelle.

SOLANVM HORTENSE.

FORMA.

Matth. Folijs exiit ocimo maiorib.
sed amplioribus, nigriorib⁹,
mollioribus. Plures circūqua
que fundit ramos, non sine a-
larum cavitatibus, florib. al-
bis, & in medio luteis, stellæ
figura, baccas edit rotundas,
racematim dependentes, vi-
noso succo prægnantes, oro-
bi quantitate, in quibus semē
continetur albū, minutum-
que: variat in baccis color:
namque in hac planta nigræ,
in illa luteæ, in altera subuiri-
des spectantur.

LOCVS.

Idem. Nascur in hortis, plateis,
secus itinera, & ferè vbique.


QUALITATES.

Gal. li. 3. Vfus eius est ad omnia ea,
simp. me. quæ refrigerari & adstringi
postulant, potest enim hæc
duo ordine secundo.

VIRES.

Diosc. Folia conuenienter illi-
nūtur, cum hordeaceæ farinæ
polline ignibus sacris, & vlce-
ribus, quæ serpunt: ægilopia,
capitisque dolores, trita, & imposita per se sanant: æstuantī stomacho auxilian-
tur: parotidas cum sale detrita, illitu discutiunt, foliorum succus, cum rosaceo
perfusus, valet contra infantium syriasim: instillatur vtiliter aurium doloribus:
in vellere subditus, mensium abundantiam sistit. Fulgo gallinarum fimo suba-
ctus & appositus, ægilopis præsentaneo est remedio. Phreniticos iuuat exa-
ceto, & rosaceo sincipiti illitus. Illinitur fronti contra calidas otulorum fluxio-
nes. Gargarizatur quæque cum aceto, ad faucium, & columnellæ inflammatio-
nes, & additur cōuenienter in vnguentis, & emplastris, quorum ad vlcera con-
tumacia est vsus: cibis idoneus est.

Matth.



SOLANVM Halicacabum, Græcis, *ἡλίκαβος* & *ἡλίκαβος*. Mauritanis, *Kekengi*, seu *Alkekengi*. Italis, *Alcahengi*, & *Halicacabo*. Germanis, *Judendöcklin* / *Schlutten* / *Judentischen*. Hispanis, *Besiga de perro*. Gallis, *Euguenandes*.

SOLANVM HALICACAEVM.

FORMA.



Folia mittit hortensis simi *Matth.* lia, sed latiora, firmiora, & sub aspera, nec adeò, vt in illo nigricantia: caulibus lentis: floribus cādidis, è quibus vesicæ oriuntur turbinatæ, iuglandiū magnitudine, angulosæque, quæ per maturitatē rufescunt, in quibus singulis singulæ concluduntur bacce, vinoso succo refertæ, ipsæq; rubent. rufci baccis persimiles, sapore austero, simul & amaro: numerofo minutoq; intus semine.

LOCVS.

Nascitur propter vligino- *Idem.* sas sepes, & locis vmbrosis.

QUALITATES.

In foliorū facultate hortēsi *Gal. li. 8.* solano simile est, multis admi- *simp. me.* scet compositis, q̄ ad iecur, vesicā, & renes accommodantur.

V I R E S.

Vim, vsusque hortensis solani habet: verum in cibis nunquam expetitur, re- *DIOSC.* gium morbum purgat: semen potum vrinam pellit. Baccarum vis habetur *Matth.* non solum præstantissima ad renum vitia, & ciendam vrinam, sed ad eius quoque acredinem retundendam: bibitur namque earum succus ad ea omnia viriliter cum papaueris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbitæ, cucumerisve. Aspidibus autem adeò aduersissimū est Halicacabum, vt admota propius eius radice, sopore inexpugnabili necentur.

VESICA-

VESICARIA, siue Halicacabum repens. Italis, *Vilucchio forestiero*. Germanis, *Hersamen/Hersförner*.

VESICARIA, SIVE HALICACABUM REPENS.

FORMA.


Matth. Folijs cōstat oblongis, per ambitum laciniatis, floribus pallidis, aut candidis, è quibus vesicæ prodeunt virides, subrotundæ, senis secundum longitudinem futuris: semine intus pullo, erui magnitudine, aut paulò maiore, in cuius latere humani cordis nota visitur albe colore.

LOCVS.

Idem. Seritur in hortis, & scitibus, ad ropiaria.

QUALITATÈS.

Idem. Creditur valere semen ad omnes cordis affectus, ob notam quaidem insignitur.




SOLANVM

SOLANVM somniferum, Græcis, Στεφύλι τοῦ ὕπνου. Italis, solatro somnifero.

SOLANVM SOMNIFERVM.

FORMA.



Numerosis fruticat ramis, DIOSC.
densis, caudicosis, fractu con-
tumacibus: folijs multis, pin-
guibus, cotoneæ mali haud
abfimilib⁹, plenis, flore gran-
di, rubro: fructu in folliculis
crocato: radice grandi, subru-
bro cortice vestita.

LOCVS.

Nascitur in saxosis, non Idem.
procul à mari.

QUALITATES.

Radicis cortex opio qui Gal. li. 8.
dem perfimilis est, sed imbe- simp. me.
cillior, aded vt tertium refri-
gerantium ordinem non ex-
cedat: cum opium sit quarti.
Idem desiccat secundo ordi-
ne completo, ac tercio inci-
piente.

VIRES.

Radicis cortex ex vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, o- DIOSC.
pio tamen mitiorem: Semen vehementer urinâ cit, corymbi duodecim hydro-
pici dantur: plures verò mentis alienationem faciunt. Remedio est aqua co-
piofa potui data: inseritur pastillis, & medicamentis, quæ doloris leuamentum
prestant. Vinum in quo idem decoctum fuerit in ore contentum, dentium do-
lorem mulcet. Radicis succus ex melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

SOLANVM somniferum alterum. Italis, *Solatro Somnifero minore.*

SOLANVM SOMNIFERVM ALTERVM.

FORMA.


Matth. Folijsest angustioribus, venosis, in humum spectatibus: caule anguloso: Floribus tinnabuli figura, subpurpureis, per ambitum crenatis, ex quibus baccæ proueniunt nigræ, vinosæ, minuto intus semine, viridi quodâ calyculo ad medium vsq; contextæ, in coronæ modum denticulato. Radicem habet grâdem, strumosam, albicantem.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus inter saxa.

QUALITATES,
ET VIREs.

Idem. Vires alteri similes habet, sed proculdubio imbecilliores.



SOLANVM

SOLANVM maius. Italis, *Solatro maggiore, siue Herba bella donna.* Germanis, *Dostwurk / Schlaffbeer.*

S O L A N V M M A I V S.

F O R M A.



Folijis provenit hortensis *Matth.* solani maioribus. caule bicubitali, tricubitalique, atque maiore, ramis numerosis, alis multis, floribus oblongis, tintinnabuli instar concavis, subpurpureis, capillaceis intus staminibus. His baccæ suboriuntur singulatim dependentes, & breui calyculo superiori parte comprehensæ, quæ maturescentes nigricant, acini vix magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo prægnantes, ac minuro numerosoque semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, & succi plenam.

L O C V S.

Nascitur in montibus *Idem.* xosis, & seritur in hortis.

F A C U L T A T E S.

Refrigerat ordine tercio, *Idem.* & siccatur secundo, estque

somnifico solano viribus simile.

V I R E S.

Baccæ quatuor, aut sex deuorata, sumentes deliros faciunt, atque furentes, plures vero veternosos efficiunt. Aqua è tota planta distillata, (vt quidam fatentur) duorum, aut ad summum trium cochleariorum mensura, internas viscerum inflammationes extinguit, nullo omnino incommodo: sed à copiosiore potu abstinendum. Eadem exterius admota, erysipelas, sacros ignes, & alios calidos affectus iuuat: contrusa folia, & illita oculorum, palpebrarumque slegmonas mitigant.

MANDRAGORAS; Græcis, *Mandragoras*. Arabibus, *Iabora*, seu *Tabrobac*. Italis, *Mandragola*. Germanis, *Astraum*. Hispanis, *Mandracola*. Gallis, *Mandragore*, siue *Mandegloire*.

M A N D R A G O R A S.

G E N E R A.

DIOSC. Duum est generum nigra, quæ fœmina, & Alba, quæ mas dicitur.

F O R M A F O E -
M I N A E.

Idem. Folijs prouenit læstucæ minoribus, angustioribusque, virosis, ac graueolentibus, humi sparsis. Mala gerit sorbis similia, pallida, odorata. in quibus semen veluti pirorum. Radicibus cohæret magnis, binis ternisve inter se conuolutis, nigris foris intus albis, crasso cortice vestitis: caulem nullum fert.

L O C V S.

Matth. Nascitur copiosa in Gargano Apuliæ, & alijs in montibus quæque habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. simp. me. Vincentem habet facultatem: refrigeratorem, adeo, vt tertij sit ordinis refrigerantium, verum, & caliditatis cuiusdam particeps est, & in primis humiditatis, proinde soporis conciliandi vim habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur: reliquum, quod intus est, imbecillum existit.

V I R I S.

DIOSC. Succus è radicibus corticibus duobus obolis ex mulso potus, vomitione bilem atram, pituitamque extrahit: potu verò largiore interimit. Admiscetur medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores finiunt, semioboli pondere inditus, partus per se, & menses expellit. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera excitant, cum farina hordeacea imponuntur: suppurationes, Strumas, & tubercula discutunt: stigmata delent, si quinis, senisve diebus sensim perficiuntur. trita radix ex melle, aut oleo illita, serpentium morsibus medetur. Mala olfactu soporem afferunt. ac etiam si mandantur: Semen eorundem potum vulvas purgat. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis, cum decocta sit & ad accipiendam, quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat.



MANDRAGORAS mas, Græcis, *Mandragoras* ἄππλω. Italis, *Mandragola masculio*.

M A N D R A G O R A S M A S.

F O R M A.

Folia habet magna, alba, diosc.
lata, lævia, vt betæ: mala-
que alterius duplo maiora,
colore in crocum inclinante,
iucundè, cum grauitate
quadam olentia, quorum
pomorum cibo aliquan-
tùm opiliones soporantur.
Radix alterius est similis,
maior tamen, & candidior,
orbata & hæc caule.

L O C V S.

Nascitur & hæc in mon- *Matth.*
tibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Isdem est insignita facul- *diosc.*
tatibus, quibus & scemina.

C E N S V R A.

Qui credunt, mandrago-
ras, quæ ab impostoribus circumferuntur, humana forma, esse legitimas,
manifesto hallucinantur. Factitiæ enim sunt.

MELONGENA, seu mala infana, Italis, Pettranciani, seu Melanzane. Germanis, Dollöpfel.

M E L O N G E N A.

F O R M A.

Matth.

Folia gerit stramoniz cognata, aut maioris solani subaspera tamen, & subhirsuta, & per ambitum sinuata, caulivnico, dodrantali, aut maiore, tereti, firmo, subpurpureo, & hirsuto: flores edit albicantes, aut subpurpureos in stellæ modum, è quibus oblongi oriuntur fructus, cucumeris magnitudine, purpurascens, virentesve, lævi cortice, succosa albicanteque intus pulpa: semine numeroso, paruo, filiquastri æmulo: radice nititur multifida.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & vasis fistilibus.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Idem.

Manduntur in cibis fructus.

Alicen.

Sunt è nostratibus, qui horum esu venerem concitari putent: quod forsitan ideo præstant, quòd flatus gignant. Cæterum, frequenter manducati, cum biliosos, tum atrabiliarios generant humores, viscerum obstructions, carcinomata, elephantiasm, tristitiam, capitis dolores, & iocinoris, & lienis obstructions. Quo fit vt postea diuturnæ oriantur febres, & habitus malus.



* POMA AMORIS. Poma aurea. Italis, *Pomo d'oro. vel Pomi del Peru.* Gal-
lis, *Pommes d'amours.* Germanis, *Goldöpfel.*

POMA AMORIS.



FORMA.

Herba late ramos spargit,
grauiter olentes, fere vt Ga-
riophyllorū Indicorum plan-
ta, crescit ad altitudinem hu-
mani corporis, fert poma ma-
gnitudine oui, primo viridia,
vbi maturuerint, crocea, vel
rubra.

LOCVS.

Habetur in hortis, locisq̃ue
gaudet humidis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Frigida est, & forte nō absq̃
maligna qualitate, Poma vero
innocue in Italia eduntur. Ea-
dem oleo macerantur & inso-
lantur, vel in fimum equinum
infoduntur, ad scabiem inun-
gendam, idque mirifice à qui-
busdam commendatur.*

ACONITVM Pardalianches, Græcis, ἀκόνιτον παρδαλιανχης, ἡ θηλυκὴν. *Indis, Aconito pardalianche.*


ACONITVM PARDALIANCHES.

G E N E R A.

Matth. Quatuor nos obseruauimus genera. Primum, quod Dioscoridis, secundum, quod Plinij, tertium quod Theophrasti esse censemus, & quartum, quod Doronicum errore magno vocatur.

F O R M A P R I M I.

Matth. Planta est admodum rara, folijs cucumeri proximis, sed maioribus, ad summum quatuor, subhirsutis. caulem edit dodrantalem, floribus chrysanthemi similibus, sed minoribus. Radicem alabastrum modo splendentem, digitali crassitudine, in acutum desinentem, incuruam geniculatam, & tota facie scorpionij caudam æmulantem.



L O C V S.

Diosc. In nudis, & arduis montium summitatibus, cauitibꝫq; prouenit, vmbrosistantum locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est, itaq; cibo, potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum extremas corporis partes, aut circa sedem, idoneum est: Herbae verò radix ad hæc utilis est.

V I R E S.

Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur: Enecat pantheras, sues, lupos, & feras omnes in carnibus obiectum: torpescunt, (vt fama est) scorpiones, admotâ radice, stupentq;ue, sed statim ellebori contactu excitantur.

*** A P P E N D I X.**

Planta hæc tam rara est, vt non dum etiam diligentissimis Rei herbariæ studiosis sese vsipiam offerre voluerit. De ea itaq; nihil adhuc certi indicare possumus: alij plane negant extare. *

ACONITVM Pardalianches Theophrasti. Italis, *Aconito Pardalianche terzo.*


ACONITVM PARDALIANCHES
THEOPHRASTI.

FORMA.

Folia profert cyclamini *Matth.* haud dissimilia, radicem scorpi-
onem. integrum præse-
rentem. cui fibræ insunt ge-
niculatæ, graminis modo, &
eiusdem quoque modo se se
propaginant, & alios quo-
que scorpiones effingentes,
è quibus germina, & folia e-
rumpunt. Atqui caules, &
flores à cæteris minimè diffe-
runt. * Est vero hæc planta
sequenti Doronico conge-
ner. *

LOCVS.

Nascitur in altissimis mon- *Idem.*
tibus, præscriptis locis.



ACONITVM pardalianches minus, Officinis, *Doronicum*. Italis, *Doronico*, Germanis, *Gemsenwurk*.

**ACONITVM PARDALIAN-
CHES MINVS.**

FORMA.

Matth.

Folia, caules, & flores gerit ceterorum generum similes, radicem quæ graminis modo serpit, & quæ hinc inde numerosa edit tubercula scorpionum effigiem præferentia, candida, tenera ac dulcia.

LOCVS.

idem.

Nascitur & hoc in altissimis montibus, ubi sylvestres capreae inhabitant.

**QUALITATES,
ET VIRES.**

idem.

Radix canes, vulpes, & lupos necat cum carnibus duarum drachmarum pondere propinata: Est enim lethalis, & deleteriæ facultatis.

*** CENSURA.**

Arabum *Doronicum* non esse hoc nostrarum officinarum *Doronicum* facile assentior Autori, pro quo radicem Galangæ vel Zedoariæ cum pauco cortice Citri substituendam esse cum alijs peritis medicis censeo. Sed venenum esse illud & hominibus lethale, nondum comprobanit experientia, licet canes interimat. Venatores certe multis in locis apud nos, præsertim ubi sunt venationes Rupicaprarum, comedunt contra vertiginem & vocant, *Schwindelstrauk*. *



*TORA maior, Toxicum Valdensium. Italis, *Thera Gualdese*.


T O R A. M A I O R.

F O R M A.

Folia habet Cyclamino similia, circinata & aspera, non hirsuta, per ambitum crenata, duo, tria, quatuor, aut etiam quinque ab vna radice, magnitudine & figura ferè foliorũ Cucumeris. Flores profert æstatis principio, Ranunculo colore & specie similes, & semen etiam simile. Radices plures, coniunctæ vt asphodeli ex vno capite prodcentes, cum recentes sunt omnium candidissimæ sunt, non tamen alabastrum modo splendentes, siccæ rufæ ad rufum colorem abeunt.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Caustica vis ipsi inest & veneno Napellum superat. Eius succo venatores sagittas inficiunt.*



Minoribus folijs constar,
ad plurimum tribus ab vna
radice, sæpius verò singulari
rantum folio prædita est. Flo-
res quoque minores sunt, si-
miles tamen, vti & semen. ra-
dices lógiusculam habent ap-
pendicem scorpij caudæ æ-
mulam, qua se propagare vi-
detur.*



ACONITVM II. Luparianoſtra. German. Wolffſtrutz.

ACONITVM II.

Flores habet luridos aut
luteos pallescentes.

LOCVS.

Nascitur hoc, cum ceteris *Matth.*
inſcriptis generibus, in al-
tis montibus, & præſertim in
monte Baldo in Veronenſi a-
gro.



ACONI-

ACONITVM III. * Aconitum hyemale.


ACONITVM III.

Folia explicat rotunda in rotæ modum, per ambitum incisa, innitentia oblongo pediculo, flosculus hyeme nascitur aureus, Ranunculi æmulus, qui si minor fuerit flauior est, si maior aut longiusculus obscurioris est flauedinis, quem subsequuntur siliquæ omnino similes ellebori nigri siliquis, sed in diuersum magis tendunt. Radix ex pluribus tuberculis aut granis cõponitur, acri sapore & feruenti. *



ACONIT-

ACONITVM IIII.



* Flores promit caeruleos.
caudatos.*

ACONI-


Flores illi insunt * crocei, folia vitigineis aut fuscis ac cedunt magnitudine ac figura seu diuisione, maculis uero albis & liuescentibus venis deformantur, radix nigricat. Sic enim pinxit peritiss. pharmacopola Veronensis Franciscus Calceolarius, cui etiam sequentes picturae acceptae referendae sunt.

L O C V S.

Magna eius copia inuenitur in monte Baldo.*



ACONITUM VL.



* Napello simili folio sed
 multo maiore conspicitur
 & albis quibusdam seu pal-
 lidis liuescente venulis, flo-
 ris figura ad lupariam no-
 stram accedit, colore pal-
 lescente luteoue.*

Flores mittit purpureos.




ACONT-

ACONITVM VIII.



* Floribus prouenit rube-
scentib⁹, folio ferè viragineo,
radice quadruplici ab vno ca-
pite crasso.*


Luteos gerit flores, * radi-
ce duplici, diu aricata sustine-
tur, minora & graciliora
quam alij napelli folia & ma-
gis dissecta promit. Antoram
forte aliquis non male existi-
maret nisi maior & longior,
vt mihi videretur, hæc esset. *



HERBA paris, quibusdam vva versa, siue vva lupina. Italis, *Herba Paris*. Germanis, *Wolfsbeer*/ seu *Sterntraut*. Gallis, *Raisin de Renard*.

HERBA PARIS.

FORMA.



Vno tantum constat caule, *Matth.* rotundo duorum dodrantum longitudine, è cuius medio quatuor erumpunt folia, eodem ambitu crucis instar patentia: sanguineæ virgæ similia: vnicam in summitate baccam gerit, purpuream, acino vuz similem, atq; vinoso succo prægnantem: numerofo in tus semine, albo, minutoque halicacabi modo: radiantibus quatuor subtus foliolis, oblongis, & acutis: Radix illi sub est tenuis, ac multifida,

LOCVS.

Prouenit in montibus: in *Idem*, conuallibus, & frutetis,

QUALITATES.

Herba vnà cum baccis re. *Idem*. frigerat, & siccatur.

VIRES.

Semen quod è baccis eximitur (vt quidam asserunt) semidrachmæ pondere *Idem*. potum, eos maxime inuat, qui aut ex morborum diuturnitate, aut veneficijs, amentia tenentur. Baccæ antidotis admiscentur, quæ contra deleteria pharmaca parantur: Herba recens tusa, & illita, genitalium tumores, & inflammationes sanat, ac pariter oculorum phlegmonas: paronychij quoq; medetur.

CENSURA.

Errant, atque maxime hallucinantur, qui hanc plantam Aconitum pardalianchem faciunt.


NAPELLVS. *Italica, Napello.* Chymistis, *Herbatorum.* Germanis, *Blau Eysenstuck.*
lin. Marrentappen.

NAPELLVS.

FORMA.

Matth.

Folij exit quinis ex vno pediculo prodeuntibus, circum quaq; diuisis, supina parte albicantibus; caulem edit bicubitalem; subrufescerem, striatumq;: in cuius fastigio flores exeunt, purpureo colore, horum sylvestris modo: Hos sequuntur corniculatæ siliquæ, sursum spectantes, ternæ ex vno quoq; pediculo prodeuntes, in quibus semen concluditur nigrum, ac minutum. Radice nititur turbinata, subnigricante, à qua numerosæ oriuntur fibræ, in retis modum complicatæ. * Appinxi radicem aliam eiusdem plantæ, quæ cum illa effusa ex eodem scrobe extracta fuit. nullus ei caulis apparuit, sed germen tantum albicans quasi nunquam germinasset. Fibris aliquot quibus abundauit, resectis, quædam reliquæ sunt. *



LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & in conuallibus.

QUALITATES.

Anicn. Excalfacit, & siccatur ordine quarto.

VIRE.

Idem. Venenum est perniciosum. Linitum tamen vitilignes tollit, eius antidotum est Diamoschos.

ANTORA, siue Antitora. Italis, *Antora*. Germanis, *Giffthell*.

ANTORA.



FORMA.

Caulem edit sesquidodran- *Matth.* ralem, rotundum, firmum, in quo multifida, ac tenuia, disparibus interuallis oriuntur folia, numerosa, in latus, sese diffundentia. Flores edit summo caule numerosos, * In luteo pallescentes (purpurei nōdum a nobis visi *) Napelligulos, sed minores; radices duas solidas, oblongas, turbinatas, oliuæ crassitudine, subnigricantes, sed alba intus carne, pardi montanæ modo.

LOCVS.

Prouenit in Gallia Cisalpi- *Idem*. nâ, & Liguriæ montibus.


QUALITATES, ET
VIRE.

Præstant radices ad epotum napellum, & ad cætera quæcunq; venena: quin etiam ad viperarum & cæterorum serpentium ictus. Vermes intestinorum necant. Propinquantur quoq; commodissimè ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus: & contra pestilentiam: auxiliantur omnibus cordis affectibus. Dantur magno auxilio pestilenti febre: cum exanthematibus laborantibus: & cum legitimo Doronico careamus, eius loco per quàm bellè supponi possunt.

APPENDIX.

Antoræ radices, ego quidem Auicennæ Zedoariam esse censeo, quòd vnà cum napello proueniant.

Et hoc obseruavi, non vniſmodi figurâ repræſentare radices Antoræ, aliæ enim ſingulare tuber habent, aliæ geminæ cohærent, ſuntq; vel turbinatæ, vel oblongæ, nonnunquã triplices inueniuntur, nonnunquã quæ Scorpionum imaginem imitantur. Hanc itaq; varietatem icone adiecto rei herbariæ ſtudioſis indicare volui.*



CICUTA, Græcis, Κάπνιον. Arabibus, *Sutaram*. Germanis, *Schierling* seu *Wüsterich*. Hispanis, *Ceguda*. Gallis, *Cigue*, *Segue*, sine *Cocue*.

CICUTA.

FORMA.

Caulem edit geniculatum, Diosc. ut fœniculi, grandem, folia ferulæ, angustiora tamen, odore graui: Rami, mox umbellæ in summo prodeunt, flores quoque albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concava.

LOCVS.

Nascitur passim propè urbium, & oppidorum mania, & secus itinera.

QUALITATES.

Facultatis est extremè refrigerantis. Galen, s. simp. me.

VIRES.

Lethale venenum est: suae nim vi refrigeratoria necat: Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum

imaginationes, in somno compescit, sed genitale resoluit. Lac puerperarum extinguit mammis apposita: In virginibus mammas coerct, & incrementum non paritur. Ab Alinis deuorata, tam improbum ijs soporem inducit, ut mortui videantur. Matth.

Ggg 4

TAXVS,



TAXUS, Græcis, Συλῶξ. Italis, Tasso, seu Nasso. Germanis, Eibenbaum. Hispanis, Texo. Gallis, If.

TAXUS.

FORMA.

- Diosc.** Arbor est Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. Baccas fert rubentes, atq; vinosas, glutinosasque: Ligni materies rufa, venosa, robusta, ac ferè incorrupta: e qua hastæ, arcus, & tela fiunt.
- Matth.**

LOCVS.

- Matth.** Prouenit in montibus saxosis locis.

QUALITATES.

- Galen. 8.** Facultatis est venenosa.
simp. me.

VIRES.


- Diosc.** Baccæ ab hominibus deuoratae, alui profluuium excitant: Læduntur maximè, qui in Narbonensi agro sub taxi umbra obdormierint: imo sæpius moriuntur. Boues foliorum pastu necantur.
- Diosc.** Quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.



АРОЧ

APOCYNVM, Græcis, *Απόκυνον*. Italis, *Apocimo, siue periploca*.

APOCYNVM:



FORMA.

Frutex est longis viticulis **DIOSC.** constans, malè olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hæderæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, odore graui. Id luteo succo turget: siliquæ ceu fabarum: folliculari specie; digiti longitudine protenduntur: semine intus duro, paruo, nigro.

LOCVS.

Prouenit in Syria & Apulia. **Matth.**

QUALITATES.

Est autè hominibus véné- **Galen. 6.** num. Herba multum grauiter **simp. me.** olens: proinde omnino calida est non instrenue: non tamè proportionè desiccatur. Itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

V I R E S.

Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant **DIOSC.** in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Apocynum repens. Italis, *Apocinoserpeggiante.*

APOCYNUM REPENS.

FORMA.

Matth.

Folia promit alterius longiora, caules, seu potius viticulas obsequiosas, & fractu contumaces, lentasque: quibus nō solum humi repit, sed arbores quantumvis proceras scandit, tota planta lacteo succo tithymali modo scaret: sed non ut in altera lacteo. Est & in siliquis differentia: namque in hac planta binæ ex 7 no pediculo in origine coniunctæ prodeunt, & in sese innicem inflexæ, nerij siliquis perquam similes.

LOCVS.


Idem.

Prouenit hæc planta copiosa in Apulia, & Calabria.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Creditur ijsdem pollere viribus, quibus & alterum.




NERIUM

NERIVM, seu **Rhododendrum**, Græcis, *Nigiov*, ἡ φοιδένδρον. Italis, *Oleandro*. Germanis, *Oleander*. Hispanis, *Adelfa*, siue *Eloendro*. Gallis, *Oleandre*, *Rosage*, seu *Rosigine*.

NERIVM SEV RHODODENDRVM.

F O R M A.



Arbor est vulgaris notitiæ, **DIOSC.** longioribus, quam amygdala folijs, crassioribusque: flore in rosam cōformato: fructum fert cornu similem, qui patefactus, quandam lanosam naturam ostēdit: spinosarū plantarum pappis similem: Radice longa, acuta, lignosa: gustanti falsa.

L O C V S.

Nascitur in amœnis, mari- **Idem.** .
timis, & secus amnes.

Q U A L I T A T E S.

Foris quidem corpori illi- **Gal. li. 3.**
tum, discutiendi vim obtrinet, **simp. me.**
intra verò in corpus assum-
ptum, perniciosum non tan-
tum hominibus, sed plerisq;
etiam pecudibus.

V I R E S.

Flores & folia, mulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena sunt: **DIOSE.**
hominibus verò contra serpentium morsus præsidia è vino pota, & eo magis
addita ruta. Imbecillæ etiam animantes, vt oues, & capræ, si aquam bibant, in
qua folia maduerint, moriuntur.

FVNGI, Græcis, Μυκήτες. Arabibus, Hatar, seu Fater. Italis, Fonghi. Germanis, Schwemm, Pifferling, Reisten. Hispan. Hongos, Cogomelos, seu Cylerques. Gal-
lis, Capignon, seu Potyron.

GENERA.

DIOSC. Fungorū genera, numero-
sa quidem sunt, verū quædā
esculenta sunt, quædam verò
perniciosa.

FORMA.

Matth. Vt quidem varia spectatur
facie, ac colore, ita hominib.
maximè noti sunt fungi: pluri-
mi tamè galeri modo forman-
tur palmari: ac etiā minori pe-
diculo nitètes, vario superius
inferiusque colore.

LOCVS.

Matth. Nascuntur quidam in pra-
tis, pleriq; in pascuis, nonnul-
li in sylvis, quidam in frutetis,
& aliqui in arborum caudici-
bus.


QUALITATES.

Gel. li. 8. Fungus, frigida, humidaq;
simp. me. planta est: quam obrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemque faculta-
tem accedit, & sanè inter eos sunt, qui interficiant, præsertim, qui ex natura mi-
stam habent qualitatem putredinosam.

VIRE S.

DIOSC. Multis de causis venenosi gignuntur: vbi videlicet clauus ferreus rubigino-
sus, aut panni marcor affuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arboresque, qui
priuatim nòxios pariunt fructus. Qui verò esculenti sunt, suauè in iuribus gra-
tiam habent: largius tamen deuorati, nocent, & ægrius concocti strangulant,
aut choleram morbum gignunt.

FVNGI.



Colchicum, siue *Ephemerum*, Græcis, *Κολχιδόν*. Offic. *falsæ Hermodactylus*. Arabibus, *Surugen*. Italis, *Colchico*, & *Zaffirano saluatico*. Germanis, *Zettlöß* aut *wild Safran*. Gal. *Mort au chien*, seu *chiennæ*. * *A. Colchicum polyanthum* flores albos profert. *B. vulgare* purpurascens. *C. apices* intus albos habet, reliqua luteos.*

COLCHICVM.

FORMA.

Autumni exitu florem gerit *Diosc.* croci, subalbicans, postea verò folia bulbi, sed pinguiora, caulè palmo altum, ferentem rufum semen : radicem foris è nigro rufescentè, quæ delibrata candida, & mollis spectatur : lacteo succo madet, gustu dulci : bulbus eius mediam habet rimam, fissuramque qua flos erumpit.

Locv's.

Nascitur in pratis, & pa- *Matth.* scuis.


QUALITATES.

Strangulando necat: est e- *Gal. li. 6.* nim deleteriæ facultatis. *simp. me.*

VIRES.

Deuorata radix, fungorum *Diosc.* more strangulando necat.

* **LFlos**



*I. Flos Colchici Vere prodiens. II. Folia & folliculi seminum. III. Folliculus & semina separatim picta.

Menſe Aprili nonnunquã Colchici florem inueni prodeuntem ex folijs breuiusculis ternis, herbaceis, quibus antequam emergat, inuoluitur. Flos ipſe obſoletiore colore purpuraſcit, quàm qui autumnò prodiſcit, apices paruos luteos habet, & totus etiam minor ſtrigoſiorque apparet.*



HERMO-

HERMODACTYLVS, Græcis, Ερμωδάκτυλος Arabibus, *Saragen.* Italis, *Hermoadattilo.*

HERMODACTYLVS.

FORMA.



Folia mittit prælonga, binū *Matth.* dodrantum, ac etiam longiora, porri, aut asphodeli quadante nus similia, longè tamè angustiora, breviora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna eademque basi prodeuntes, digitorū figura, colore subrufescente, albis in summitate vnguis; caulis è medio prosilit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum pyri figura, ephemeræ colchici modo.

Locvs.

Oritur in Orientalibus re- *Matth.* gionibus, & in Arabia.

QUALITATES.

Excalfacit & siccit ordine *Mesue.* secundo. Cum humiditate ex- *Serap.* crementosa, flatulenta.

VIREs.

Pituitā crassam, & præsertim ab articulis trahit: ac proinde podagris, ac cæ- *Mesue.* teris articulorum morbis confert. Impinguat, genitale semen auget, & vlcera purgat, & carnem in his putrem consumit.

CENSURA.

Errore magno ducuntur, qui Colchico nostrate, Hermodactyli loco vtuntur.

PSEUDOTHERMODACTYLVS, * Dens caninus vulgo. * Italis, *Hermodactilo battardo*.

F O R M A.

Matth. Folia habet aquaticæ plantaginis, minora tamen, infirmioraque, longo pediculo nientia: caulem tenuem, singularem, in cuius summo flos emicat albus, * non nihil purpurascēs, * stellæ figura. Radices habet binas, * plures vel pauciores, * bulbosas, candidas, teneras.


L O C V S.

Idem. Provenit in frutetis, & propter semitas, & sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Sunt qui radices probent ad ea omnia, ad quæ legitimus hermodactylus conferre potest. Nos verò horum sententiam nec probamus, nec improbamus, cum nullam certâ de eo habeamus experientiâ.

PSEUDOTHERMODACTYLVS.



HELIX.

HELXINE, *Gæcis, ἐλξιν ἢ ἀργύρινος. Officinis, Panetaria. Italis, Vetrìola. Germanis, Tagwund Nacht. Hispanis, Yerua del muro. Gallis, Paritoire.*

HELXINE.

FORMA.

Folia profert mercurialis, *Diosc.* hirsuta, cauliculos subrubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhaerentia vestibus.

LOCVS.

Nascitur in domorum pa- *Matth.* rietibus, sepibus, & macerijs, arido solo.

QUALITATES.

Vis ei inest abstergendî, & *Gale. 6.* leuiter constringendi, cum *simp. me.* humiditate subfrigida.

VIRES.

Folia illita, sacrosignes, ad- *Diosc.* usta, condylomata, incipientes panos; tumores, inflammationesq; sanant. Succus eius, cum cerussâ uiceribus, quæ serpunt commodè illinitur: imponiturque podagris, cum hircino adipe, veterem ruffim

emendat, instar cyathi haustus: Gargarizatur, ac illinitur vtiliter tonsillarum inflammationibus: aurium dolorem mulcet, cum rosaceo instillatus. Vis her- *Matth.* bæ quoq; magna ad vulnera recentia sananda: Si enim recens semicôtnsa vulneri adalligetur, & tertia die solutur, non erit opus alio medicamento: foliorum succus defecatus, potus trium vnciarû pondere: cum saccharo, urinâ mirificè propellit: & renes abstergit: Folia super tegula ignita calefacta, & albo mero aspersa: pubiq; illico imposita, calculosis, & urinæ malo affectis mirificè auxiliatur. Additur commodè in clysterijs, qui ad ventris, & vteri dolores parantur. Stillatitia eorum aqua faciem abstergit, & eius nitorem conciliat.

ALSINE, Græcis, *ἀλσιν*. Italis, *Centone*, *Paparina*, *Budello di Galline*, & *Centonice*. Germanis, *Hünere Darm*, seu *Vogelstrauch*. Gallis, *Mouron*.

ALSINE.

GENERA.

Matth. Plura eius sunt genera, quæ in maiora, & minora diuidi possunt.

FORMA.


PROSC. Minus folia habet ad similia helxinæ, sed humiliora, minimeque hirsuta, aded ut muscutorum auribus similia videantur: cum teruntur cucumerem respiciunt.

LOCVS.

Idem. Locis opacis gaudet.

QUALITATES.

Gal. lib. 6. Facultatem habet refrigerantem, & humectantem: est enim essentia aqueæ frigida: quare, & citra adstrictionem refrigerat.



VIRES.

PROSC. Vim refrigerandi, adstringendi quæ obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur, succus aurium doloribus infunditur. Ex oleo chamæmelino feruēfacta illinitur ytiliter ventri contra tormina, & yteri dolores.

* ALSINE MAIOR.

F O R M A.


Maior alsine cognomento arguit, quid à minore discrepet. Longè altius enim surgit & si sustentacula consequitur, quibus niti queat, humanam altitudinem superat, folia & cauliculi respondent minori sed hi grandiores illa ampliora spectantur. Flosculi candidi stellati pulcre staminibus ruffis in medio exornantur. Semen minutum luteum in vasculis oblongis clausum latitat.

L O C U S.

Nascitur in frutetis & humido solo gaudet.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Hæ cum prioris qualitatibus viribusque conveniunt.



Hæ

Læns

LENS palustris, Græcis, φακὶς ὁ ἐπὶ τῶν τελευμάτων. Arabibus, Tahaleb, seu Taleb. Italis, Lente aquatica, & lenticulana. Germanis, Wasser Hirsen / vel Wasser Eirsen. Hispanis, Lenteya della goa. Gallis, Lentille de mer.

LENS PALVSTRIS.

FORMA.

DIOSC. Muscus est aquæ innatans, folijs lenticulæ similibus.

LOCVS.

Idem. Inuenitur in aquis non fluentibus.


QUALITATES.

Galen. 8. Humidæ, frigidæque temperaturæ est, utrinque; ex secundo quodammodo ordine.

VIREs.

DIOSC. Illinitur conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, tum per se, tum cum farina hordeacea. Glutinat & puerorum interanea. Scillitica eius aqua (quorundam testimonio) datur commodissime ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres: præstat quoque ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum, testiculorumque collectiones, antequam augeantur. Herba ipsa recens fronti adhibita, capitis dolores mulcet, ubi à calore prouenerint.

Matth.



LENS palustris altera. Italis, *Lente palustre del seme.*

LENS PALVSTRIS ALTERA.

FORMA.

Caulem gerit repentem, *Matth.* angulosum, à quo plura, per intervalla catenatim oriuntur folia, prælongis, ac tenuibus pediculis nirentia, quæ quaterna, crucis in modum sese pandunt, subrotunda. semen profert racemosum, in ipso caule, lentium ferè effigie, subnigrum, densum, durumque.

LOCVS.


Nascitur in paludibus, la- *Idem.* cubus, & cæteris stagnantibus aquis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Nihil habeo, de qualitatibus, & viribus, quod probare possim, non tamen ambigo, quin sit frigida humidæque temperatura.

Hhh 3

SEMPER-



SEMPERVIVVM, siue sedum maius, Græcis, Αἰζον μέγα. Arabibus, Beihalen, seu Hai alhalē. Italis, Sempreviuo maggiore. Germanis, Groß Haußwurz. Hispanis, Sempervivua, seu Terua puntera. Gallis, Jou barbe.

SEMPERVIVVM MAIVS.

G E N E R A.

Matth. Plura sunt semperuiui genera, Maius, Minimum, & arborefcens.

F O R M A M A I O R I S.


Diosc. Caules cubiti altitudinem implent: interdum excedunt, pingues, pollicari crassitudine, in cacumine linguæ similia: alia in terram conuexa, alia inuicem in capite stantia, ita, vt in ambitu effigiem imitentur oculi.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montibus, faxis, testaceis, & supra domicilia etiam feritur.

Q U A L I T A T E S

Gale. 6. Leuiter quidem desiccatur, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers; quare in eo plus ceteris abundat essentia aquea: Cæterum non mediocriter refrigerat. est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium.



V I R E S.

Diosc. Medetur igni sacro, nomis, vlceribus, quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni: folia per se, & cum hordeacea farina illita, podagris auxiliantur: succus illitus, capitis dolores mulcet: & præsertim si cum rosaceo infundatur: Datur potandum ad phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia: teretes tineas potus in vino excunt. subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: Idem oculorum lippitudinibus inungitur.

SEMPERVIVVM, seu Sedum minus, Græcis, *Αιζαρώνιδος*. Italis, *Semprevivo minore*. Germanis, *Klein Heupwurk*. Gallis, *lou barbe petit*.

SEMPERVIVVM MINVS.

F O R M A.

Caulibus provenit ab una **DIOSC.**
radice multis, tenuibus, cre-
bro foliatis: exilibus folijs,
rotundis, pinguibus mucro-
natis: caule à medio emican-
te palmum alto. umbellam,
herbidosque flores, & te-
nuis gerente.

L O C U S.

In petris, parietinis, & ma- *Idem.*
cerijs, nec non in scrobibus
opacis nascitur.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Folia eisdem cum priori, *Idem.*
viribus prædita sunt.



SEMPERVIVVM minimum, siue tertium, Græcis, *Αειζών* *ἔιδος* *τρίτον*. Arabib.
Halsebram, *Handrachabara*. seu *Tilafon*. Italis, *Herbagraffella*, siue *Semprevivo mi-*
nute. Germanis, *Wauer Pfeffer*.

SEMPERVIVVM MINIMUM.

F O R M A.


DIOSC. Folijs provenit pusillis,
 crassioribus, hirsutis, portu-
 lacæ proximis.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in muris, locis.
Marth. saxosis, & secus itinera.

**Q U A L I T A T E S , E T
 V I R E S.**

DIOSC. Visei excalfactoria, acris,
 exulcerans. Illita folia cum
 axungia, strûmas discutinnt.



SEMPER-

SEMPERVIVVM Arborefcens, primum: Italis, *Semprevivum Arboreo*.
SEMPERVIVVM ARBORESCENS.

F O R M A.

* Caulem profert fefquicubitalem, vel interdum altiore, craffum & frangi contumacem, carnofo obductū cortice, in quo folia carnofo fucculenta circundant enatos cauliculos in multos tenues pediculos diuifos fuffinentes luteos ftellatosq; flores, radice nititur in multas propagines diuaticata.


L O C V S.

In Orientis ac Græciæ provincijs, marisque Mediterranei Infulis, Creta fivæ Candia, Rhodo, Zacyntho, & alijs fpõte rectis innafcitur. Apud nos, imò etiam in Italia nonnifi in hortis cultioribus invenitur.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Huc refer quæ de maiore fedo dicta funt.*

Hhh 5. VMBI-



UMBILICVS Veneris, siue Acetabulum. Græcis, Κοτυλιδών ἢ καμβάλιον. Italis, *Bellico di Venere*. Herruscis, *Copertoiole*. Hispanis, *Scudettes*. Gallis, *Escudes*. Germanis, *Frauen Nabel* Nabel Kraut.

UMBILICVS VENERIS.

G E N E R A.

DIOSC. Duum est generum. Alterum acetabuli, alterum maioris sedis figura.

F O R M A P R I M I.


Idem. Folio est in acetabuli formam tornato, latenter concavo, breui cauliculo, in quo semen inest, radice oliuæ modo rotunda.

L O C V S.

Gale. 7. Nascitur frequens in faxis, *simp. me.* & verustis ædificiorum parietibus, & in oppidorum moenijis.

Q U A L I T A T E S.

Mistæ est qualitatæ, nempe humidæ subfrigidæ, & cuiusdam obscuræ adstringentis, & cum ea leuiter amaræ. vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit.



V I R E S.

DIOSC. Foliorum & radicum succus, cum vino circumlitus, instillatufve, contra genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus illiri auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat: folia cum radice comesa calculos frangunt, urinam cient, hydropicis exinelle dantur. Phlegmonas Erysipelatodeis: Erysipelata phlegmonodeis curant.

UMBILICVS Veneris alter. Græcis, Κουληδών ἑτέρος. Italis, *Bellico di Venere* secondo.

UMBILICVS VENERIS ALTER.



FORMA.

Pinguibus exit folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuiuo: adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores, & femina hyperici: radice maiuscula.

LOCVS.

Nascitur in saxosis montibus, & petris. *Matth.*

QUALITATES ET VIRE.

Facit eadem, quæ semperuiuum. *Diosc.*

CYMBA-

CYMBALARIA, *Ital.*, *Cimbalaria*.

CYMBALARIA.

F O R M A.

Matth.

Emuris comæ modo dependet, cauliculis numerosis, tenuibus, funiculi instar prælongis, lentisq;: è quibus folia prodeunt hederacea, pingua, longis pediculis adnexa: flosculis parvis lutescentibus, qui è tenuissimis quoq; pediculis exeuntes, clauicularum modo sese implicant.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in antiquis, viginosisq; ædificiorum parietibus, macerij, & saxis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Facultatis est humidæ frigidæque, cum adstrictione quadam.

V I R E S.

Idem.

Iis profectò hanc plantam pollere facultatibus, factò periculo constar, quibus primi generis coryledonem. sunt qui ea vrantur ad alba vteri profluvia, eandem recentem in acetarijs propinantes.

C E N S V R A.

Tametsi hæc planta Veneris umbilici viribus prædita sit, errant tamen, qui putant hanc ipsam herbam Veneris umbilicum.



URTICA. Græcis, *Αρτέμision*. Arabibus, *Huniure seu Angiara*. Italis, *Ortica*. Germanis, *Wessig* oder *Römisch Nessel*. Hispanis *Ortiga*. Gallis, *Ortie*.

URTICA.

G E N E R A.

Trium est generum. Prima asperior. Altera non æquè aspera, & tertia omnium minima.

F O R M A P R I M Æ.

Sylvestrior hæc est, asperior, latioribus, nigrioribusque folijs. semine lini, sed minore. Caule rotundo, aspero, hispidoque, ac pungenti: pilulas in caule gerit hirsutas, ac vrentes, in quibus semen gignitur.

L O C U S.

Prouenit calidis tractibus, aridis, & incultis locis.


Q U A L I T A T E S.

Semen, ac folia digerentis sunt facultatis, sed & quidam flatuosum obtinent, quo venerem extimulant: porro non vehementer calefacit, sed admodum tenuium est partium.

V I R E S.

Folia cum sale illira, canum moribus medentur, gangrenas, carcinomata, fordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: cum succo trita, & naribus indita, sanguinem fluentem cohibent. Ciunt menses trita, & cum myrrha supposita: procidentes vuluas restitunt, suo contactu: semen ex passo potum venerem stimulat, & vuluæ crâ patefacit, cum melle delinctum, orthopneæ, lateris, & pulmonum inflammationibus prodest: toracem expurgat. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, yrinâ mouent, inflationes discutiunt.

URTICA



VRTICA altera, Græcis, *Ἀζύγιος ἔρτα*. Italis, *Ortica volgare*. Germanis, *Ort*,
mein Brennessel.

VRTICA SECUNDA.

F O R M A.

Matth. Folijs prouenit alterius si-
milibus, verum non æque
asperis: semen profert rac-
mosum, ac minutum: caulem
quadrangulum, asperumq;
tactu acuto, ac pungente.

L O C V S.

Idem. Nascitur vbicunque.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S .


Idem. Iisdem cum altera est fa-
cultatibus: atqui peculiari-
ter seminis pulvis, sangui-
nem è cerebri membranis
manantem suppressit.

* Seminis huius in Offici-
nis Septentrionalium, cum
destituuntur Romanæ vrtice
semine, plurimus est vsus,
Folia vino incocta & pora
ventrem molliunt, flatu dis-
cutiunt, cholicos dolores sedant, (nisi obstructio illos genuerit) vrinam cient,
& renes purgant. Idem præstat & quidem efficacius in vino dulci coctum se-
men, vel ex melle sumptum. Aqua destillata ex vrticis vulnera mundificat si ea
lauentur. Radices in vino decoctæ, addito parum mellis tussientibus & asthma-
ticis prosunt, & pleuriticis, morbisq; ex viscosa pituita ortum habentibus.*



URTICA tertia, Græcis, *Αγλύκη τρίτη*. Italis, *Ortica minore*. Germanis, *Hei-
ter Nessel*.

URTICA TERTIA.



FORMA.

Folia profert cæteris simili- *Math.*
lia, sed longè minora, acutio-
ra, vrentioraque: caule do-
drantali, hispidiore, ac vren-
te, defloribus folijs, & in am-
bitu ferratis.

LOCVS.

Nascitur secus ædificio. *Idem.*
rum muros, in hortis, & fere
vbique.

FACULTATES ET
VIRES.

Non minus valet, quàm *Idem.*
cætera genera.

CARDIA-

CARDIACA, *Italis, Cardiacæ. Germanis, Herzhgeßpann/sive Herzhgeßerr. Gallis, Grippaume, seu Cheneuse.*

C A R D I A C A.

F O R M A.

Matth.

Facie vriticam quadantenus referre videtur, folijs tamen, quæ prope terram sunt, rotundioribus constat, & ranunculi ferè modo per ambitum laciniatis: caulem habet quadrangulum, ramis copiosis, pariter quadratis, in quibus bina vtrinque; folia, paribus intervallis ab imo, ad summum exeunt, sed minora, & per ambitum magis diuisa: flores in purpura albicant & verticillato ambitu, marrubij modo, caulem ambiunt. Radix in rubro pallefcit.

L O C U S.

Idem.

Prouenit in ruderibus: iuxta semitas, & propè vrbi-um mœnia.

Q U A L I T A T E S

Gustu vsq; adeo amarescit, vt faciliè existimari possit ad secundum excalfacientium ordinem, & ad tertium ficcantium accedere.



V I R E S.

Præstat (quorundam testimonio) ad omnes cordis affectus, ad conuulsos, ac resolutos: obstructions referat, vrinam ciet, & menses, pectus à pituita detergit. Lumbricos necat. foliorum farina, domestici cochlearis mensura in vino hausta, ægrè parturientibus mirificè opitulatur.

GALIOPSIS, Græcis, Γαλιόψις. Italis, *Ortica fetida*, seu *Ortica morta*. Germanis, Daubnessel. Hispanis, *Ortiga muerta*. Gallis, *Ortie*.

GALIOPSIS.



FORMA.

Folijs, & caule constat vr- Diosc.
ticæ similibus. tactu tamen *Matth.*
non mordentibus, floribus
purpureis, tenuibusq;, odo-
re fetido, ac graui.

Locys.

Prouenit in ædificiorum Diosc.
areis. in plateis, iuxta semitas,
& circa hortorum sepes.

QUALITATES, ET
VIREs.

Folia, caules, semen, suc- *Idem.*
cusq; duritias, & carcinoma-
ta dissipant: strumas, panos,
& parotidas discutiunt: oportet
bis in die tepidum ex aceto
cataplasma imponere, &
eius decocto fouere: ad putrescentia,
gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter
illununtur.

SCROFULARIA, Mille morbia, Ferraria, siue Castrangula. Italis, *Scrofularia*. Germanis, *Braunwurz*. * alijs, nescio quam ob causam, *Schwarz Dachs*, & *Wurmfrucht*. * Gallis, *Grande Scrolaire*.

SCROFULARIA.

F O R M A.

Matth.

Caules abvna radice mittit plures, sesquicubitales, angulosos, subrufescentes, in quibus folia insunt nigricantia, robusta, ad vetricæ faciem accedentia, per ambitum leuiter dēticulata, Flores mittit in cauliū ramorumq; summitatibus pusillos: purpureosq; galeæ faciem referētes, & semen in capitulo, vt in lino, & blactaria herba, rotūdo, acuro summa parte apice. Radicē habet magnam, albicantem, strumofam.

L O C Y S.

* Prouenit in humidiorib⁹ locis & interdum siccis etiam ad sepes & verustas maceries.*

Q U A L I T A T E S.

Matth.

Desiccat, extenuat, discutit, abstergit: est enim gustu amara, & subtilium est partium.


V I R E S.

Radix præstat recens ad strumas, & hæmorrhoidas sanandas, in quem vsum effoditur autumnio, & repurgata tunditur cum recenti butyro. & operculato fictili, vliginoso loco reponitur, bis quinq; aut pluribus diebus. mox lento igne colliquatur butyrum, & percolatum asservatur: quo postmodum præscripti morbi illinuntur. Idem illitum scabiem sanat: Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit. Siccæ radicis puluis impositus hæmorrhoidas siccæ. Idem drachmæ pondere porus, lumbricos ventris pellit.

C È N S V R A.


Cæcuriunt ad summum vsq; qui Scrofulariam Dioscoridis ocimastrum faciunt, nec minus aberrant, qui eandem Galiosim esse contendunt.

* SCROFUL.



SCROFULARIA foemina, Vulgo Germanis, Weiße Nachtschatt.

SCROFULARIA FOEMINA.



FORMA.

Similis est mari floribus, semine, folijs, caulibus, & odore. Sed magnitudine discrepat & colore, qui cauli folijsq; prorsus viridis est. Tota planta viri-
tutinem attingit, Radix paucioribus & interdum nullis ferè tuberculis prædita visitur.

LOCVS.

Ad fossas aquarum nascitur.

VIRES.

Curat vlcera & contusa si mane & sero continuis diebus in foco calefacta & contrita imponatur. idem præstat melius succus eorum cum melle decoctus.*

GALIVM, Græcis, Τάσισον. Italis, Galio. Germanis, Meger Kraut. Hispanis, Caila lecheyerna. Gallis, petit Muguet.

GALIVM.

F O R M A.

Diosc. Ramulum, foliumque habet aparine simillimum, rectum, florem luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum.

L O C V S.


Matth. Nascitur ferè vbiq; copiosum, ppe sepes, & secus vias.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Facultatem obtinet desiccatoriam, & subacrem. est autem flos boni odoris, & coloris lutei, vel albi.

V I R E S.

Diosc. Flos igni ambustus illinitur, & sanguinis profluvia sistit: radix venerem concitat: coma in lacte macerata, illud coaguli modo condensat, unde illi nomen.



SENECIO,

SENECIO, Græcis, *νεγελον*. Italis, *Cardoncello*, seu *Spellicciosà*. Germanis, *Creutz-
wurk*. Hispanis, *Bon varon*. Gallis, *Senesson*.

SENECIO.

GENERA.

Duum est generum: Maius, *Matth.*
& minus.

FORMA MINORIS.

Caniculo est cubitali, sub *Diosc.*
rubro, folijs sensim per extre-
mitates erucæ modo diuisis,
sed minoribus multò, luteis
floribus, qui celeriter disse-
cti, euanescent in pappos, ra-
dice superuacua.

LOCVS.

Nascitur maximè in mace- *idem.*
rijs, parietibus, & circum op-
pida.

QUALITATES.

Facultatem mistam obti- *Gal. 6.*
net, simul refrigerantem, & *simp. me.*
modicè digerentem.

VIRES.

Folia illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sa- *Diosc.*
nant. Quin etiam cum manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum
ijs, quæ nerui acceperunt. Illiri per se, aut cum aceto pappi, idem munus præ-
stant. verùm recentes è poti, strangulant. totus caulis si coctus ex passo potui
detur, stomachi dolores a bile contractos, perfanat.

APPENDIX.

Cùm autem hërba euidenter sit amara, vt siccet, abstergat, aperiatq; neces-
se est, quare nil mirum fuerit, si fœminæ Epoto foliorum succo, aut totius plan-
tæ decocto, remorantes menses sibi prouocent. ab anis edoctæ.

SENETIO maior, Italis, Cardoncello, seu Spelluciosa maggiore. Germanorum offic. Flos S. Iacobi: vulgari verò sermone S. Jacobs Blum.

SENETIO MAIOR, SIVE FLOS
S. IACOBI.

FORMA.

Matth.

Folia mittit erucae sylvestris æmula, per ambitum laciniata, nigricantia, amaro gustu, caulis illi est sesquicubitalis, artemisiæ similis, à medio ramosus, furculosusque. Flos in summitate aureus, qui flaccescens, in papposam euolat lanuginem, Radice est multifida ac breui.

Locvs.


Idem.

Nascitur in campestribus inculto solo.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem.

Excalfacit, siccatur, aperit, abstergit, digerit, & reliquas minoris Senetionis vires obtinet.



Muscus marinus, Græcis. Βέρον θαλάσσιον. Arabibus, *Tahaleb*, siue *Thabel*. Italis, *Corallina*. Germanis, *Weer Weefj* / seu *Weer Weefj*. Hispanis, *Malbor quiana*. Gallis, *Coralline*.

MUSCVS MARINVS.



GENERA.

Duum est generum: Dio- Matth. scoridis alterum, alterum vero Plinij.

FORMA PRIMI.

Gracilis, capillaceusq; pro- Idem. uenit caulis expers, colore cum siccatur subrufescente, falso sapore, odore concharum marinarum simili.

* Varia effigie hic nascitur ut ex pictura patet, colore quoq; discrepat, qui in alio ruber, in alio candidus in non-nullo etiam subluteus esse obseruatur.*

LOCVS.

Nascitur in scopulis testa- Diosc. ceisq;.

QUALITATES.

Compositus est ex terrena, Gal. 6. & aquea essentia, utraq; frigida, siquidem gustum adstringit, & calidis quibusdam illitus, ea euidenter refrigerat, & adiuuat.

VIREs.

Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi: podagras iuuat, quas refrigerare opus sit. Peculiari autem sicci dore, admirabilis est facultatis, ad teretes intestinorum vermes pellendos, potui datus drachmæ pondere ex passo, aut cum Ægyptiæ siliquæ pulpa.

APPENDIX.

Posse quidem marinum muscum, qui recens fuerit, refrigerare, facile cum Galeno, & Dioscoride concedam: quod verò siccum id efficere possit, quod gustu falso sentiat, non ita facile mihi concedendum videtur.

Myscvs marinus alter, Italis, Mosco marino di Plinio.

MVSCVS MARINVS ALTER PLINII.

FORMA.


Pli. li. 27. cap. 8. Bryon marina herba, sine dubitatione lactucæ folijs similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab ima radice exeuntibus folijs.

LOCVS.

Idem. Nascitur in scopulis, maxime testis terra comprehensis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Præcipua ei spissandi, siccandi; vis, & collectiones omnes, inflammationesq; cohibendi, præcipue podagræ, & quicquid refrigerare opus sit.



POTA-

POTAMOGETON, Græcis, Ποταμόγετον. Italis, Potamogeto. Germanis, See-
halbenkraut. Gallis, Herbe des estagnes, vel Esjy deaue.

POTAMOGETON.



FORMA.

Foliū fert betæ simile, hir- DIOSC.
surum, paululum superemi-
niens extraquam.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Idem.
aquosis.

QUALITATES.

Adstringit, & refrigerat si- Gal. li. 8.
militer polygono, sed essen- simp. me.
tia eius crassior polygono est.

VIRES.

Refrigerat & inspissat, pru DIOSC.
riginibus vtile, & contra ve-
terum vlcera nomas.

SAGITTA, Græcis, Πισάρα. Italis, Saetta. Germanis, Pfeilkraut.

SAGITTA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Folia habet robusta, sagittæ auriculatæ figura; pediculo triquerro, spongioso, sesquicubitali, maiori, aut minori pro aquarû profunditate, in quibus vivit: caulem habet rectum, lævem, rotundum, spongiosum: ramulos hic superius mittit, è quibus flores exeunt albi, tribus tantum foliolis circumscripti, è quibus capitula producuntur subpurpurea, hirsuta, nucis Ponticæ magnitudine, in quibus minutum gignitur semen, rotundo intus globulo inhærens. Radice nititur alba, multifida, fibrosa, plantaginis aquaticæ modo, cuius cognitionis sagitta esse videtur.

L O C U S.

Idem. Nascitur in aquis, cum stagnantibus, tum decurrentibus.

Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Idem. Temperamento est frigido, humidoque, & iisdem cum plantagine aquatica viribus pollet.



SAGITTA maior, Græcis, Πισάνα μέγα. Italis, Saetta maggiore. Germanis, Groß Pfeiltraut.

SAGITTA MAIOR.



FORMA.

Minori est per omnia similis, sed omnia quoque maiora spectantur: verum folia non usque adeo acuminata habentur. *Matth.*

LOCVS.

Nascitur, ut altera stagnantibus, & decurrentibus aquis. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Paribus alteri viribus præstat. *Idem.*

STRATIO

STRATIOTES millefolium, Græcis, Στάτιωτος χιλιδύλλοις. Italis, Millefoglia, Germanis, Garben. Hispanis, Millhojas yerua. Gallis, Millefeuille.

STRATIOTES MILLEFOLIUM.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Exiguus est frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit: folijs aucularum pennas imitantibus: breui admodum dissectoque foliorum exortu: folia sylvestre cuminū simulant, præsertim breuitate, breuiora paulò, densiore umbella, & pleniora: Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, & candidos.

L O C U S.

Idem. Nasclitur in asperis agris, præcipueque circa semitas.


Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Nonnihil habet adstrictio-
simp. me. nis, proinde & vulnera glutinare potest, & vlceribus esse vile.

V I R E S.

Diosc. Eximij est vsus ad vlcera v-
Matth. tera, recentiaq; , profluentem sanguinem, & fistulas. Datur

vtiliter foliorum succus ad sanguinis reiectiones. Idem præstat sicci farinae symphiti maioris, aut plantaginis aqua pota, eadem naribus indita, fluentem inde sanguinem compescit: dysentericis commodè infunditur, vnà cum suis ipsius succo. Herba recens tusa, pubique illita, mensum abundantiam compescit: Candida millefolij umbella, tusa, & cum sua ipsius aqua pota, aut caprino lacte, gonorrhæam in viris, in fœminis alba vteri excremēta cohibet. Atqui felicius auxiliatur, si cum corallio, succino albo, & ebore propinetur: foliorum, & florum farina vnciæ pondere, vnà cum Armeniæ terræ drachma, ex vaccino lacte pota, præstat mixum in modum ad sanguinis mictum: commanducata radix, diuque sub dente retenta, dolorem mulcet.



MILLEFOLIUM maius, Græcis, Στραπώνης χιλιόφυλλος μέγας. Italis, Millefoglia maggiore.

MILLEFOLIUM MAIUS.



FORMA.

Folia profert minoris similia, sed maiora, Tanaceto quædam proxima, caules quoque maiores, subhirsutos, atque grandiores umbellas: floribus in purpura albicantibus, odore medicato.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Idem.* collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ minus. *Idem.*

VERBA-

VERBASCUM, Græcis, *καλυσ*. Officinis, *Tassus barbassus*. Hetruscis, *Barbassus*. scythio. Cæteris Italis, *Tasso barbasso*. Germanis, *Weiß Wulstraunt*. Hispanis, *Verbasco*. Gallis, *Bouillon*.

VERBASCUM.

G E N E R A.

Matth. Plura Verbasci numerantur genera, ut ex appictis iconibus palam fiet.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Primum, quod fœmina vocatur, folia habet brassicæ, pilosiora multo, & latiora; candidioraque: caulis illi albus, cubitalis aut amplior, subhirsutus: flores ex luteo pallescentes, semen nigrum, radix lœga, gustu acerbâ, crassitudine digiti.

L O C U S.

Idem. Nascitur in campestribus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Radix gustu acerbâ est, & *simp. me.* fluxionis affectib. prodest, at tamen folia digerendi vim habet: omniũ. n. folia desiccandi, & digerendi vim habent.

V I R E S.

Diosc. Radix datur ludicri tali magnitudine cõuenienter ex vino, in alui profluuiio. Decoctum dentium dolorem colutione mitigat. Omnia genera, sed fœmina magis, sedis


Matth.

ferè morbis omnibus subuenit: seminis & florum farina, larigna resina excepta, cum anthemidis floribus, procidentem sedem suffitu cohibet, & tenasum in dysentericis sanat, fœminæ radice succus, anteaquam caulescat, duarum drachmarum pondere ex vino Cretico haustus, in ipsa accessionis hora, quartanam fugat, sed ter, quaterve id repetendum est. Succus tam foliorum, quàm florum asperis verrucis illitus, eas deler. Folia tusa, cineribusque calefacta, sanant panos, quos bubones vocat: stillatitia florum aqua, oculis instillata, fluxiones cohibet, & illita faciei ruborem tollit: eoque magis si caphuræ tantillum adijciatur. Flores vnâ cum oui vitello, & mica panis, ac porri folijs illiti, perbellè præstant ad cohibendas tumentes, dolorificasque hæmorrhoidas.



VERBASCUM mas, siue secundum, Græcis, φλέβο ἀππλωρόνδης. Italis, Tasso bar-
basso maschio.

VERBASCUM II.



FORMA.

Oblongius est, albis folijs, DIOSC.
angustioribusque : tenuiore *Matth.*
caule. Floribus in cacumine
minoribus, pallido colore.
Radice minori, minusq; car-
nosa.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Matth.*
exoluto solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem præditum est viri-
bus, quibus & fœmina.

VERBA-

VERBASCVM tertium; Græcis, ὀλίμο & ῥίλι μέλας; Italis, Tasso barba minore.

VERBASCVM III.

FORMA.


Matth. Folia profert nigriora, oblongiora, saluix fere modo aspera, sed latiora: caulibus rotundis, robustis, tenuioribus; floribus in cacumine spicatis, aureo colore.

LOCVS.

Idem. Prouenit & hoc quoq; in campestribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Eadem cum alijs habet vires.



VERBA-

VERBASCUM sylvestre, Græcis, Φλόμ & ἀγρία. Italis, Tasso barbasso saluatico.


VERBASCUM SYLVESTRE.

F O R M A.

Folia fert Saluiæ, altas vir- DIOSC.
gas, & lignosas, & circa eas ra-
mulos, quales marrubium, flo-
res luteos, auri æmulos.

L O C U S.


Nascitur in campestribus, Matth.
& apricis montibus.



Kkk

VERBA-

Verbascum aliud est, cuius
folia corniculati papaveris
modo prodeunt per ambi-
tum sinuata: Ideoq; recte Di-
oscorides huiusce papaveris
folia, verbasco similia fecit.



PRIMULA VERIS, nonnullis, Brache Cuculi: Quibusdam Herba paralyfis.
 Italis, Fiore di Primauera. Germanis, Schlüsselblumen. Gallis, Primeuere, seu
 Brages de Cocu.

PRIMULA VERIS.



G E N E R A.

Duum est generum, alte- Matth.
 rum odoratum, alterum ino-
 derum.

F O R M A P R I M Æ.

Folia proferit lactuæ qua- Idem.
 dantenus similia, oblonga, ru-
 gosa: Labri vèneris ferè mo-
 do, humi iacentia, è quorum
 medio cauliculus exit dodran-
 talis, atq; incanus, è cuius fa-
 stigijs, flores, exeunt complu-
 res lurci, per ambitum fim-
 briati odoratique, vt in vris
 auricula, quam & radice quo-
 que imitatur.

L O C U S.

Prouenit secus vias, pro- Idem.
 pter sepes, & in pratis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Tota planta articularibus Idem.

morbis auxiliatur. Radicum decoctum renum calculos eijcit: præstat idem
 additis saluia, & amaraco ad frigidos neruorum, & cerebri morbos: quare re-
 solutis ac tremore affectis potum confert: epotus foliorum succus, ac etiam il-
 litus fractis, luxatisq; ossibus confert. Stillatitia florentis plantæ aqua commen-
 datur ad animi deliquium. flores illinuntur aduersus scorpionum ictus. Herba
 ipsa, aut flores, aut radices, trita, & illita vulnera glutinant. Mulieres è floribus,
 & polygonati radicibus in albo meraco maceratis, stillatitiam aquam faciunt
 ad faciei nitorem conciliandum.

Iisdem nominibus appellatur, quibus, & altera.

PRIMULA VERIS ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folia profert latiora, & in cacumine rotundiora, humi pariter accubantia, crispa, rugosaque, ac magis tenera: caule verò, floribus, ac radicibus, ab altera non differt.

L O C V S.


Idem.

Nascitur iisdem in locis, & frequenter in sylvis herbosis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.


Easdem, quas altera possidet vires, imbecilliores tamen.



BLATT-

BLATTARIA, Dioscoridi verbasum aurei floris. Italis, *Blattaria*. Germ. *Wascen* oder *Schabenfraut*/Goldt Knopffliut.

BLATTARIA.



FORMA.

Herba est similis verbasco, *Plinius*. folijs minus candidis: caulicu- *Matth*. lis pluribus, flore luteo. Semine capitulis concluso lini modo, sed durioribus.

LOCVS.

Nascitur in campestribus. *Matth*.

QUALITATES.

Sapore est amaro, exal- *Idem*. ciens, & siccans.

VIREs.

Herba prostrata blattas in *Plin*. se contrahit.

* Farctus quoq; viscerum, melsaraicarumq; expedit. *

ÆTHIOPIS, Græcis, *αἰθίοπις*. Italis, *Etiopæ*, & *Etiopide*.

ÆTHIOPIS.

FORMA.


Diosc. Folia habet verbasco similia, per quam hirsuta, densaq; in orbē circa radicem imam redacta: caulē quadrangulum; scabrum similem apiastro, aut arctio, multis concaumalis. semen erui magnitudine: geminum in vno conceptaculo: Radices ab eodem cespite numerosas, longas; crassas, gustu glutinosas, quæ sicca nigrescunt, duranturq; vt cornua imitari videantur.

LOCVS.

Idem. Plurima nascitur in Ida, & in Messenia.

QUALITATES, ET
VIRES.


Idem. Auxiliatur purulentis excreationib⁹, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs decocta radix, & pota, quin etiam cum melle Eclegmatis vicem præbet.



PERSO-

PERSONATA, Græcis, *Agēēr*. Officinis, *Bardana*, Italis, *Lappola maggiore*. Germanis, *Groß Kletten*. Hispanis, *Bardana*, seu *Pagamacera mayor*. Gallis, *Glocheron*, seu *Bardana*.

PERSONATA.



FORMA.

Folia habet cucurbitæ ma- *Matth.*
iora, nigriora, hirsutiora, cras-
sioraq; caulem crassum, angu-
losum, albicantem, sesquicubi-
ralem, atq; ramosum, fructu co-
pioso, echinato, non magno, a-
culeis repandis, vestibus perti-
naciter inhaerentibus. Floribus
purpureis, semine cnici mino-
re. Radice longa, vegeta, intus
candida, foris nigra.

Locvs.

Nascitur passim in agrorum
marginibus, secus itinera, & fe-
rè vbiq;.

QUALITATES.

Discutit simul, & desiccatur, & mediocriter adstringit.

VIREs.

Gal. 6.
simp. me.

Radix drachmæ pondere, cum pineis nucibus pota, purulenta, & cruenta *Diosc.*
extussientibus auxiliatur: trita dolores à contritione arctuum contractos, illitu
sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur. Semen potum calculosis au- *Matth.*
xiliatur. Idem facit radicis decoctum infusum.

PERFOLIATA: *Italica, Perfogliata.* Germanis, *Durchwachß.*

PERFOLIATA.

FORMA.

Matth.

Folia profert subrotunda, pingua, sed in acutum definentia, pisi ferè modo: venis compluribus secundum longitudinem protensis. caulis illi est gracilis, glaber, rotundus atq; etiam ramosus: folia, quæ in caule, & ramis sunt ab ijs umbilicotenus transfiguntur, magno naturæ artificio: quare putarem ego, ut perforata magis, quàm perfoliata dici deberet: flores gerit aureos, è capitib⁹ quibusdam prodeuntes in stellæ modum: semen nigrum, paruum psyllij modo pellucidum.

LOCVS.


Idem.

Nascitur invineis, campis, & alijs quoq; locis, & in agrorum limitibus.

QUALITATES, ET
VIRE S.

Idem.

Gustu est subamaro, & adstringenti. Datur herbæ decoctum ex vino paratum, aut folia in pulverem trita, ad internas affectiones, & ad rupta: quare bibuntur commodè ad umbilici eminentias, & enterocellas. illita strumas quoq; resoluunt.



ELLEBORINE, Græcis, Ελεβορίνη. Italis, Elleborina.

EPIPACTIS SIVE ELLEBORINE.



F O R M A.

Parua est herba, & exiguis fo- DIOSC.
lijs.

L O C U S.

In Asia, & Græcia nascitur. Idem.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Iocinoris virijs vtilis, & con- DIOSC.
tra venena pota.

A P P E N D I X.

*Difficile est coniectu, quænam sit Helleborine Dioscoridis, cum tantilla vel nulla ferè ipsius descriptio habeatur. Itaq; substituta fuerat ab autore, eius loco Herba quædam hoc nomine insignita, quod nigri veratri quadantenus effigiem referret, & similes quoque radices haberet. Ea cum viua nobis nondum cõspecta sit, ideoq; exactior depingi haud potuerit, maluimus

elegantem hanc plantam hic apponere, congenerem ei quam plures alij sub Helleborines appellatione exhibuere, quæque nusquam non reperiri potest in locis humidis. Hæc verò, cuius imago hic visitur, etiam palustria & lacus amat, & pratis irriguis familiaris est, flore Orchidũ, sed ternis foliolis ad seminis conceptaculum annexo, suppurpureo, interdum pulcre rubẽte, aut etiam penitus albo, huic semina subnascuntur planè vt in orchidibus: folijs & pene etiam radicum fibris Helleborum album imitatur, vnde vulgaris ei notio tributa fuit.*

FUMARIA, Græcis, Καρύδς. Officinis, Fumus terra. Arabibus, Scheiterig, sine
beteregi. Italis, Fumoferno. Germanis, Erdtrauch/Ragentörbel. Hispanis, Pa-
lomelha. Gallis, Fumeterre.

FUMARIA.

G E N E R A.

Math. Duum est generum. Ma-
ius, & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Fruticosa herbula est, pre-
tenuera, coriandro similis, fo-
lijs candidioribus, vndiq; nu-
merosis, cineracei coloris,
flore purpureo.

L O C U S.


Math. Nasclitur in hortis, vineis,
& campis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Acris simul, & amare qua-
simp. me. litatis est: nec tamè planè ex-
pers est acerbæ: quamobrem
vrinam biliosam multam tra-
hit.

V I R E S.

Diosc. Oculis claritatem facit, delachrymationemq; succus instillatus. Manducata
Math. herba biliosam vrinam trahit. Attenuat, penetrat, obstructions aperit, ac de-
iectoriæ est facultatis, cohibet, aggregat, & roborat. Alnum facile ducit, bilem
trahit, & adustos humores: vis eius non modo ad iecur, sed ad venas permeat,
quarè sanguinem expurgat: medetur elephantiasi, carcinomatibus, lichenis, &
cæteris cutis infectionibus: quin etiam omnib. ferè morbis ex viscerum infar-
ctu prouenientibus: ventriculū, iecur, lienem, & cætera interna viscera robo-
rar, biliosasq; finit febres: & quæ à vasorum obstructione excirantur.



FUMARIA altera, Græcis, Καρύδς ἑτέρα. Italis, Fumofterno maggiore. Germanis, Holwurk.

FUMARIA ALTERA.



F O R M A.

Planta est fruticosa, præter- *Matth.*
nera, folijs coriâdri, cineracei
coloris: flore purpureo. Radi-
ce tuberosa, inani, buxco intus
colore: odore aristolochiæ.

L O C V S.

Prouenit in hortis, & sege- *Idem.*
tibus hordeaceis, & propter
sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Radix amara est, & ea omnia
potest vnâ cum herba, quæ al-
tera Fumaria. Radix ex vino
pota, venenis, & pestilentiæ me-
detur: sudorem, & vrinâ ciet,
& ictericos iuuat: semen bibi-
tur ad diurna alui profluvia.
Radicis farina, manantia quæ-
libet vlcera exiccat, & mûdat.

C E N S V R A.

Non rectè sentiunt Germani medici, ac pharmacopæi, qui hæc plantam ro-
tundam esse Aristolochiam putant. Alij verò pistilochiam.

CORYDÆ-

CORYDALIS, Græcis, Κορύδαλις. Quibusdam splir. Italis, Coridala.

FVMARIA CORYDALIS.

FORMA.

Matth. Foliagerit coriādri, sed minora, tenuioraque: canles exiles, compluribus ramusculis: floribus in summitate auicularum speciem referentibus: radicibus numerosis, tenuibus, prælongis, ac subalbican-
tibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit in collibus cultis, & agris, * præsertim in Illyria. *

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Præstat vniuersa planta ad colicos dolores, siue recens manducetur, siue sicca in puluerem sumatur ex vino pluribus diebus.



LOTVS

LOTYSVRBANA, Græcis, Λοτὸς ἡμεῶν. Italis, Tribolo, seu Trifoglio Canallino. Germanis, Steinflee.

LOTYS VRBANA.



FORMA.

Caules edit bicubirales, ac Diosc. etiam maiores, rectos, firmos, Matth. ramosos, & in his folia trifolij præfisis æmula, leuiter per ambitum denticulata, beneq; olentia: flores edit racemosos, tenues, paruosq; luteo colore, aut albo, odoratosque.

LOCVS.

Nascitur in hortis, pratis, Idem. agris, & vbique ferè locorum.

QUALITATES.

Vt mediocriter cōcoquen- Galen. 7. di vim possidet, sic etiam exiccandi in caliditatis, frigiditatisque coniugatione, media quodammodo est, & temperata.

VIRE.

Extractus succus, addito Diosc. melle, oculorum argemas, nubeculasque, ac cæteras caligines discutit. Vfur- Matth. patur tota planta vnguentarijs, quod odoratam ex ea faciât aquam, in qua chirothecas macerant, ac lauant.

LOTYS

LOTVS sylvestris, Græcis, λωτὸς ἀγρίος. Italis, Loto saluatico. Arabibus, Hando choca. Germanis, Sibengezeit.

F O R M A.

Diosc. Folijsh prouenit trifolijsh præ-
Matth. tens, caule cubitali, & sæpe
 maiori, alis multis (floribus in
 capitulis cæruleis) semine fæ-
 nogræci, sed longè minore,
 odore medicato.

L O C V S.

Diosc. Plurimum in Lybia nasci-
Matth. tur. Nascitur copiosum et-
 iam in Boemia.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen secundi est ordinis
simp. me. exalfaciētium, habetq; non-
 nihil absterforium.

V I R E S.

Diosc. Vitia cutis in facie, macu-
 lasq; cum melle peruncta ex-
 purgat: trita per sese, aut cum
 maluz semine, bibitur aptis-
 simè cum vino, aut passo con-
 tra dolores, qui vesicam malè habent.

LOTVS SYLVESTRIS.



CUTISVE

CYTISVS: Græcis, Κίσθος. Italis, Citiso. Germanis, Geyfflee.

C Y T I S V S.

F O R M A.

Frutex est albus, in totum ut Diosc. Rhamnus, ramos spargens cubitales, & maiores, in quibus folia fœnogræci, minora, dorso medio prominente: Ea digitis trita, crucam olent, gustatuque cicer recens sapiunt.

L O C V S.

Nascitur sponte in Campania Matth. prope Neapolim.

F A C U L T A T E S.

Folia digerédi facultatem ob- Gal. li. 7. tinent, aquæ temperatæ mistam, simp. me. sicut & malvæ folia.

V I R E S.

Folia refrigerant, tumores inter initia discutiant, si cum pane trita illinantur. Decoctum potum, urinam ciet: nonnulli, quod apes alliciat, prope alucaria ferunt.

M Y R I O-



MYRIOPHYLLUM, Græcis, Μυριοφύλλον. Italis, Miriofillo. Germanæ, Fenchelgarb.

F O R M A.

Matth.

Myriophyllum, siue millefoliū, cauliculus est tener, singularis, vnica nixus radice, plurimis folijs, læuibus, sceniculo similibus, caulis flavescit, varius, ac veluti ex industria deliniatus.

L O C U S.

Idem.


Nascitur in palustribus.

Q U A L I T A T E S.

Vsq; ad eò desiccatoriæ est facultatis, vt vulnera glutinet.

V I R E S.

Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum; ex aceto oblinatur, præcipitatis in potu cum aqua & sale datur.



MYRIO-

MYRIOPHYLLVM ALTERVM.

Si quis hanc Myriophylli
plantam nouerit. cuius hic
imago uisitur, is facile Myrio-
phyllum Dioscoridis esse con-
sentiet. & præsertim cum in
palustribus nascatur.



MYRRHIS, Græcis, *Μύρρις*. Italis, *Mirrada*. Germanis, *Welscher Korb*.

MYRRHIS.

F O R M A.

PROSC. Simillima est cicuta, caule, folijsq;: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis.

L O C U S.

Idem. Nasçitur in hortis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Radicem habet odoris iucundi, & dulcis: exalfacit ordine secundo, adiuncta quadam partium tenuitate.

V I R E S.

PROSC. Radix in vino pota, phalangiorum morfibus auxiliatur: cit menses, partus, & secundas, purgatque à puerperio fœminas: subuenit & tabidis cocta in sorbitione. Adjunt quoq; eandem bis die, teruè potam ex vino, in pestilentia salutarem esse. & ne morbi contagia sentiantur obitare.

C E N S U R A.


Non defunt, qui vulgare Cerofolium Myrrhim faciant. verùm cum caulis cicutæ non sit, nec radice vsus, sed foliorum: ijs profectò subscribere nequeo.

ANGE-



ANGELICA, Italis, *Angelica*. Germanis, *Angelica*. Gallis, *Angélique*.

ANGELICA.



GENERA.

Duum est generum, sativæ, *Matth.* & sylvestris.

FORMA SATIVÆ.

Caulem edit geniculatum, *Idem*. cubitalem altitudinem excedens, inanem: multis alarum cauis: folia oblonga per ambitum serrata, umbellam magnam, albis floribus referat: semine tenui, lentis modo compresso: Radice crassa, complurimis adnatis fibris longis, nigricanti colore, eximio odore præditis, sapore acri ac subamaro.

LOCVS.

Seritur, coliturque in Ger- *Idem*.mania in campis, præsertimque in Misnia, & Saxonia.

QUALITATES.

Radix cuius est vsus, acris *Idem*. est, atq; amariuscula. Quare manifestò excalfacit, & siccat, ordine secundo completo, aut tertio incipiente: proinde aperit, attenuat, discutit, penetrat, incidit, & flatu pellit.

V I R E S.

Radix venenis mîrificè aduersatur, manditur aduersus pestilentia contagia: *Idem*. per se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit, & cruditates concoquit: Idem præstat radice decoctum, & tussientibus ex frigore, celeriter auxiliatur. Eodem epoto dissoluuntur sanguinis grumi: Radicis farina datur vtiliter in omnibus frigidis affectibus. valet ad rabiosorum; & venenatorum morsus; tam intrus sumpta, quam exterius cum ruta imposita. mansa, & dentium cauis indita, dolores sedat. Anhelitum aded commendat, vt præsumpti allij odorem facillè occultare valeat.

ANGELICA sylvestris: Italis, *Angelica saluatica*. Germanis, *Wilde Angelik*.
Gallis, *Angelique sauvage*.

ANGELICA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth. Pumilior est omnibus suis partibus, sed viribus longè præstantior: Radicem proferit minorem, paucis fibris, quæ secta liquorem subuiren-tem mittit, acerrimi gustus, & qui lachrymas eient.

L O C U S.

Idem. Nascitur plurima in altissimis montibus, in pratis, & pascuis amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Cum acerrimi sit gustus, longè valentius, quàm domestica excalfacit, & siccat. Quare ad quarti ordinis principium accedit.

V I R E S.

Omnia præstare potest, quæ domestica, sed longè valentius. cæterùm non adeo copiosius ea vi præstabit, quòd nimis corpus accendat. mansa enim os, linguam, & fauces maximè vrit, atq; inflamat.



PSEUDOMYAGRUM, *Italica, Miagro falso.* Germanis, *Lein Dotter / Fincken*
Samen.

PSEUDOMYAGRUM.



FORMA.

Caulem edit cubitalem, *Matth.*
 ramosum: & folia, quæ in eis
 sunt, glasti, aut thlaspi qua-
 dantenus similia: floribus in
 summitate albis, tenuibusq:
 semine paruo, dulci.

LOCVS.

Nascitur in campis inter *Idem.*
 linum, & frumenta.


QUALITATES

Modicè excalfacit: atque *Idem.*
 humectat.

VIREs.

Accedit omnino ad fesa-
 mi vires semen: paratur pari-
 ter ex eo oleum, ad similes fa-
 cultatis. Semen quoque est
 auroculis gratissimum.

Plures species Myagri putati notari possunt è quibus duæ hæ notiores. Vna longe tenerioribus virgulis, quam vulgaris, nascitur, sed cultura fructuosior fit, & semen minus in vasculis vegetioribus ni profert, & quia rarior est, Myagri Turcici nomen sortitur ab hortulanis. Hæc inueniuntur alia quædam exilior, vasculis rotundioribus, quæ aliquibi in aruis sponte nascitur.*



CIRSIVM, Græcis, Κίρσιον. Italis, Cirsio.

CIRSIVM.



F O R M A .

Caulis est tener, triangula-
ris, bicubitalisq; ab imò folijs
rosæ speciem referentibus,
angulis spinosis, per interual-
la mollibus. Folia ei buglosse
similia, longiora, subcandida,
modicè hirsuta, per extremi-
tates aculeata: cacumen cau-
lis orbiculatum, hispidum, in
quo capitula in summo pur-
purea, quæ in lanugines sol-
vuntur.

L O C U S .

Nascitur vlginosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S .

Radix laboranti loco adal-
ligata, dolores varicum sa-
nat.

ASTER Atticus, siue Bubonium. Græcis, *Ἀστὴρ Ἀττικὸς*. Arabibus, *Astaricon*. Italis, *Asterarico*. Germanis, *Stern Kraut*. Gallis, *Petite espargouille*, seu *petite Mugue*. Vergilio, *Amellus*.

ASTER ATTICVS.

F O R M A.

Matth.

Caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fusco lutescente; è quibus circa cacumen ramuli oriuntur tenues, in quorū summitate flores spectantur, ut in Anthemide, & Belli: sed in medio lutei, & per ambitū purpurei. Folia profert oblonga, oliuæ figura, minora tamen, aspera, hirsuta, nigricantia, aspero sapore, ac iubamaro, radicem habet multifidam, odore non ingrato.



L O C V S.

Idem.

Nascitur in asperis, incultis, collibus, & conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6.

Mistæ est facultatis, uti romp. me. sa, verum id non adstringit.

V I R E S.

Diosc.

Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus; proci duæ sedi, ac inguinibus illita auxiliatur: tradunt quoque purpureum in flore, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitialibus, opitulari. Herba ipsa recens illita, inguinum bubones, inflammationesq; curat. Cum veteri axungia tusa, imponitur vtiliter rabioforum canum moribus: & incensa serpentes fugat.

Cræteus.

* *ASTER Atticus cæruleus alpinus.*

F O R M A.

Flores promit cæruleos ut prior, folia quoque priori non dissimilia, radice se propagat, sed tamen papposa quoque semina gignit, & interdum globuli tumentes villosi prope radicem adnascuntur foliolis, estque omnino minor vulgari Astore.



ASTER ATTICVS ALTER.


FORMA.

Visitur facies, ex icone suæ
 ipsius plantæ: nos tamen eam de-
 lineandam duximus, vt etiam a-
 liorum possit esse iudicium: cæ-
 terum nos priorem omnino pro-
 bamus. Et præsertim cum in hu-
 ius flore nihil purpurei habeat-
 ur.



*ASTER

**ASTER* Luteo flore, alijs *Conyza* species.



FORMA.

Caules profert mediocres per quædam interualla radicis repentis & se propagantis ab inferiore parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odoratæ sunt, sapore aromatico modice ad cinamomi saporem accedente, subacri. In summis caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flores lutei disco in medio apicibus confertò insident, qui tandem in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta nullo pediculo duabus quasi alis eisdem amplectuntur.

LOCVS.

Nascitur in saltibus.*

STELLA.

STELLARIA, siue pes Leonis, siue Alchimilla. Italis, *Stellaria*. Germanis, *Synnarw*. Gallis, *Pied de Lyon*.

STELLARIA.

FORMA.

Matth.

Folijs prouenit maluæ similibus, robustioribus tamen, ac magis carinatis, octonis circumquaque angulis. Et per ambitum denticulatis adeo, ut patefacta, stellæ imaginem referant: caulis, et tenuis, semicubitalis, lanuginosus, à quo còplures exeunt rami, in quorum summo flores emergunt subpallidi, tennes, stellarum effigie. Radice cohæret digitali crassitudine, sapore adstringenti.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in montibus, in pratis, & pascuis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem.

Exiccac, cohibet, atq; conglutinat: pota efficax est ad interna vulnera. quin etiam externa illita glutinat. Aridæ farîna in sui ipsius decocto hausta, enterocellis medetur. Conceptum adiuuat, & steriles fœcundas reddit hausta continuis viginti diebus cochlearis mensura ex vino, ubi præsertim sterilitas ab uteri humiditate prouenerit. quare datur quoq; vtiliter ad alba uteri profluvia.



* STELLA-

**STELLARIA argentea*, vel *Argentaria petraea*, vel *Alchimilla minor*, *Heptaphyllum montanum*. Germanis, *Bergsinnar*, *Steinsinnar*.

STELLARIA ARGENTEA.

FORMA.

Folia habet stellata radiatq; , inferna parte argenteis pilis nitentia, ut plurimum septena in unius pediculi summitate coherentia, flores in corymbis pallidos, ut vulgaris *Alchimilla*.

LOCVS.

El locis saxosis montium in hortum translata, quouis loco facillime diutissimeque viret.

QUALITATES.

Incompertae facultatis est, nisi sit exiccantis & astringentis, atq; adeo ad vulnera conglutinanda efficax, ut prior.*



VIOLA.

Viola purpurea, Græcis, *ἰὼν πορφυρεή*. Arabibus, *Seneffige*, *Sonofrig*, seu *Benese*. segi. Italis, *Viola*, & *Viola Mammola*. Germanis, *Mertzen* *Violen*. Hispanis, *Violetta*. Gallis, *Violette*.

VIOLA PURPUREA.

FORMA.

DIOSC. *Viola* purpurea folium habet hederae maius, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile, cauliculus à radice medius prodit, in quo strobilus suavissimè olens purpureus.

LOCVS.


DIOSC. Opacis, & asperis nascitur Matth. propter sepes, & sec^o itinera.

QUALITATES.

Galen. 6. Folia aqueam, & subfrigida substantiam superantem possident. **sim. me.**

VIRES.

DIOSC. Refrigerandi naturam habet. Illinuntur folia per se, aut cum hordeacea farina aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; procidenti. Refrigerant, & humectant ordine primo, sed siccae minus. Humiditas, quæ superflua recentibus inest aluum emolliendo ciēt, siccae verò deiectionis sunt facultatis, non quòd emolliant, sed quòd dissoluant. In summa soporifera sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Bilem educunt, eiusq; feruorem mitigant, conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauit; somnum conciliant. Pectoris, & tracheæ arteriæ scabriciem leniunt. Medenturq; anginis, & columnellæ vitijs. Præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus, sicutq; arcent.



VIOLA arborescens, * vel potius erecta. * Italis, *Viola arborea*.

VIOLA ARBORESCENS.



FORMA.

Crescit hæc duorum cubi- *Matth.*
torum altitudine, pluribus
ab vna radice sublati cauli-
bus, in quibus folia violæ pur-
pureæ angustiora, per ambi-
tum denticulata, atque pari-
bus intervallis distincta, flo-
res edit purpureos, consoli-
dæ regalis vocatæ haud abfi-
miles, odore purpureæ violæ.

LOCVS.

Nascitur in Baldo monte *Idem.*
in agro Veronenſi.

IACCEA,

IACCEA, seu herba Trinitatis. Græcis, *δὲ τὰς τρεῖς*. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri*. Germanis, *Freyssamtraut*/ *Sibensfarben Blümlin*. Gallis, *Pensées*, aut *Menues pensées*.

IACCEA, SIVE FLOS TRINITATIS.

GENERA.

Matth. Duum est generum, Maior, & Minor.

FORMA MAIORIS.

Idem. Folijs exit primo exortu rotundis, per ambitum serratis, quæ ramen per incrementum in longitudinem protenduntur. caulibus constat triangularibus, quadantenus striatis, inanibusque, quibus geniculâ supereminet paribus interuallis, è quorum alis ramusculi exoriuntur, à quibus flores exeunt violæ purpureæ magnitudine tribus refertî coloribus. Sunt enim supernè purpurei, in medio candidi, & ima parte lutei, sed penitus inodori.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campis, & passim feritur in hortis, & viridarijs.




QUALITATES ET VIRES.

Idem. Sunt qui hanc ad enterocellas pollere credant, atque ægrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus opem ferre, quin etiam scabiem sanare, & cætera cutis vitia delere.

IACCEA, siue herba Trinitatis altera. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri minori*. Germanis, *Wild Freysam Kraut* / *Stiehmütterlin*.

IACCEA ALTERA.



FORMA.

Crescit hæc minoribus, ac breuioribus *Matth.* tum folijs, tum floribus, qui tamen non tribus, sed duobus tantum constant coloribus, candido videlicet, & lutescente.

LOCVS.

Nascitur pariter iisdem in locis, & feritur in horris.

Mmm

Bvglos-

BYGLOSSVM, sine **Borrago**, Græcis, *βούλαρον*. Mauritanis, *Lifenaltliaur*. sine *Lefenaltliaur*. Italis, *Borragine*. Germanis, *Durretsch*. Hispanis, *Borraia*, *Borraienes*, *Borraies*. Gallis, *Borrache*.

BYGLOSSVM, SIVE **BORRAGO**.

F O R M A.


Matth. Folijsex latis, atq; oblongis, asperis, eminentibus vbiq; bullis, renuissimis armatis aculeis, qui totam plantam hispida ac rigida reddunt, aculeato vndecunque ambitu. Caule est cubitali, & quandoque maiori, pingui, concauo, aculeis vbiq; scatente, ramis multis brachiato, floribus in stellæ modum radiantibus, cæruleo colore, & quandoque candido, nigro è medio prominente apice, semine nigro, striatoq;.

L O C V S.

Idem. Nasceitur per se passim in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Humida, calidaq; temperiei est. Itaque vinis iniectum lætitiæ, ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & his qui ob faucium asperitatem tussunt, coctum in mellicrato conuenit.



V I R E S.

DIOSC. Herbam abscessibus vtilem esse volunt. Herba, & radici vis sanè magna est, quinetiam & floribus ad animi deliquium, & ceteros cordis affectus, atque melancholicos morbos, & præsertim eorùdem decoctum ex vino, aut ex aqua paratum. Succus foliorum potius valet, contra lethalia pharmaca, & venenorum animalium ictus. stillaticia totius plantæ aqua delirij, quæ cum febre sunt, mirifice subuenit, quin etiam oculorum inflammationes mulcet, tam interius, quàm exterius imposita.

BUGLOSSVM vulgare, Italis, *Buglossa*. Germanis, *Ochsenzung*. Gallis, *Buglose*.

BUGLOSSVM VVLGARE.



VIREs.

Duocius sunt genera, Hor. *Matth.* tenſe, quod maius, & minus eſt, & ſylueſtre quod pariter duas habet ſpecies. Altera quidem minori hortenſi ſimilis, Altera flore nigro.

FORMA HORTENSIS.

Folia profert longa ſym- *Idem.* phyti maioris modo, hirsuta, aspera, hiſpidaq; , tenuiſſimis aculeis ſcatentia, caule ſeſquicubitali, rotundo, robuſtoq; , hiſpido, ac pungente, à quo rami complures exeunt ſuſum ſpectātes, in quorum ſummis partibus flores emicant purpurei borraginis minoribus, ſemine nigro. Radix illi eſt borraginis, craſſior, & carnoſior, lentore quodam prædita, ac craſſiori, pinguioriquè libro, Minor autem folia oblonga profert, ſed longè anguſtiora, breuioraq; , hirsuta, ſed aculeis vacantia, cætera ſimilia ſunt.

Locvs.

ſeruntur paſſim in hortis.

Idem.

QUALITATES ET VIREs.

Eadem omnia præſtare poſſunt, quæ Borrago.

Idem.

BUGLOSSVM alterum sylvestre flore nigro, albo & purpureo. Italis, Buglossa
saluatica del fior negro, bianco & porporeo.

BUGLOSSVM ALTERVM SYLVESTRI
FLORE NIGRO.

F O R M A.

Matth.

Extat & sylvestre genus
hortensi minori per omnia
simile, sed in omnibus agre-
stius, * & flore nonnunquam
nigro, nonnunquam etiam
albo exornatur, vix plurimum
vero purpureos. habet. flo-
res. *

L O C U S.

Idem.

Nascitur in campestribus..

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Idem.

Viribus iisdem pollet, qui-
bus amba hortensium spe-
cies.



CYNOGLOSSVM vulgare, Italis, Pariter Cinoglossa, seu Lingua canina. Germanis, Hundszung. Gallis, Langue de chien.

CYNOGLOSSVM VULGARE.

F O R M A.

Folia edit lata, longaq; hor- *Matth.*
tensis, ac maioris buglossi mo-
do, numerosa ab vna radice
prodeuntia, tactu subaspera,
ac pilosa, caulem cubitalem,
teretem, robustum, ac pari-
ter subasperum, & à medio
ramosum, flores purpureos
Echij æmulos, è quibus par-
uæ prodeunt lappæ, aculeo
quodam è medio prominen-
te, magno naturæ artificio,
quæ maturescences vestibus
pertinaciter adhærent.

L O C V S.

Nascitur passim, ferè vbiq; *Idem.*
secus vias, & in agrorum mar-
ginibus.

Q U A L I T A T E S.

Manifesto refrigerat, & *Idem.*
siccat.

V I R E S.

Folia recentia imposita mirum in modum vulnecum inflammationes ar-
cent, ac etiam alias quascunque.



CALTHA, Italís, *Fior rancio*, *sive Fior d'ogni mese*. Officinis, *Calendula*. Germanis, *Ringelblum*. Gallis, *Poussij*.

C A L T H A.

F O R M A.

Matth. Folij exit oblongis, minime acuminatis. Leucoij quadrantenus similibus, latioribus, tamen, ac longioribus, caulibus edit singularem, subpinguem, selquidodrantalem, ramosum. Flores in caulium summitatibus aureos, speciososq; , odore cum gravitate haud iniucundo, è quibus semen provenit in capitulis apertis; quod si deducatur auricularum vnguibus quadrantenus simile spectatur. Radice nititur alba, rectaque.

L O C U S.

Idem. In tota Hetruria sponte per se nascitur, secus itinera. Atqui in compluribus Italiae locis, & in Germania in hortis ad coronamenta feritur.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, attenuat, aperit, digerit, & prouocat, quamvis gustu adstrictione non vacare deprehendatur.



V I R E S.

Idem. Constat, multis admodum feminarum factis periculis, herbam valere plurimum ad menses ducendos, epoto eius succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Succus vnciae pondere, cum drachma pulueris terrestrium lumbricorum, poru ictericos iuuat. Sunt qui dicant huiusce herbae vsu iuuari maxime oculorum aciem. Constat tamen stillatitiam floridae plantae aquam oculorum ruborem, & inflammationem arcere, si in oculos instilletur, aut linetis applicetur, in ea made factis. Siccatae puluis, dentium cauernis impositus dolorem sedat.

HIPPŌGLOSSVM, Græcis, ἵππογλωσσόν. Italis, Bislingua, sive Bonifacia. Germanis, Zäpfstin Kraut. Hispanis, Lengua de Cavallo. Gallis, Bislingua.

HIPPŌGLOSSVM.

F O R M A.



Frutex est folijs rusci ma- *Math.*
ioribus, polygonati simili-
bus, secundum lōgitudinem
frequenter striatis, è quorum
medio ligulæ quædam folio-
sæ assurgunt, sub quibus ru-
bentes exoriuntur baccæ, vt
in rusco. Radicem habet al-
bam, geniculatam, ac duram.

L O C V S.

Nascitur in syluosis, mon- *idem.*
tibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Capitis dolorem, corona dīosc.
ex comis imposta minuit. *Math.*
Datur radix vtiliter ad omnes
vteri affectiones, & præser-
tim præfocatis ab vtero mu-
lieribus, cochlearis mensu-
ra. Est quoque ad puerorum
enterocellas præstantissimum auxilium si diutius radice pulvis selsquidrachmę
pondere quotidie ex maioris symphiti decocto propinetur.

ANTIRRHINVM, * vulgo Caput canis & Caput vituli, Nares vituli. * Graecis, *Αντίρρινος*. Italis, *Antirrino*. Germanis, *Dranti*. * *Eöwenmäuler*, *Hundstoppf*, *Drackenhaupt*. * Hispanis, *Cabeza de cernera*. Gallis, *Mouron violet*.

ANTIRRHINVM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor nos obseruauimus genera, quorum facies ex sequentibus iconibus parebunt.

F O R M A.


Idem. Folijs omnes sunt oblongis, in altero latioribus, in altero verò angustioribus, caulibus ramosis, floribus in quibusdam purpureis, in cæteris verò candidis. Semen profertur minutum nigrumq; receptaculis quibusdam inclusum, quæ vitulorum capita per quàm bellè referunt.

L O C V S.

Matth. Nasctur in aruis, & in collibus. * In Italijs & Gallijs, præsertim prouincialis & Narbonensis inter Oliueta. *

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Ad sanationes inutile est.
sim. me. Ipsum ad similes est cum Buponis facultatis.



V I R E S.

Diosc. Tradunt perunctos huius semine ex oleo verustiores fieri, nec vlllo medicamento ladi posse, si quis appensum gesser. Quin etiam principum gratiam sibi conciliari posse putant hoc tantum amuleto.



* Floribus est conspicuum
ex purpura albicantibus seu
incarnatis vulgo dictis, rictu
luteo, leonini oris æmulo.*

Mmm: 5:

ANTIR-

*Rarissime cubiti altitudinem assequitur, cæteris partibus quoque minus est multo quam hortensia. flosculos gerit albos pusillos, & semen virguli nares referens sed admodum minutum.

L O C U S.

Crescit in arvis & vineis.*



ANTIR-

ANTIRRHINVM IIII.



* F O R M A.

Folia & flores prioribus sunt similia, sed minora omnia. Flosculi non in summitate sed secundum foliorum exortus per intervalla prodeunt, purpurascens, ex quibus fiunt capitula membranacea, vitulinæ, aut simiæ caluariæ figura, in quibus semen minutum, ut in reliquis.

L O C U S.

Vbiuis hortorum, incultorumque marginibus spontè plurimum innascitur.

A P P E N D I X.

Quibusdam placet esse Archigenis Orontium, quasi Aurantium, quod Auriginem morbum siue Ictericum leuet.*

A D I A N.

ADIANTVM, Græcis, *Adarrov*. Officinis, *Capillus Veneris*. Arabibus, *Bersce-guascen*, seu *Bersausan*, seu *Chulbare albir*. Italis, *Capel venere*. Germanis, *Strawen-Har*. Hispanis, *Culantrillo de pozo*. Gallis, *Capil venere*.

FORMA.

ADIANTVM.

Diosc. Pusilla gerit folia coriandri similia, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitet, validi, pretenues, palmu alti, radice superuacua, neq; caulem, neq; florem, neq; semengerit.

LOCVS.

Idem. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

QUALITATES.

Galen. 6. Adiantum in caliditate quidem, & frigiditate symmetrū est, verum desiccatur, & extenuatur, & discutit.

VIREs.

Diosc. Decoctum herbæ potū prodest difficulter spirantibus, suspensiosis, lienosis, felle suffusis, & urinz angustijs, calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est, contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Menfes, & secundas ciet, sanguinis reiectiones inhibet. Illinirur recens contra serpentium morsus. Alopecias desat,


strumas discutit. Furfures, & manantia capitis vlcera ex lixiuo emendat, cum ladano, & myrthino oleo defluentes capillos continet. Idem præstat eius decoctum ex vino, & lixiuo paratum. coturnices, & gallinaceos pugnatiores facit in cibis eorum additum. Aluum subducit, bilem, & pituitam deijcit, crassaque excrementa, quæ diu in interioribus inhaeserunt sanguinem clarificat, animam dilatat, & iecur, & ventriculum purgat præsertim si obstructione laborent. Decoctum eius sceminas à partu purgat. Eius cinis ægilopas curat. Diuiti libra e pota commodissimè alius subducitur.

Mesue.



TRICHOMANES, Græcis, Τρυχόμανες. Officinis, Polytricum: Italis, Politrice.
Germanis, Steinbrech: Hispanis, Politrice. Gallis, Polytricen.

TRICHOMANES.



FORMA.

Est filici simile, sed exilius, Diosc.
folijs lenticulæ, tenuibus, in
ordinem vtrinque digestis,
in se aduersis, ramulis tenui-
bus, acerbis, subnigris, pellu-
cidisque.

- LOCVS.

Nascitur eisdem in locis Idem.
quibus Adiantum. Et præ- Matth.
fertim in puteis, & antiquis
parietibus.

QUALITATES ET
VIRES.

Eadem quæ Adiantū præ- Diosc.
stare posse constar.

XANTHIUM, siue strumaria, Officinis, *Lappa minor*. Græcis, *Ξάνθιον*. Italis, *Lappa minore*. Germanis, *Wettlersleuchl* seu *Spitz Kletten* / *Jgel Kletten*. Hispanis, *Lappa menor*. Gallis, *Petit Gloutteron*, seu *Grappellas*.

XANTHIUM.

F O R M A.

Diosc. Caule exit cubitali, anguloso, pingui, crebris ex eo prodeuntibus alis. Folia habet atriplicis, insecta, nasturtium odore imitantia, fructum grandis olivæ modo, & ut platani pilula aculeatum, qui contactu vestibus adhærescit.



L O C U S.

Idem. Nascitur læto solo, & pingui, & lacubus exiccatis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 8. Fructus discutiendi vim obtinet.
simp. me.

V I R E S.

Diosc. Fructus flavos facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput nitro ante perfriktum illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asseruant. Semen aprissimè tumoribus imponitur.

*EGILOPI.*

ÆGILOPS, siue festuca, Græcis, *αἰγίλα* †. Arabibus, *Dausir*, *Dauser*, siue *Daser*.
Italīs, *Egilopa*, siue *Orzo saluatico*.

ÆGILOPS, SIVE FESTUCA.



FORMA.

Folia habet tritici, sed molliora, in summo capite semina bina, ternave, rubra, quibus arista quasi capillaceæ exeunt.

LOCVS.

Nascitur in agris inter segetes. *Matth.*

QUALITATES.

Digerendi vim possidet id *Gale. 6.* quod ex gustu patet. leuiter *simp. me.* enim est acris.


VIRE.

Herba cum farina illita *Diosc.* gilopis medetur, duritias discutit. succus farinæ admistus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

ÆGILOPS

ÆGILOPS altera, *Auena sterilis*. *Italis*, *Vena Vana*. *Ananienfibus*, *Squala*.
Gallis, *Auoine sterile*.


ÆGILOPS ALTERA.



POLY-

POLYGALA, Græcis, Πολύγαλον. Italis, Poligala.

POLYGALA.



F O R M A.

Palmi altitudinem petit, fo- Diosc.
lijs Lenticulæ, gustu adstricto.

L O C U S.

Prouenit in collibus apri- Matth.
cis, & incultis locis.

V I R E S.

Potalactis abundantiam fa- Diosc.
cit.

Nnn

OSYRIS,

OSYRIS, Græcis, *ὄσυρις*. Italis, pariter, & Hispanis, *Linaria*. Germanis, *Sum-
fraut*. Gallis, *Linair*.

O S Y R I S.

F O R M A.

Diosc. Frutex est niger, ramulos fe-
rens tenues, lentos, fractuque
côtumaces, & in his folia qua-
terna, quina, senave, ceu lini,
nigra in initio, deinde colore
mutato rubescentia,

L O C U S.

Matth. Nascitur ferè ubiq; in cam-
pis, & agrorum aggeribus.

Q U A L I T A T E S.


Galen. 3. Amara illi inest qualitas, &
fimp. me. obstructions expediendi fa-
cultas, quare & in iocinore,
consistentes obstructions ad
iuuat.

V I R E S.

Diosc. Decoctum eius potum iu-
uat arquatos.


A P P E N D I X.

Tamet si hoc loco *Linariæ* herbæ vulgo vocatæ imaginem appinximus vul-
gum secuti, non ob id tamen ipsam legitimam *Osyridem* facimus.



SMILAX aspera, Græcis, Σουλδα & τραχέα. Italic, Rouc ceruino, siue *Hedera spinosa*. Germanis, Scharpffe Binden. Gallis, Tan, siue *Smilax aspre*.

SMILAX ASPERA.



FORMA.

Folia habet Periclymeni, Diosc. aut hederæ, aculeato dorso, Matth. farmenta tenuia, multa, rubi, aut paliuri modo aculeata. Arbores scandit ab imo ad summum perreptans, sese conuoluens eis. Fructum habet racemosum, qui maturus rubescit, gustuq; leuiter mordet. Clauiculis plena est, quibus arboribus se circunuoluit.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Galen. asperis. Ac etiam in Syluis. Matth.

QUALITATES.

Folia gustata aliquid habent Gale. 7. acrimoniæ, & alioqui si illis v. simp. me. taris calefaciunt.

VIREs.

Folia, & acini, ante, & post Diosc. et poti venenorum antidota sunt. Tradunt si infantibus nuper in lucem æditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Admiscetur quoq; & Alexipharmacis.

SMILAX lævis, Græcis, *Σπλάγχθια*. Italis, *Vilucchio maggiore*. Germanis, *Winden* aut *Zaunpföcklin*. Hispanis, *Correguel maior*. Gallis, *Liser*, seu *Campanelle*.

SMILAX LÆVIS.

FORMA.

Diosc. Folia Hederæ similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora, sarmenta habet asperæ smilacis similia, sed nullis spinis horrentia, conuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, florib⁹ in cacumine perpetuis, multis, rotundis, folia per autumnum decidua sunt.

LOCVS.


Idem. Nascitur prope arbores quibus conuoluitur.

QUALITATES.

Galen. 7. Facultate quodammodo *simp. m.* prædictæ similis est.

VIRES.

Diosc. Semine cum dorycnio potio ternis singulorum obolis, varia, & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.



CENSURA.

Non ausim ego affirmare an hæc planta legitimam smilacem læuem referat.

LUPVLVS, Italis, Lupolo, Bruscandolo, seu Forancefo. Germ. Hopffen. Gall. Houblon.

LUPVLVS.



G E N E R A.

Duum est generum. Satiuum, *Matth.* & sponte proueniens, at facie inter se non differunt, præterquam magnitudine, & exilitate. * Distinguitur etiam in marem & feminam. *

F O R M A.

Mas planta est arborescens, & cõtexendis p̃gulis aptissima, folijs vitigineis, brioniæ modo diuisis, asperis cucumeris modo. Sarmen- *Idem.* ta habet prælonga, aspera, hirsuta, & quadrantenus aculeata. Folliculos edit, racemosos & numerosos, exiles, cõpactili quadam serie dependentes, in quib⁹ atrum, & amarum concluditur semen.

L O C V S.

Satiuum Germanis colitur in *Idem.* campis, sylvestre in sepibus, & frutetis spontè nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Lupuli flores, folliculi, ac ra- *Idem.* dices excalfaciunt, siccant, extenuant, aperiunt, abstergunt, expurgant, sanguinẽ mundant. Atqui turiones cum plus humi-

ditatis habeant parum quidem tum excalfaciunt, tum siccant.

V I R E S.

Turiones alium emolliunt in cibum sumpti, vbi prius probè fuerint elixi. *Matth.* Florum, & folliculorum decoctum datur potandum commodè contra hausta venena, scabiem, Gallicam luem, ac cæteros quosq; affectus, qui extimam cutim inficiunt. Datur idem contra diutinas febres ab infarctu prouenientes. Semen tritum, & potui datum semidrachmæ pondere interaneorum animalia necat. menses prouocat, & vrinam pellit. Lupulus flauam bilem detrahit. *Mesue.*

F O R M A.

Fœmina differt à mare, quod flosculos edat subpallidos penè Cannabis fœminæ flosculis similes, sed maiores, inspidos aut subdulces, qui in pollinem subtilissimum lurem tandem abeunt & sine fructu pereunt, folia quoque rotundiora nec tam profundis incisuris dissecta, ut mas, & iuxta radicem potissimum prorsus sine incisuris spectantur, paululum saltem per ambitum serrata.

L O C U S.

Nascitur in sepibus ut prior Lupulus, cui plerumq; etiam sociatur.

N O T A.

Non desunt, qui mare appellitent Lupulum qui steriles habet flores, & fœminam cui folliculares fructus absq; flore innascuntur, id quod etiam in Cannabi & alijs herbis faciunt, fœcundas fœminino sexui, masculino steriles adscribendo.*



Ruscus, Græcis, *Myrsin ægia*, & *ἑμυμίσιν*. Italis, *Brusco*, & *Pongitopi*. Germanis, *Brusch*, *Meusdorn*. Hispanis, *Iusbarba*, & *Gilbarbera*. Gallis, *Brus*.

R U S C U S.

F O R M A.

Folium fert myrti, latius, in *Diosc.* formam lanceę mucronatum. Bacca per maturitatem rubescunt, rotundæ à medio folio dependentes, osseo intus nucleo cubitales rami ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi; radice graminis simili, acerba, & subamara.

L O C U S.

In asperis, & præcipitibus *Idem*. locis nascitur.


Q U A L I T A T E S.

Excalfacit radix, siccatur, apertur, *Matth.* abstergit, extenuat.

V I R E S.

Folia, & bacca in vino potantur, *Diosc.* urinam cient, menses pellunt, vesicę calculos frangunt, stillicidio urinx medentur, do-

lores capitis sanant, & regium morbum. Decoctum radice in vino potum eodem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur; amari autem sunt, sed urinam movent.



LAVRVS Alexandrina, Græcis, Δάφνη Αλεξανδρεῖα. Arabibus, Gar Alexandria.
Italis, Lauro Alessandrino. Gallis, Laurier Alexandrin.

LAVRVS. ALEXANDRINA.

F O R M A.

Diosc. Folio est Hippoglossi, paulò maiore, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, ciceris magnitudine, ramos spargit in terra dodrantales, interdum longiores. Radice Rusco simili, maiore, molliore, odorata.

L O C V S.

Idem. Inuenitur in montosis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Temperaturæ euidenter est.
fimp. me. calidæ, simul & gustantibus acris, & subamara.

V I R E S.

Diosc. Difficiles partus accelerat, radice pota in vino dulci sex drachmarum pondere, & stillicidio vrinæ auxiliatur, sed sanguinem extrahit.



* C E N S V R A.

Polygonati potius esse speciem rei herbariæ peritiores existimant.*

DAPHNOIDES, Græcis, *Δαφνιδες*. Arabibus, *Daphnides*. Italis, *Laureola*. Gal-
lis, *Laureole*. Germanis, *Groß Kellerschale*.

D A P H N O I D E S.

F O R M A.



Cubiti altitudine fruticat, DIOSC.
ramis flexilibus, obsequiosis-
que multis à medio sursum
versus foliosis, cortex supra
modū viscosus ramos vestit,
folia lauri, graciliora, & mol-
liora, fractu cōtumacia, quo-
rum gustatu os, & fauces in-
cendūtur. Flores candidi. Bac-
ca cū ematur erit nigra. Ra-
dix inutilis.

L O C U S.

Nascitur in montosis. *Idem.*

Q U A L I T A T E S.

Est viribus & ipsa perfimi- Gal. li. 6.
lis Lauro Alexandrinæ. *simp. me.*

V I R E S.

Pituitam extrahit foliū re- DIOSC.
cens, vel aridum in potu, vo-
mitum, & menses citius caput
inanit commanducatum, iter

uramenta mouet. Baccæ quindecim potæ alium resoluunt. Folia recentia *Matth.*
contusa illinuntur vtiliter ischiadicis, quousq; ruborem, aut vesicas excitent.

A P P E N D I X.

* Appinximus vulgo dictum Daphnoides, cū nō esset ad manus viua plan-
ta; cuius iconem autor exhibet. Profert illud coccum gnidium, quod in Offici-
nis habetur contentum in baccis rubris. Flosculi vere primo emergunt copio-
si, purpurascens, odorem spirantes non ingratus.*

CHAMÆDAPHNĒ, Græcis, Χαραδάφνη. Italis, Laureola minore.

CHAMÆDAPHNĒ.

FORMA.

Diosc. Virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læves, folia lauri similitudine, læviora multo, ac viridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus, & in syluis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Viribus & ipsa est Daphnoidis persimilibus.

VIREs.

Diosc. Trita folia illinuntur capitis doloribus, & stomachi ardores mulcent. Bibuntur cum vino ad sedanda tormina, porus cum vino succus menses, & vrinas ciet Idem facit pello appositus.



* APPENDIX.

Reperi quidem similem aliquando plantam in montibus Silesiæ altissimis versus Morauiam, sed folijs crassis, duris, & caule satis denso, baccis nigris, quapropter verisimile est potius ad Daphnoidem referendam esse, nec immerito de hac stirpe tanquam incognita nonnulli dubitant.*

ELLEBORVM, siue Veratrum album. Græcis, Ελεβορος λευκος. Arabib. Cherbachem, seu Charbechabaid. Italis, Elleboro bianco. Germ. Weiß Nieswurts. Hisp. Verde gambie blanco, seu Teruz de baïesse. Gallis, Veraire, seu Ellebore blanc.

ELLEBORVM ALBUM.

F O R M A.

Folia fert plâtaginis aut be DIOSC. te sylvestris similia, sed breuio-
ra, nigriora, rubescentia, cau-
lem cauum quadrantalem, tu-
nicis comulatum, quas abdi-
cat cum arefcere incipit. Ra-
dicibus nititur multis, tenui-
bus, ab oblongo, & exiguo ca-
pite cepaceo exeuntibus. Flo Matth.
ribus in toto ferè caule spica-
tis fuluo colore.

L O C V S.

Prouenit copiosum in mon DIOSC.
tibus & asperis.

Q U A L I T A T E S.

Elleborus vterque tum al- Gal. li. 6.
bus, tum niger, extergentis si- simp. me-
mul & excalfacientis est facul-
tatis, quamobrem ad alphos,
imperigines, scabies, leprasq;
accommodi sunt, porro niger
gustur calidior est, albus verò
amarior.

V I R E S.

Radix vomitione varios ex DIOSC.
trahit humores. Menses impo-
sitū pellit. Sternutamenta ex-
citât. Mures interficit. Vomî-

tiones concitant subditi ex oleo balani cum aceto. Mortiferū est medicamen- Meur.
tum, quodd sæpe homines strâgulet. Cæterum prisici medici album elleborum Matth.
propinabant comitialibus, melancholicis, vertiginosis, insanientibus, lymphaticis, cõuulsis, podagricis, resolutis, hydropicis, elephantiacisque, sed iam eius
exoleuit vsus; vt in puluere propinetur. Eius autem diluto quamplurimi sine
incommodo vtuntur. Radix in lixiuio decocta pediculos, & lendes necat. De-
coquitur in lacte ad muscas perimendas. Mures quoque necat, & gallinas. Pa-
ratur à radicum succo in Hispania venenum, quo venatores sagittas illinunt,
quibus qui feriuntur, breui répore pereunt, nisi cydonia poma vorauerint, aut
eorundem biberint sugcum.

ELLEBORVMnigrum, Græcis, Ελλέβορος μέλας. Arabibus, Cherbachem, seu Car-
bechasued. Italis, Elleboro nero. Germanis, Christwurz. Hispanis, verde gambro
nero, seu Elleboro. Gallis, Viraire, & Ellebore noire.

ELLEBORVM NIGRVM.

FORMA.

Diosc. Folia ei viridia, platani simi-
lia, minora tamen, subaspera,
nigriora, plurib. diuisuris in-
cisa, caulis asper, flores in pur-
pura albicâtes, racematim eo-
hærentes, semen cnici. Radi-
cibus coherer nigris, tenuibus
à capitulo cepaceo cōfibratis.

L O C V S.

Idem. In collibus asperis, & siccis
locis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Extergentis simul & excal-
simp. me. faciētis est facultatis, est enim
ex tertio ordine excalfacien-
tium, & desiccantium, gustu-
que albo calidior habetur.

V I R E S.


Diosc. Ventrem purgat, bilem de-
trahit, pituitamque: prodest
morbis comitialibus, melan-
cholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menfes inditum tra-
hit, partus necat, fistulas purgat impositum, & tertia die detractum. Demitti-
tur in aurem contra gravitatem auditus, & vsq; in alterum, aut tertium diem si-
nitur. Scabiem illitum sanar, vitiligines, lepras, impetigines, ex aceto medetur.
Dentium dolores collutione mitigat. Imponitur vtiliter hydropicorum ven-
tribus farina hordeacea & vino exceptum.



ELLEBORVM alterum, Nobis Elleborum fœmina, seu pseudoelleborum.

ELLEBORVM NIGRVM ALTERVM.

FORMA.



Folia gerit digitis nouē ad *Matth.* pediculum vsque dissecta, acorniti Cynoctoni ferè modo, sed longiorib. diuisuris, nigricantia, digitis circumquaq; serratis. Caulem edit vegetū, subspermūque. Flores alterius similes, sed herbacco colore, aut quadatenus subpalescentes, quinque, aut pluribus emergentibus è medio corniculis acuminatis, vtrinq; compressis, in quibus semen continetur. Radicib. cohæret numerosis, tenuib⁹, palmari longitudine, ac per omnia alterius similibus, odore graui, nauseam commouente, sapore amaro.

CENSURA.

Sunt qui putent hanc plantam Plinij esse Consiliginem, cuius sententiæ est clarissimus, ac doctissimus Fracastorius, qui etiam eiusdem Plinij Enneaphylon eandem facit. Verū nos nec hęc, nec illam esse putamus, quod nullus sit autor qui ne vna tantum nota consiliginis faciem & historiam describat, quodq; Plinius nusquam meminerit Enneaphylon consiliginem Latinis vocari, eamq; vrentis facit facultatis, & lumborum, coxendicūq; doloribus vtilem: consiliginem verò ad Pulmonis tantum morbos valere scribit.

PSEUDO-

PSEUDOELLEBORVM, Græcis, *Ψευδοελλεβορ*. Italis, *Elleboro falso*.

PSEUDOELLEBORVM.

FORMA.

Matth.

Affurgit hæc planta ad duū palmorum altitudinem. Cauliculos emittit tenues, ac molles, folia longiuscula tenuia, Abrotani quadantenus æmula. Flores Bupthalmi, paulo tamē maiores, è quibus capitula prodeunt oblōga, ruborum moris similia. Radicibus cohæret nigris, nigrum veratrum æmulantibus, tenuioribus tamen, & nigrioribus.


LOCVS.

Idem.

Plurimū provenit in Boemia, in Pragensi præsertim agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Huiusce plantæ radicibus tum Medici, tum pharmaceuti, qui Boemiam incolunt, vtuntur passim pro legitimo nigro veratro, *non sine errore, *ac priuatim ad suorum pecorum morbos.




OPHEIS

OPHRIS, Italis, *Eleboro bianco falso*. Germanis, *Zweiblatt*.

O P H R I S.

F O R M A.



Duo tantum hæc folia pro- *Matth.*
fert, albi veratri quadantenus
similia, inter quæ caulis erum
pit tenuis, calyculis oblongis,
parvisque refertus, balauftio-
rum effigie, è quibus flosculi
exeunt candidi paruarum lin-
guarum faciem referētes. Ra-
dice nititur gracili, compluri-
bus tamen adnatis, alba, & o-
dore præstanti.

L O C U S.

Nascitur in montibus, & in *Idem.*
conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Manfa radix glutinosum len *Idem.*
torem reddit, subdulci sapo-
re, Quare calida fuerit, & hu-
mida.

V I R E S.

Præfertur vniuersa planta ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, &
vulnera glutinanda.

SESAMOI-

SESAMOIDES paruum, Σηταμοειδὲς μικρὸν, Græcis dicitur.

SESAMOIDES PARVUM.

FORMA.

Diosc. Cauliculos edit dodranta-
les, folia coronopi minora, hir-
futiora, & in cauliculorum ca-
cumine capitula florum penè
purpureorum, medio eorum
albo, semen sesamæ, fulvum,
amarum. Radix tenuis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in asperis.


QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen bilem, pituitamque
derrahit ex aqua mulsa potum
dimidio acetabulo, illitum ex
aqua tumores, ac tubercula
discutit.



*SESAMO-

*SESAMOIDES parvum flore magis completo.



Ad intybacea potius ego
referrem hanc plantam, cum
radix lacte non paucō turgēat
& multis quoq; doctis & her-
bariæ rei peritissimis hæc sen-
tentia arrideat. Flores Cicho-
rio figura respondent & alij
simplici foliorum textura cō-
stant, alij densius stipantur,
colore eleganticæruleo, sta-
mina in medio lutea habē-
tes, è quibus relinquitur se-
men subnigrum angulosum
pusillum, squammaris capi-
tulis inclusum, quodan pur-
gandi vim obtineat, nemi-
nem experiendo cognovisse
arbitror. Vnum hoc scio in
parva quantitate exhibitum
nihil efficere, sapore est o-
mnino dulci nihil vel mini-
mum amaritudinis obtinen-
te.*

CUCUMIS sylvestris, Græcis, *Σίκκος ἀγρίος*. Officinis, *Cucumer aspinus*. Arabibus, *Chefe allimar*; *Kate allhenei*, seu *cheta alhamar*. Italis, *Cocomero saluatico*. Germanis, *Wilder Cucumer*/seu *Efels Cucumer*. Hispanis, *Cogombrillos amargos*. Gallis, *Cogombre sauvage*.

CUCUMIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth.

Folia illi sunt satiuo cucumeri similia, sed rudiora, hirsutiora, asperioraq; , aversa parte subalbicanter. Flores ex alarum cavitatibus, quæ in sarmentis habentur, procedunt: u rei, stellarum figura, retro extuberante fructu, satiuo cucumeris modo, qui tandem auctus, & oblongus factus, glandis magnitudinem superat, aut dactylos æquat. Is hispidus adeo est, ut quasi aculeatus sentiatur, qui maturus factus candicat, & sponte, aut leuiter impulsus non sine impetu, à pediculo disjungitur, & tormenti instar, nigrum, maturumq; , semen vnà cum succo in legētium manus eiacularur. Radicem habet doctralem, ac etiam longiorem, brachiali crassitudine, candidam, succosam, & insigniter amarā, quemadmodum planta est tota, & fructus.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in sabuletis, & ruderibus.

Matth. Incultis & vlginosis locis.


Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Vniuersa planta in vsu est. Succus summè quidem amarus est, leuiterq; , calidus, ut ex secundo sit ordine exalfacientium. Digerendi etiam vim possidet & subtilium est partium. Radix similem succo facultatem obtinet. abstergit namq; , digerit, & emollit. Porro cortex ea potentius desiccatur.

V I R E S.

Diosc. Infillatus foliorum succus, aurium dolori cōuenit. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum Resina terebinthina, tubercula rumpit. Ischiadicis infunditur. Aridae farina impetigines, lepras & virilignes abstergit, nigris cicatricibus colorem reddit, & maculas in facie delet. Radicis succus sciquiboli pondere, & itē cortex acetabuli quarta parte bilem, pituitamq; , deijciunt, præsertim in hydropicis. Deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Elaterium verò ē fructuum succo paratum menses ciet, partus enecat in pello subditum, naribus cum lacte infusum morbo regio medetur, & diuturno capitis dolore liberat. Efficacissimè anginis illinitur, cum veteri oleo, melle, aut felle taurino.


STAPHIS



STAPHISAGRIA, seu herbapedicularis, Græcis, Σταφίς ἀγία. Arabibus, *alberas*, Muibaζagi, sine Muibeζegi. Italis, & Officinis, Stasufaria. German. *Wismuth*, Hispanis, *Fabaraz*, & *Paparraζ*. Gallis, *Herbe auxpoux*.

STAPHISAGRIA.

FORMA.



Folia habet Labruscæ diui. Diosc. fa, & cauliculos rectos, molles, nigrosq;. Florem fert Glæsti, & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem.

LOCVS.

Nascitur in opacis. Copio. Plinius, fissima autem prouenit in Marib. Dalmatia, Istria, Apulia, & Calabria.

QUALITATES.

Vehementer acrem obtinet facultatem, sed & vrendi simp. me. vimaliquam habet. Galen. 7.

VIRES.

Pota quindecim feminis Diosc. grana trita ex mellicrato crasum humorem per vomitum

purgant, atqui sumentes ambulare debent, & aquam mulsam continuo potare, quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Tripta, & ex oleo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & psoris. cit commanducata plurimam pituitam coquitur in aceto, eoq; in dolore dentium os vtiliter colluitur. reumatismum gingiuarum sistit. vlcera oris manantia cum melle sanat.

THAPSIA, Græcis, *Θαψία* Italis, *Thapsia*. Mauritanis, *Hiantum*, *sive Drix*. Gal-
lis, *Turbis blanc*.

THAPSIA.

FORMA.

Diosc. Tota natura ferulæ similis est, graciliore caule, folijs fœ-
niculi umbella anethi in ca-
cumine à singulis furculis e-
rumpente, flore luteo, semen
quale ferulæ latiusculum, sed
aliquanto minus. Radix foris
nigra, intus candida, magna,
acris, crassiore libro vestita.

LOCVS.


Matth. Nascur plurima in Apu-
lia Gargano monte.

QUALITATES.

Galen. 6. Acrem habet, & vehemen-
simp. me. ter excalfacientem faculta-
tem cum humiditate. Quam-
obrem ex alto vehemèter ex-
trahit, & quod extraxit dige-
rit, vis eius post annum mul-
tum reloluitur.

VIRES.

Diosc. Tam cortex radice, quam succus purgandi vim habet, & lacteus succus in
aqua multa potus, nam vtrinque bilem extrahunt. Radicis quaterni oboli cum
tribus seminis anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus vnus propinan-
tur. Quod eo amplius assumitur periculosum est. Conuenit hæc purgatio suspri-
oribus, & diurnis laterum doloribus, reiectionibusq; succus illitione, aut ra-
dix recens afflictu alopecias explent Radix, & succus cum thuris, & ceræ æquis
portionibus sugillata, liuoresq; tollunt. Viria cutis in facie emendant. Cum
melle illitus succus lepras tollit, & tubercula discutit, cum sulphure perunctus.



SPARTIVM, Græcis, Σπάειον. Italis, Sparto. Germanis, Psrimmen. Hispanis Spartio. Gallis, Genest de Espagne.

SPARTIVM.

FORMA.

Frutex est longas ferens vir D I O S C.
gas, sine folijs, firmas, fractu
cōtumaces, quibus vires vin-
ciuntur. Semen Lenticulæ in
foliculis phasiolorum modo
nascens. Florem, vt albæ vio-
læ luteum.

L O C V S.

Plurimum prouenit in Hi- Matth.
spania, aridis, & siccis locis.

Q U A L I T A T E S.

Semen, & virgarum succus Galen. 8.
non infrenuē trahentis est simp. me.
facultatis.

V I R E S.

Purgant per superna vehe- D I O S C.
menter elleborivice citra pe-
riculum flores, & semina qui-
nis obolis in aqua multa po-
ra. Semen deiectionem mo-

uet. Ramis in aqua maceratis, mox rufis extractus succus, ischiadicis auxiliatur,
si cyathi medium ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerant, & infundunt
Ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

GENISTA, Italis, *Ginestra*, Hispanis, *Geneſtra*, *Gieſta*, ſive *Gieſtrina*. Germanis, *Ginſt*. Gallis, *Geneſte*.

GENISTA.

FORMA.

Meſue.

Arbor eſt montana, è cuius caudice complurimæ oriuntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, acuminatæ, quibus vites & falſiculi ligantur. Flores edit flauos lunari figura, è quibus ſiliquæ prodeunt oblongæ vicæ modo, in quibus ſemen illi quoq; ſimile.

Locys.

Matth.

Oritur in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Meſue.

Planta tota perturbat, pronocat, incidit, attenuat, cordiſq; & ventriculo nocet.

VIRES.

Idem.

Matth.

Epotum ſemen pituitam vtrinque valentiſſimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pellit, vrinam ciet efficaciſſimè, & calculos diſrumpit tam in renibus, quàm in veſica, prohibetq; ne in poſterum renaſcantur calculi. Flores contriti ſtrumas auferunt, ſi cum melle roſaceo aut ſorbili ovo ſumantur. Fit ex ijs oximel, cuius uſu indurati lienes reſoluuntur. Proſunt iſchiadicis, podagricis, calculoſisq; ſi poſtquam ſuſperint euomant.



NARCIS-

NARCISSVS, Græcis, Νάρκισσος. Arabibus, Narcis, seu Nargies. Italis, Narciso. Germanis, Hornungsblumen/ Narcissen Döpslin. Gallis, Narcisse, Campanette, seu Laxnette.

NARCISSVS.

GENERA.

Complura narcissi visuntur atthM. genera, vt ex appictis hic iconibus seriatim palam fiet.

FORMA PRIMÆ

Folia profert porro similia, Diosc. sed multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine folijs supra dodrantem attollitur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica nigra longum. Flores suauis sunt odore.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Diosc. seritur in hortis. Matth.


QUALITATES.

Radix vsq; adeo exsiccandi Galen. 8. facultate pollet, vt & maxima simp. me. vulnera conglutinet, vel ad

incisiones vsq; quæ circa tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attractorium.

VIRES.

Radix cocta, siue estur, siue bibitur vomitoria est, ambustis igni prodest cum Diosc. exiguo melle trita, præcisos neruos illicit glutinat, vitia cutis in facie, vitiliginesq; cum semine vrticæ, & aceto emaculat, cum eruo, & melle vlcerum sordes expurgat, abscessus concoctioni repugnantes rumpit, infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.



NARCISSVS II. * Narcissus flore pleno, Græcis, Νάρκισσος & αμυγδαλός. Germanis, Gefüllte Narzissen Rößlin. Arabibus, Modaph.

NARCISSVS II.

FORMA.

Non differt hic à priore, neque facie, neque viribus, sed tantum floribus*, quos admodum speciosos promit, candidos quoq; sed quorum medium habent foliola.*



NARCIS.

NARCISsus III. *Narcissus totus luteus. Hispanis, *Campanilla*. Gallis, *Cœquelurde*. Germanis, *Selb Josephstabs/ Hornungsblumen*.

NARCISsus III.

FORMA.

Flores promit luteos speciosos, nolæ effigie, folijs luteis, sed pallidioribus circumdatos, qui interdû duplices vel triplices etiam spectâtur, quibus decidentibus relinquitur capitulum semina intus nigra asseruans, quæ principio latiuscula, tēporis progressu rotūdiora fiunt. Folijs & radice à priore parum discrepat.

Locvs.

Scatent hoc flore nemorosa prata. Inuenitur etiam in montibus prorsus luteus serius florens.*



Ooo 5

NARCIS-

NARCISŒVS IIII. * Græcis, λειονάριον & πολύανθος. Italis, Hyacintho del padre nostro. *

NARCISŒVS IIII.

FORMA.

Flores speciosos plures, lactei candoris, folijs tenuis constantes, Ornithogali floribus ferè similes, sed maiores profert, infidentes pediculis suis longis, in quos diuiditur summitas caulis, qui emergit inter folia oblôga Narcissi. Radix est Ornithogali pluribus bulbulis adnatis se propagâs.

LOCVS.

Rarus est, ideoq; horti cultiores hūc sibi vendicarunt. *




NARCIS-

NARCISSVS V. *Lilionarcissus, Turcis, Tulipan, Cafe Lale, Zampul.

NARCISSVS V.

FORMA.



E bulbo Colchici æmulo folia nascuntur Liliacea, aliquantum cōcaua carinataꝝve, oris sinuatis, ex horum medio caulis assurgit assumitq; folia, quib. vestiatur, plerunque terna. Eius summitas ornatur flore venustissimo, lilij effigie, colorū varietate mire discrepante. Nam vel purpureus, vel coctineus, vel violaceus, vel aureus, vel flauus, ce reusq; , vel prorsus candidus habetur. Sunt qui caruleum se vidisse affirmant. Quin & varij colores in vnico flore spectātur, quorum diuersitates omnes describere non est huius loci, præsertim cū indies augeat ista varietas. Subnascitur semen foliaceum aurei coloris, vt Lilij rufi, clausum oblongo membraneoq; folliculo.

Locvs.

Habetur in hortis.*

NARCIS.

NARCISSVS VI.* *Leuconarcissifolium bifolium*. Germanis, Schneetropfen.


F O R M A.

Palmari cauliculo Vere prodit inter folia gemina, flore exili lacteolo, tribus tantū folijs constante, aut senis si tria exigua illa herbacea medium flores obrinentia simul numerentur. Bulbosa nititur vt reliqui Narcissi, sed parua radice.

L O C V S.

Nascitur in pratis & saltibusymbrosis.*

NARCISSVS VI.



NARCIS-

NARCISSVS VII.* *Leuconarcissiflorum vulgare*, *Viola alba* Theophrastiaut
eiusdem Opition. Germanis, Weiß Hornungsblum, Merzenblumen.


NARCISSVS VII.

FORMA.

Floribus præcedēti cognata est, vt & reliquis partibus, sed per omnia maior & vegetior.

Locvs.

Nascitur sponte in nemoribus Germaniæ copiosè, nec non alibi, vt in Salena monte & agro Aurelianensi.*



NARCIS.

NARCISSVS VIII. * Lilionarcissus Bononiensis. Tulipa minor. Græcis, *λεωνάρχιος* & *πολύκλων*.


F O R M A.

Inconditam quandam effigiem hoc loco exhibuerat auctor sine descriptione, quæ tamen videbatur esse Tuliparū Bononiensium (ut appellantur hoc nostro tempore) Diuaricantur enim harum nonnunquam caules, fiuntq; triplices & sæpe quadruplices, sustinentes in summo flores stellatos, luteos, odoratos, qui tandē abeunt in triquetra capitula continentia semen latum, rufum, ut Liliū. Bulbus nucleum oblongū allij æquat, sed membrana lutea nitidaq; tegitur.

L O C V S.

Apud nos in hortis inueniuntur, & sponte nascitur in montibus circa Bononiam. *


NARCISSVS VIII.



RICINVS.

RICINVS, Græcis, *Κινὴ ἡλίτου*. Italis, *Mirafale, & Girafale*. Arabibus, *Cherua*. Germanis, *Wunderbaum / Türckischer Hanff*. Hispanis, *Figueira dell' inferno*. Gallis, *Palma Christi*.

RICINVS.



FORMA.

Prouenit parua ficus alti- **Diosc.**
tudine, folio platani, maiore,
lauiore, & nigriore, ramis,
caudicibusq; canis in arundi-
nis morē, semine in vis aspe-
ris, quod corticib. exutū, ri-
cinum animal repræsentat.

L O C V S.

Seritur in hortis, & in vini- **Matth.**
darijs. In Ægypto sponte na-
scitur.

QUALITATES.

Semen quemadmodū ex- **Gal. li. 7.**
purgat, detergit, & digerit, **simp. me.**
sic quoque folium, sed vnde-
qua; debilius. Oleum quod
ex semine conficitur, tum ca-
lidius, tum tenuiorū partiū
est, quā oleum commune,
ac proinde etiam discutit.

V I R E S.

Grana triginta numero **Diosc.**
purgata, trita, potaq; pitui-
tas, bilem, aquamq; per aluū
extrahunt, vomitionesq; mo-
uent, sed iniucunda admodū
est, & molesta purgatio, sto-

machum vehementer subuertens. Tusa & imposita vitia cutis in facie, varosq;
expurgat. Folia cum hordeacea farina trita inflammationes oculorum, tumo-
resque leniunt. Turgentes mammas cohibent. Eadem ex aceto illita ignes sa-
cros restinguunt. Confert semen coli, & articularum doloribus si ex veteris **Mesue.**
galli iure hauriatur. Oleum quod ex semine elicetur infunditur commodē ad
colicos cruciatus, inunctum autem scabiem, tum capitis vlcera sanat. Me-
detur sedis inflammationibus, & conuersis, ac præclusis fœminarum locis. In-
ungitur vtiliter indecoris cicatricibus, & aurium doloribus.

A P P E N D I X.

Suspicio in Dioscoridis exemplari subesse mendam. Grana enim triginta se-
minis non sine periculo vitæ dari possunt. Quo fit vt cum Oribasio legam tria
grana, non triginta.

TITHYMALVS, Græcis, Τίθυμαλον. Arabibus, *Xausser*, seu *Etbula*. Italis, *Tiimalo*, & *Tortumaglio*. Germanis, *Wolffemilch*. Hispanis, *Lacce tresna*, seu *Lacce resgua*. Gallis, *Tithymale de montagne*.

Diosc.

G E N E R A.

Septē tithymalorū habent genera, nēpe Characias, Myrtites, seu Myrsinites, Paralip^o, Helioscopius, Cyparissias, Dendroides, & Platiphyllus.

F O R M A C H A R A C I Æ.

Idem.

Caules supra cubiti altitudinē attollunt, rubri, lacteo succo, atq; acri madētes, folijs oleæ circū ramos, angustiorib. & lōgioribus, radice crassa lignosa. Pendet in caulium cacuminib^o coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quib. semen continetur.

L O C V S.

Diosc. Nascit in asperis, & mōtib^o.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Vincentem habent oēs asimp. me. crē, calidamq; facultatē, inest verò & amaritas. Validissimū itaq; est eorū liquor. Secundū locū tenēt, semē & folia. Radix verò dictarū facultatū particeps est, sed non ex æquo adurunt, & exulcerant quamuis corporis partem.

TITHYMALVS CHARACIAS.



V I R E S.


Diosc. Succus aluum purgat, trahit pituitā, bilemq; binis obolis in posca sumptus, & cum aqua multa vomitiones mouet. Recens lac perunctum in sole capillos ex oleo euellit, renascentesque flauos & exiles efficit, denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum leuat dolores. Tollit illitu imperigines, fornicantes verucas, & thymos. Valet aduersus præxygia, carbunculos, vlcera, phagedenas, gangrenas, fistulasq; Semen, & folia lactei succi effectum præbēt dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit, Acetum in quo decocta fuerit, collutione dentiū dolores mulcet. Omnia genera cordi, iocinori, & vētriculo maximē nocēt, vasa disrumpunt, intestina abradunt, vniuersum excalfaciunt corpus, aded^o vt inde febres facili concitentur.

Mesue.

TITHY-

TITHYMALVS Myrsinities, Græcis, Τιβύμαλος μυρσινίτης, ἢ Μυρσινίτης. Italis, Timalo Mirsinite.

TITHYMALVS MYRSINITES.



FORMA.

Folij crescit myrti proxi-
mis, sed maioribus, firmis, in
cacumine acutis, & pungenti-
bus. Ramulos ab radice mit-
tit dodrantes. Fructum fert
alternis annis, nuci similem,
mordacigustu.

LOCVS.

Nascitur in asperis.

Idem.

QUALITATES, ET
VIRES.

Succus, radix, semen, folia *Idem.*
consimilem antedicto sortiun-
tur facultatem, sed ad citan-
das vomitiones validior, atq;
efficacior est.

Ppp

TITHY-

TITHYMALVS Paralios, Græcis, Τιθύμαλος παραλίος. Italis, Titimalo marino.

TITHYMALVS PARALIOS.

FORMA.


DIOSC. Ramis nascitur subrubentibus, dodrantalibus, rectis, quinis, senive à radice exeuntibus, folijs lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato, denso, in quo semen, ut eruum vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget.

LOCVS.

Idem. Prouenit in maritimis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Similes ad vsus reconditur.



TITHY.

TITHYMALVS Helioscopius, Græcis, Τιθύμαλος ἡλιοσκόπιος. Italis, *Titimale Helioscopio*. Germanis, *Sonnenwende Wolffsmilch*.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.

FORMA.

Folij3 provenit Portulacæ **DIOSC.** tenuioribus, rotundioribusque, ramulis prodeuntibus à radice quaternis, aut quinis, rubentibus, dodrantalibus, tenuibusq3, lactis copiosius plenis, capite anethi, semine in capitibus incluso.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, po- **Idem.** tiffimum in ruderibus.

QUALITATES, ET
VIRE3.

Eadem illi quæ superiori- **Idem.** bus sunt vires, non tamen usque adeo validæ.



TITHYMALVS cyparissias, Græcis, Τιβύμαλος κυπαρίσσιος. Italis, Esulaminon.
Germanis, Cypressene Wolffsmilch.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

FORMA.

Diosc. In caulem exir dodranta-
lem, vel maiorem, subru-
brum, ex quo folia pini simi-
litudine exoriuntur, mollior-
ratamen, & tenuiora, in to-
tum nascentem pinum emu-
latur, candido succo mader.

LOCVS.

Matth. Nascitur ferè vbique circa
oppida, & secus vias.

QUALITATES, ET
VIRE.

idem. Eadem illi vis quæ supe-
rioribus.

ANNOTATIO.

Mihi profectò mirum vi-
detur, quòd Dioscorides hoc
tithymali genus κυπαρίσσιος
appallauerit, cum pinum nò.
cyparissum, referat.



TITHY-

TITHYMALVS Dendroides, Græcis, Τιβύμαλος Δενδροειδής. Italis, *Titimalo arboreo*.

TITHYMALVS DENDROIDES.



FORMA.

Ampliter opacat, in cacu-
DIO SC.
cumine frondosam spargens
comam, succo lacteo præ-
gnantem, cauliculis rubenti-
bus, folijs myrti tenuioribus,
fructu Characiæ.

LOCVS.

Nascitur in petris.

QUALITATES, ET
VIRES.

Eiusdem est effectus, cuius *Idem*.
superiores.

Ppp 3

TITHY-

TITHYMALVS Leptophyllos, Græcis, τιθύμαλος λεπτοφύλλος. Germanis, Die kleinste Weißemilch.

TITHYMALVS LEPTOPHYLLOS.

FORMA.

Matth. Patet eius facies ex hâc appicta figura.

LOCVS.

Idem. Nascitur incultis locis, & asperis.

QUALITATES, ET
VIRES.


Idem. Facultatibus ijsdem pollet, quibus & reliqua genera.



PITYUSA,

PITYVSA, Græcis, Πιρίουσα. Arabibus, Scebram, & Pthia. Officinis, Esula maior. Italis, Esola maggiore. Gallis, Turbit noir.

PITYVSA.



FORMA.

Caulis supracubiti altitudo. Diosc. dinem assurgit, geniculatus, folijs pini, acutis, exilibus, flore paruo, velut purpureo, ferrugine instar lenticulæ lato. Radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis prægrandis reperitur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, ac Matth. etiam in campestribus.

QUALITATES.

Purgat similiter, vt Tithy. Gale. 8. mali, cæterisque viribus illis simp. me. est ad similes.

VIRES.

Detrahit per aluum radix Diosc. drachmis duabus data in aqua mulla. Item seminis

drachma: succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur; modus foliorum drachmæ tres. Multa verò sumentibus affert incommoda.

Mesue.

LATHYRIS, Græcis, *Aabûeis*. Arabibus, *Mendana*, seu *Mahendane*. Italis, *Cataputia minore*. Officinis, *Cherua minore*. Germanis, *Springkraut* / *Körner* / seu *Freibörner*. Hispanis, *Tartago*. Gallis, *Espurge*.

LATHYRIS.**FORMA.**

Diosc. Caulem emittit, cubitali altitudine, digitali crassitudine inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in canle oblonga amygdalinis proxima, latiora, & læviora, quæ autem in summis ramulis exierunt minora cōspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructū in summis furculis gerit, triplici loculamento insignē, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur candida sunt & gustu dulcia. Radix illi tenuis, & nullius usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti *Tithymalus*.

LOCVS.


Matth. Nascitur passim in horris, & secus itinera exoluto solo.

QUALITATES.

Galen. 7. Sunt qui dicant hanc esse
sim. me. *Tithymali* speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodem illis modo purget totaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sane etiam maxime purgatoriam vim obtinet.

VIRE S.

Diosc. Grana sex, aut septem in cataportio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, alium purgant, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitas, & aquas. succus *Tithymali* modo potus, eosdem effectus præbet. Decem duodecimve seminis grana a putaminibus delibrata, vomitum potenter citant. Itaq; ijs vriliter propinantur qui philtrea deuorarunt, aut alia veneficia.



PEPLVS, Græcis, Πέπλος. Italis, *Peplo*. Germanis, *Hundsmilch*.

PEPLVS.



FORMA.

Frutex est lactei succi plenos, folijs parvis, ut rutæ, paulo rarioribus, rotunda comæ ferè dodrantali, humi resperfa, semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. Vnicam habet radicem, ipsamque superuacua.

LOCVS.

Nascitur inter vites, & in *Idem*. hortis.

QUALITATES.

Succum habet similem *Ti-Galén. 8.* thymalis, cum in alijs, tum *sim. me.* quia purgat ceu illi.

VIRE.

Semen acetabuli mensura *Diosc.* ex hydromeliris cyathopotum, bilem, ac pituitam purgat.

Ppp s. PEPLIS,

PEPLIS, Græcis, Πέπλος. Italis, Peplo.

PEPLIS.

FORMA.

DIOSC. Frutice est latè opaco, succi candidi pleno, folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus, semine sub folijs rotundo, vti in Peplo, feruenti gustu, radice singulari, tenui, superuacua.

LOCVS.

Idem. In maritimis maximè nascitur.

QUALITATES.

Gale. 8. Succum obtinet, velut Thymali validum, non tamen admodum vtilem.

VIRES.


DIOSC. Vires habet Peplo similes.



SCAMMO.

SCAMMONIA, Græcis, Σκαμμόνια. Mauritanis, *Scammonea*. Italis, *Scammonia*.

SCAMMONIA.



FORMA.

Ramos ab radice mittit proscutium cubitorum, multos, pingues, & nonnihil crassitudinis præferentes, folijs helxine, seu hederaceis, mollioribus tamen, & triangulis, flore candido, rotundo in calathi modum cauo, graueolente. Radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo prægnante.

LOCVS.

Nascitur in Mysia Asia Idem. regione, quin etiam in Syria & Iudæa.

QUALITATES.

Exuperat in ea acredo, Mesue. quare corporis spiritus accendit, flatus mordaces gignit, immoderatas alui fluxiones facit, intestina abradit, tormina, & dysenteriam excitat.

VIRES.

Succus per inferna bilem & pituitam extrahit. Illinitur viliter Ischyadicis proscutium. Radix in aceto decocta, & cum hordeacea farina trita. Succus cum melle, aut oleo illitus tubercula discutit. Decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diurni capitis dolores ex aceto perfunduntur.

*SCAMMONIA Monspeliensium, vel marina, Periploca repens.

SCAMMONIA MONSPELIENSIVM.

FORMA:


Folijis & floribus Apocyno similis est, superficie duorum cubitorum & fortasse multo altior alicubi, radice cubitali, crassitudine minimi digiti, intus subflava, foris fusca, subrufa modice, friabili, inter mandendum crepitante parum, & si diutius ori teneatur acris est cum aliqua dulcedine. Nervus intus est flavus, qui fractus minimis foraminibus plenus est, caules siue rami cœcaui, qui primo ortu sunt erecti, postea repunt ut in volubili.

QUALITATES.

Calida est ultra tertium gradum.

VIRE.

Quidam vtuntur huius herbæ succo, vbi Scammonio destituuntur, & Massilienses ferunt eodem & colophonia Scammonium adulterare tam exacte vt vix cognosci queat.*




CHAME-

NOMINA.

1973

CHAMÆLEA, Græcis, Χαμῆλαια. Mauritanis, Mezereon, seu Almezerion. Italis, Chamelea. Germanis, Zylandt. Gallis, Boys gentil.

CHAMÆLEA.



FORMA.

Surculosa fruticat, ramis dodranta- DIOSC.
libus, folia oleæ similitudinem habent,
tenuiora, & amara, quæ gustata lin-
guam mordent, & arteriam deradunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

Matth.

QUALITATES.

Vincentem habet qualitatem ama- Galen. &
ram, quamobrem admodum sordida sin. me.
vlcera, & quæ maximas habent crustas
cum melle purgare potest.

VIREs.

Pituitam, bilēque detrahit, folijs DIOSC.
in catapotio deuoratis. Folia cum mel-
le trita sordida vlcera, & crustosa re-
purgant. Cauendum ab eius vsu, nisi Matth.
ea admista fuerint, quæ eius deleteri-
am facultatem superare possunt, de
quibus scripsit Mesue.

* CENSURA.

An sit Arabum Mezereon non parum adhuc dubitatur, cum Mesues hoc
dicat esse ex herbis lactarijs.*

THYME-

THYMELÆA, Græcis, Θυμαία. Italis, Timelea.

THYMELÆA.

FORMA.

DIOSC. Virgas ædit pulchras, multas tenues, binum cubitorum, folijs Chamelezæ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gammosisque si mordeantur. Flore candido. Fructu myrti modo rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit. Involucrum fructus durum, foris nigrum, intus album.

LOCVS.

Idem. Prouenit in altis montibus, & asperis.

QUALITATES ET VIRES.

Idem. Semen per inferna bilem, pituitas, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur, verum fauces adurit. Itaque cum hordeacea farina, aut in vix acino dari debet. Herba stomacho infesta.

CENSURA.

Decipiuntur qui Cneoron Theophrasti, cuius duo ab eo produntur genera. Alterum quidem Chamelzam, alterum Thymelzam esse contendunt.



SAMBY.

SAMBUCVS, Γράκισ, Ἀζνῆ. Arab. *Jasadi*. Italis, *Sambuco*. Germanis, *Holder*. Hispanis, *Sabuco*, seu *Caninero*. Gallis, *Suseau*, seu *Suyer*.

SAMBUCVS.

GENERA.

Quatuor habet genera. Do- *Matth.*
mesticum, Montanum, Aqua-
riticum & Minus, quod Ebulus
vocatur.

FORMA DOMESTICI.

Arbor est surculos mittens *Diosc.*
arundinaceos, teretes, cauos, *Matth.*
radicantes, proceros, medul-
la intus candida, ac fungosa,
folia inglandis terna, quater-
nae ex intervallis circa ramos
exeunt graeolētia, minutim
in ambitu secta, & in ramulo-
rum cacuminibus cauliculisq;
circinatae spectantur umbellae,
quae florē candidum pariunt,
odore non ingrato, mox aci-
num in nigredine subpurpu-
reum racemosum, succo ma-
dentem, vinosumque.

L O C V S.


Nascitur passim, vbique in *Matth.*
sepibus, & circa vrbes.

Q V A L I T A T E S.

Desiccandi, conglutinandi, *Gale. 6.*
modiceq; digerendi faculta- *simp. me.*
tem obtinet.

V I R E S.

Vis illi detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum modo decoquun- *Diosc.*
tur ad pituitam, bilemque detrahendam, caules teneri in patinis cocti eadem
efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuvat; prodest, &
viperarum moribus, eodem pota modo. Vulvas emollit insidentium deco-
cto. Parefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino decocti eodem
funguntur munere. Praeterea folia ex hordeacea farina illita inflammationes
mitigant, ambustis, & canum moribus illita profunt. Vlcerata quae dehiscunt in
fistulam agglutinant. Illinuntur vtiliter podagricis cum seuo taurino, aut hir-
cino. Stillatoria è floribus aqua fronti, & sincipiti illita, capitis dolores mulcet, *Matth.*
succus è radicis cortice expressus, vomitum valentissimè commouet, & aquam
intercutem pellit.



SAMBYCVS montana, Græcis, ἀνθή δεινή. Italis, *Sambuco montano*.

SAMBYCVS MONTANA.

FORMA.

Matth. Virgis folijsque vrbano similis est, sed minori longè proceritate adolescit. Flores non in vmbellis, sed racematim cohærent. Quin etiam baccæ in vuz modum dependent, rubro perpetuo colore, vinosæ ac succi plenæ.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montosis, & algentibus locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Vires illi vrbano per omnia similes, imbecilliores tamen.



SAMBU-

SAMBUCVS aquatica, Italis, *Sambuco aquatico*. Germanis, *Schwefelst.*

SAMBUCVS AQUATICA.

FORMA.


Virgis est sambuci domesti- *Matth.*
ci æmulis, genicularis, alba in-
tus medulla, sed caduca, & fra-
gili materie. Folijs viriginis.
Flore albo Sambuci modo,
odore non inuicundo, à quo
baccæ prodeunt rubentès,
oxyacanthæ magnitudine, vi-
noso, ac amaro succo refertæ.

Locvs.

Nascitur in aquosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Baccæ deuorata vomitio-
nes citant. Succovis est abster-
foria.



FRANGULA, Italis, *Frangola*. Germanis, *Saulbaum*.

FRANGULA.

F O R M A.

Matth.

Arbor est mediocris, pœnitatis, folio ferè corni, aut virgæ sanguineæ, cortice Alni, albis maculis exterius resperso, interius verò adeo flavescente, ut si mandatur croceo colore inficiat, Rhabarbari modo. Flores edit albos, fructum paruum pisi magnitudine, per medium diuisum, adeo ut duabus simul baccis constare videatur. Is primo exortu viret, deinde rufescit, postremò verò nigricat. Duo intra se habet oscula lupinorû figura, sed lentibus paulò grandiora. Ligni materies omnino fragilis, imbecillaq; est.

L O C U S.

Idem.

Nascitur passim in Boemiar sylvis, & nemoribus.


Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Cortici vis inest cum aluum exoluens, tum quoq; adstringens. Quare Rhabarbari modo operatur, quæ in extimo tantum

cortice habetur, exoluit. in intimo verò adstrictoria viger facultas. Bilem eius decoctum, & pituitam expellit. Quinetiam hydropicorum aquas ducit. Decoquitur cortex cum aperientibus medicamentis ad cachexiam, ictericam, & aquam intercutem. Daturq; potandum decoctum quatuor vnciarum pondere per quam commodè. Sed prius corpus expurgari debet. Soluit aluum absque incommodo, belle iecur expurgat, & roborat, aperit omnium viscerum obstructions, & vasa à crassorum excrementorû infarctu expedit. Delibrantur cortices in ipso veris principio, & in umbra siccantur. Recentium enim nullus debet esse usus, quod vomitiones moueant. Decoctum quod ex ijs paratur quiescat prius oportet, antequam propinetur duobus, aut tribus diebus, quousq; flauus color niger fiat. alias vomitiones mouere quandoq; solet.

EBVLVS,



EBVLVS. Græcis. Καμαίχνη. Arabibus, Kameakti. Italis, Ebulo, seu Nebbio. Germanis, Attich/ seu Diderhester. Hispanis, Hiez guos, seu Subugo pecquenno. Gallis, Hieble.

EBVLVS.

F O R M A.


Sambuco longè humilior Diosc. est, magisq; herbaceo generi assignandus, caule quadrangulo geniculato, folijs amygdalæ ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu ferratis, muscario sambuci, flore & acino eiusdem. Radice nititur longa crassitudine digitali.

L O C V S.

Nascitur in plateis, & are- Matih. is, secus vias, & in templorum claustris.

V A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Ea omnia præstat, quæ vir- Diosc. bana sambucus.



APIOS, Græcis, *ἄπιος*. Italis, *Apios*.

APIOS.

FORMA.

Diosc. Iunceos ramulos duos, siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis. Semine paruo. Radice in formam pyri turbinata. Succo fœcunda, cortice exterius nigro, intus verò candida substantia.

L O C V S.

Theoph. Nascitur in montibus.

lib. 9. c. 10.

dep. hist.


QUALITATES.

Idem. Datur ad expurgandū corpus, quod altera radice parte superius, altera inferius purget.

V I R E S.

Diosc. Superior eius pars vomitione bilem, pituitamque extrahit, inferior per aluum. Totā vtrinque purgationes mouet. Purgat vtrāque parte succus sesquibolo potus.

PSEUDO-



PSEUDO Apios. Italis, *Apio falso*. Germanis, *Erdnüss*.

PSEUDO APIOS.

FORMA.



Multiplīcī crescīt caule, cu- *Matth.*
 bitali, ac sēpē maiori, humi
 procumbente, pisi ferē mo-
 do, folijs oblongis, & subaspe-
 ris. Floret Iunio præsertim
 mense floribus puniceis, pisi
 æmulis, odoratis, racematim
 cohærentibus, è quibus filicu-
 læ oriuntur, in quibus semen
 concluditur. Radices habet
 fici, aut pyri figura ternas, qua
 ternasve è staminibus depen-
 dentes, filipendulæ modo, ni-
 gra exterius cute, & alba in-
 tus pulpa, nulla purgatoria vi
 prædita.

LOCVS.

Nascitur cum in campis, *Idem.*
 tum in vineis.



Q99 3

: Colo-

COLOCYNTHIS, Græcis; Κολοκυνθίς. Arabibus, Chandel, Handel, seu Halendal. Italis, & Officinis, & Hispanis, Coloquinrida. Germanis, Coloquint / seu Wurkürbiß. Gallis, Coloquinte, seu Courge sauvage.

FORMA.

COLOCYNTHIS.

Marth. Folia, & sarmenra emittit Anguriæ vulgo vocatæ, per terrâ repêtia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum.

L O C U S.

Idem. Scriitur in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Colocynthis gustu amara est, **simp. me.** sed quæ amarissimo medicamento epoto ad sunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facilitatem, quam validam in se se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, ante & ipsa per aluum excerni præuertens.

V I R E S.

Diosc. Medulla fructus purgatoriæ vim habet, si quatuor obolis in aqua mulla, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogatur in cataplorium. Arefactæ pilæ puluis clysteribus infusus prodest nervorum resolutioni, coxendicæ doloribus, & coli vitij, ut quæ bilem, pituitâ, & strigmenta, interdum etiam cruorê eliciunt. Forus ad mota pilæ enecat, si aqua mulla,

aut passum, in eadē incoquatur, & sub dio refrigerat. potu crassum humore, & alui strigmenta detrahit. Stomacho supra modum aduersatur, sabdita pro balano alui excrementa eiecit. Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur. Potu cerebrum, & nervos expurgat, quin etiâ musculos, thoracem, & pulmonem. Quare vertiginosis, comitialibus, resolutis, conuulsis, hemicrania, diurno quoque capitis dolore affectis, asthmaticis, & ægrè spirantibus vtiliter in cataplorijs exhibetur. Collachrymantes adiuuat oculos, & diutina tussis laborantes. Est præterea vis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores. Pellit aquas tam pota, quam clysteribus infusa. Fit è fructu oleum ad retardandam canitiem, denigrandos capillos, & eorum defluuium cohibendum, si exempta è fructu pulpa, cavitatis oleo repleatur, & in cineribus calidis coquatur. eo mulcentur aurium dolores, atque fontus discutiuntur. Quin etiam oleo ipso, & felle bubulo, interaneorum vermes necantur, si calida umbilico illinantur.


EPIPHY-



Mesue.

EPITHYMVM, Græcis, *Επίθυμον*. Mauritanis, *Efitimo*, seu *Eficicho*. Italis, *Epithymo*. Hispanis, *Cabellos*, seu *flores del Tomilbo*. Gallis, *Teigne de Tym*.

EPITHYMVM.



FORMA.

Capillamenta sunt Epithy. *Matth.*
mum tenuiora, quæ thymo ad
nascuntur flauo colore, flori-
bus, & capitulis, perinde ac in
cuscuta vocata.

LOCVS.

Nascitur, & viuit super thy. *idem.*
mi plantas apricis præsertim
locis, & ab austro perflatis.

QUALITATES.

Thymi facultatem habet, *Galen. 6.*
ad omnia tamen efficacius est. *simp. me.*
Desiccatur enim & exalfacit or-
dine tertio.

VIREs.

Potum cum melle pituitam *Diosc.*
bilemque atram per inferna de-
trahit. Priuatim prodest me-
lancholicis, & inflatis aceta-
buli mensura, ad quatuor

drachmas cum melle, sale, & aceti exiguo. Valentius cæteris alijs medicamen-
tis atram bilem expellit, citra ullam molestiam. Efficax est ad cerebri morbos, *Meus.*
nempe melancholiam, Epilepsiam, diurnos capitis dolores, aliasque atrabilia-
rias ægritudines. Cõfert cordis tremoribus, & animi deliquijs, opitulatur eam
ob causam omnibus lienis affectibus. Item renum vitijs, & hypocondriaca me-
lancholia vexatis optimè confert Epithymi vsus. Datur quoque vtilissimè aduer-
sus carcinomata, Elephantiasim, & vlcera maligna, & atra, & quartana febre af-
fectos liberat.

CVSCVTA, Italis; *Cuscuta*. Germanis, *Flachspiden*. Gallis, *Couche in iey*.

CVSCVTA.

FORMA.

Matth.

Eius est natura, ut in frutices, & herbas Epithymi modo, profiliat, & viuat, earum adinniculo fulta, nulla radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodeuntibus cirris, capillamentisve longissimis. Hæc statim ab exortu plantis sese implicat, & adeo crebris inuolucris, his se circumuoluit, ut breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Folijs nullis vestitur, flores tamen edit albos complurimos, quibusdam in capitulis, à quibus semen tenue prodir, sed superuacuum cirri rufescunt, vitium capreolis crassitudine, & facie pares.

Locvs.

Idem.

Nascitur fere vbiq; atque in sæpibus, aut propè eas frequens visitur varijs, ac diuersis plantis connexa.


QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Excalfacit ordine primo, siccaturq; secundo, abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit. Infarcti lienis vitia expedit, venas pituitosis, atq; biliosis exonerat excrementis, urinas pellit, & regium morbum sanat. Puerorum febribus auxiliatur, sed diuturno vsu ventriculum grauatur, quæ tamen noxa tollitur admisto Anisi semine.

CENSURA.

Non rectè sentiunt qui Plinij, *Cassytam* in Syria nascentem nostratam *Cuscutam* faciunt.



ALYDVM; Græcis, ἄλυπον. Italis, Alipo.

ALYDVM.

FORMA.

Surculosa herba est, subru- DIOSC.
bra, gracilibus ramulis, tenui-
bus folijs, flore molli, leui, &
copioso, radice betæ, tenui a-
tri succo referta, semine Epi-
thymi.

L O C V S.

Gignitur in maritimis ma- Idem.
ximè Libiæ quàm largissima,
quanquam alibi quoque plu- Martb.
rima prouenit.

Q U A L I T A T E S,
ET V I R E S.

Semē atram bilem deijcit, Idem.
si mēsurā Epithymo pari cum
sale, & aceto sumatur. Verūm
interanea leuiter exulcerat.



Q 99 5

VITIS

VITIS sylvestris, vulgo Dulcamara. Græcis, ἀμπέλῳ ἀγρία. Italis, Vite saluatica.
Germanis, Zelengetje lieber.

F O R M A.

Diosc. Sarmenra mittit prælonga
vitis viniferæ modo, aspera,
lignosa, folijs hortensis Solani
longioribus, ac latioribus,
racemoso flore, & capillaceo,
fructu exiguis vuis simili, post
maturitatem rubente, totun-
da acinorum facie.

L O C Y S.

Matth. Nascitur in dumetis, sepi-
bus, sylvis, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Racemi absterge di vim ha-
simp. me. bent, sed & adstrictione quan-
dam extrema germina tenet.

V I R E S.

Diosc. Feruefacta radix in aqua, &
in ciathis duobus vini aqua
marina diluti pota, humorẽ
alui ciet. Ideo hydropicis da-
tur. Vire eius viria cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viri-
culæ cibi gratia sale conduntur.



VITIS alba, siue Bryonia. Græcis, ἀμπέλκιον & ἰατρικὴ. Mauritan. Fesire, Alfesire, Fesse-
ra seu Alfescera. Italis, Brionia, seu zucca saluatica. Germa. Stictwurty seu Zey-
felsfürbß. Hispanis, Neuxa, siue Anorca. Gallis, Colabrine, seu Couluree.

VITIS ALBA.



FORMA.

Folijis viticulis, pampinisq; **Diosc.**
satiâ vitē imitatur, sed hir-
sutiora sunt omnia. Ea quos
prope nata frutices, suis cla-
uiculis completitur. Fructus
rubens in vua dependet, quo
coria pilis spoliatur. In Ger- **Matth.**
mania, & Vngaria fructū ferr
nigrum.

LOCVS.

Prouenit passim secus vias, **Idem.**
& propter sepes.

QUALITATES.

Prima germina adstringūt
modicē cū quadā acrimonia,
& subamarore. Radix abster-
gentem, desiccantem, & te-
nuium partium, ac moderatē
calidam vim obtinet, corym-
bi depilatorij sunt.

VIREs.

Folia, fructus, & radix vlce- **Diosc.**
rum phagædenis, cancrenis,
chironijs, putrentium tibiârū
tædio efficaciter cum sale illi-
nuntur. Radix corpus abster-
git, & cutē erugat, vitia cutis

in facie varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat: cum Eruo, Creta
Chia, & sænogræco, suggillata rollit, & redunias cōmittit, suppuraciones rum-
pit. Infracta ossa extrahit trita, & imposita. Datur comitialib. in potu drachmæ
pondere quotidie anno toto. Prodest attonitis, vertiginosisque eodem modo
sumpta. Auxiliatur contra viperarum ictus pota duarum drachmarum ponde-
re: subposita partus, & secundas trahit, & pota ciet vrinam. Lienem consumit,
ternis obolis triginta diebus ex aceto bibita. Illinitur ad eadē cum fico, ad mu-
liebres quoque infessus decoquitur, siquidem vuluas purgat, sed abortum fa-
cit. Succus cum aqua mulsâ porus pituitam extrahit. Ad psoras & lepras, semen
efficaciter illinitur. Idem vrinam trahit & cerebrum mundat, viscerum ob-
structiones aperit, renes à calculis expedit.

VITIS nigra, Græcis, ἀμπέλ & μέλαινα. Arabibus, *Fesire sentanim* als *fesiresim*, seu *Fasersim*. Gallis, *Vite nera*, seu *Tamaro*.

VITIS NIGRA.

F O R M A.

Matth. Folia fert hæderæ, sed maiora, smilaceis proxima, caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula cōprehēdit. Fructus racematim cohærent, qui inter principia virent, & post maturitatem rufescunt, & quandoq; nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxæo colore niter.

L O C U S.

Idem. Nascitur in dumetis, in sepibus, & in sylvis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Viti albæ ad omnia similis,
simp. me. nisi quod imbecillior.

V I R E S.

Diosc. Viticulæ quæ primo germi-
nata erumpunt in olera reci-
piuntur, menses pellunt, vri-
nam cient, liēnem absumunt, vertiginosis, comitialibus, & resolutis profunt.
Radix eadem quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis
Matth. iumentorum ceruicibus commodissime illinuntur. Quin etiam luxatis articu-
lis. Nihil eius radice succo valentius fuerit ad strumas sanandas, si cum vini ac
mellis æquali portione is hauriatur. Præstat ad idem quoque eadem radix, si tu-
fa, & melle exeepta illinatur.



MOMORDICA, seu Viticella. Italis, *Balsamina*, *Viticella*, *Momordica*, seu *Pomo di Gierusalem*. Germanis, *Balsamtraut* *Männlin*. Gallis, *Marueilles*.

BALSAMINA, SIVE MOMORDICA.

F O R M A.

Planta est, quæ prælogis, te- *Matth.*
nuibusq; viticulis vltro, citro-
que reptantib. proximas plan-
tas cõprehendit, folijs vitis al-
bæ, aut viniferæ similibus, sed
longè minoribus, magisq; per
ambitum diuisis, capreolis te-
nuibus ex alarum sinu prode-
untibus, quibus sese appositis
implicat adminiculis. Florem
promit cucumeri similem, par-
uum, sublutuum. Fructû vtrin-
que turbينات, gallinacæ fe-
rè oui magnitudine, cute car-
nosa, acutis tuberculis scatente.
Huic maturo puniceus color,
qui præterea facile dissilit
vltimam maturitatè adeptus.
Semen includit Anguriæ vo-
catæ simile, minus tamen, con-
tectum cute crassâ pingui, lu-
brica, & perquam rubente.

L O C V S.

Nusquam nisi sata in Italia *Idem.*
prouenit, vbi in hortis, & ficti-
libus colitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Folia vulnera recentia glutinant. Fructu in oleo immaturo insolato, paratur *Idem.*
oleum præstantissimum ad arcendas vulnerum mammillarumque inflamma-
tiones, & dolores mulcendos. Valet idem Siphone infusum ad exulceratos, in-
flammatosque vteros. Doloribus hæmorrhoidum quoque mirificè auxiliatur;
in quem vsum Fructus oleo Amygdalino dulci, aut de semine lini macerantur.
Idem medetur ambustis tam igne, quàm aqua: punctis, sauciatisque neruis vti-
liter illinitur: quin etiam vulnerum cicatrices delet, & vesparum ictus sanat. Fo-
liorum pulvis cochlearis mensura ex equiseti decocto porum, intestinorum
vulneribus medetur.

BALSAMINÀ altera. Italis, *Balsamina maggiore, siue femina*. Germanis, *Balsam-
frant Weible*.

F O R M A.

Marth. Caulis illi est crassus sesqui-
cubitalis, pinguis, & succo
prægnans, ramis multis abun-
dè vegetibus. Folia profert Sa-
licis modo longa per ambitū
ferrata, flores prægrādes pur-
pureos retro inflexè caudica-
tos. E quibus poma suborin-
tur, alterius Balsaminæ haud
admodum dissimilia, turbi-
nata, hirsuta, viridi primū cō-
lore, & per maturitatem lu-
tescente: internum semē len-
ticulæ faciem exprimit. Ra-
dice nititur numerosa, crassa,
robustaque.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis, & fœtili-
bus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Putāt quidam (id quod et-
iam scribunt) & hanc ipsam
esse cum altera viribus. Verū nos nullam eius experientiam habemus.

BALSAMINA ALTERA.



FILIX, Græcis, *Πτελες*. Arabibus, *Sarax*, seu *Sarachs*. Italis, *Felce*. Germ. *Walde*,
farn. Hispanis, *Helechoyerua*. Gallis, *Osmunda Regale*, seu *Fengiere masse*.

F I L I X.

G E N E R A.

Duo eius habetur genera, *Diosc.*
Mas & *Femina*.

F O R M A M A R I S.

Filici folia, sine caule, sine *Idem*.
fructu, sine flore ex vno pedi-
culo cubitali longitudine ex-
eunt, multifida, è laterib. pri-
uata, & expansa velut ala, sub-
gravi odore. Radice per sum-
ma cespitum nigra, oblonga,
filices multos fundente, sub-
stringenti gustu.

L O C U S.

Nascitur in montibus, & *Idem*.
saxosis. Quin etiam alibi vñ *Matth.*
brofis locis.

Q U A L I T A T E S.

Mas radicem habet maxi- *Gal. li. 3.*
mè vilem: latum enim lum- *simp. me.*
bricum interficit. Est enim a-

mara, paulum habens adstrictionis, valentem desiccandi facultatem obtinet,
nec tamen mordax est.

V I R E S.

Radix ex aqua multa pota quatuor drachmarum pondere latas vëtris tineas *Diosc.*
excudit. Laborantes lienis incremëto recreat. Radix cum pota, tum cum axun-
gia illita, vulneribus sagitta arundinea factis, medetur. Est enim inteream, & *Matth.*
arundinem non parua inimicitia.

FILIX fœmina, Græcis, *ὄνυξις*. Italis, *Felce femina*.

FILIX FŒMINA.

FORMA.

Diosc. Filix fœmina folijs est alterius filicis, furculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa pediculo fulciantur. Radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent, aliæ etiamnum rubræ inveniuntur.

LOCVS.

Matth. Nascitur in sylvis, & in montibus, & ferè ubique, maxime frigido solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Radices pellunt cum melle sumptæ lata interaneorum animalia: cum vino aut drachmis tribus teretes tineas eijciunt. Datæ fœminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Iumetorum cervicibus medetur. Foliarecentia in oleribus cocta manduntur ut ventrem emolliant.




FILICV-

FILICVLA, Græcis, Πολυποδίου. Mauritanis, Bûberg. Aibeig. siue Bessaigi. Italis, Polipodio. Germanis, Engelsfuß/ Baumfarn/ siue Dropffwurk. Hispanis, Filipo-
dio, & Polipodio. Gallis, Polypode.

FILICVLA, SEV POLYPODIUM.

FORMA.



Palmari altitudine assur- Matth.
git, filici similis, subhirsutis,
& robustioribus folijs, aduer-
sa parte fulvescentibus, ma-
culis respersis. caulē, florem,
fructumq; nullum profert.
radicibus nititur per summa
cespitum vagantibus, poly-
porum piscium cirris simili-
bus, vnde illi nomen, fibris,
pilisq; propē innumeris re-
fertis, colore exterius subful-
vescente, interius verò viri-
di, sapore dulci, & austero si-
mul.

Locvs.

Nascitur in muscosis pe- Diosc.
tris, & vetustis arborum cau-
dicibus, præsertim Quercu-
um.

QUALITATES.

Dulcem simul, & austeram Galen. 8.
habet vincentem qualita- simp. me.
tem, vt facultatis sit admo-

dum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRE S.

Purgandi vim habet, coquitur cum gallina, aut piscibus, aut bera, aut malua, Diosc.
ad aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mulsæ inspersa detrahit bilem, & pi-
tuitam. Trita luxaris efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos
sunt. Bilem præsertim atram extrahit.

Rrr

Actuari-
DRY-O-M.

DRYOPTERIS, Græcis, *Δρυόπτερις*. Italis, *Felce Quercina*. Germanis, *Wundtarn*. Gallis, *Fuchiere des chesnes*.

DRYOPTERIS.

FORMA.

Diosc. Filici similis, sed multo minori foliorum incisura. Radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis in dulcedinem vergentibus.

LOCVS.


Idem. Nascitur in veterum Quercuum musco.

QUALITATES.

Gal. 6. Gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amarā, in radice vero item acerbam, facultatem habet septicam.

VIRES.

Diosc. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim postquam corpus exudauerit, mox sudor abluatur, & recens imponitur.



CNICTO

CNICVS, Græcis, Κνικος. Mauritanis, Kartan, seu Chariban. Italis, Zaffarano Sa-
racinesco. Officinis, Cartamum. Germanis, Wilder Saffran. Hispanis, Ala-
sor, & semente de Pappagayos. Gallis, Saffranbastard, & saffran sauuage.

CNICVS.

FORMA.



Singularem emittit caulem Matth.
sesquipedalem, & quandoq;
maiolem, teretem, rectū, sub
albicantē, striatumq; firmū,
atq; lignosum, ramis à medio
caule copiosis dodrantalibus.
Folia oblōga, crassiuscula, ro-
busta, glabra, in mucronē de-
sinentia, infirmis aculeis cir-
cumuallata, & sine pediculis ē
ramis pdeuntia. spectantur in
ramorū summitatibus acana-
cea capitula in latū turbinem
fastigiata, oblōgis ac spinosis
squamis radiantib⁹ circūqua-
que, ima partefoliolis, aculeis
pariter rigentibus, & syderis
faciem referentib. Flores me-
dijs ē capitibus erumpunt, ca-
pillacei, ac graciles, vt in cete-
ris acanaceis, aureo colore,
ad rubrum inclināte, crocinis
staminibus æmuli. Semē ineft
album, angulosum, leui puta-
mine ac duro, albaintus me-
dulla. Radice nititur oblōga,
fibrata, sed superuacua.

LOCVS.

Seritur in hortis & campis. Idem.

QUALITATES.

Semine duntaxat ad purgationes vimur, terrij est ordinis exalfacientium, Galen. 7.
si quis foris eo vti volet. simp. me.

VIREs.

Seminis tusti & delibrati medulla ex aqua mulsā aut iure gallinacei aluū pur- DIOSC.
gāpetat. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendū alui facultate do-
nat. Idē piritam, & aquas extrahit, quo fit vt coli dolore affectis, & hydropicis
opē mirificē præstet nō modo haustum, sed etiā clysmate infusum. Seminis me-
dulla, à putaminibus repurgata, & saccharo eclegmaris modo excepta pectus,
& pulmones abstergit, vocem clarificat, & prolificum semen auget.

MERCVRIALIS, Græcis, *Αινοζέσις*. Italis, *Mercorella*. Germanis, *Singeltant*. Hispanis *Mercuriale*, & *virtigua morta*. Gallis, *Mercuriale*.

MERCVRIALIS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Mas alterum. Alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Frutex est dodrantalis, aut maior, folijs Ocimi, helxinæ cognatis, sed minoribus, ramis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis; fructu è foliorum sinu pendente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnà cohærentibus.

L O C V S.


Matth. Nascitur in hortis, vineis, vrbium plateis, & inter rudera.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Mercuriali vtuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. verum enim vero, si quis eius facere periculum vult in cataplasmate, sanè eam digerentis admodum facultatis esse experietur.

V I R E S.

Diosc. In oleribus manditur ad aluum ciendam, cocta in aqua epoto iure bifem, aquamq; detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ illam si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur. Observarum quoque est tolli verrucas omne genus illitis vtriusque folijs, aut eorum succo. Malis item quæ serpunt succus cum aceto medetur. Fœmineis locis supposita menses ciet.



MERCVRIALIS fœmina, Græcis, *Αιρόζωσις θήλυς*. Italis, *Mercorella femina*. Germanis, *Vingeltraut Weible*. Gallis, *Mercuriale femelle*.

MERCVRIALIS FOEMINA.



FORMA.

Caule, ramis, folijs per o- *Matth.*
mnia alteri similibus pro-
uenit. verùm fructu dif-
fert, quod in hac racemo-
sum spectetur & semine co-
piofo.

LOCVS.

Nascitur fimul cum ma- *Idem.*
re ijsdem locis.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ad fimili Mari facultate *Idem.*
præstat, nifi quod hæc à
purgatione bibita fœmi-
nas gignat, illa mares.

CYNOCRAMBE, siue Canina brassica. Græcis, Κυροζάυλη. Italis, Mercorella-
starda. Germanis, Wild Bingeltraut. Gallis, Mercuriale sauvage.

CYNOCRAMBE MAR.

F O R M A.

Diosc. Cauliculum binū dodran-
tū altitudine emittit, mol-
lem subalbidum, folia mer-
curiali, aut hederæ similia,
certis interstitijs, subalbida,
femen folijs adhæret paruum
rotundum.

L O C U S.

Matth.

Nascitur omnibus ferè lo-
cis in vineis, campis, & pro-
pter vrbiū mœnia. * frequen-
tissima vero in syluis proue-
nit. *

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc.

Folia cum caulibus pota al-
uum cient, oleribus commen-
dantur. Ius decocti & pitui-
tam, & bilē, & aquas detrahūt.



*CYN-

*CYNOCRAMBE FŒMINA.

FORMA.

Tenerior est & mollior quam mas, quum prodit veris initio flosculos racemosos vt Mercurialis vulgaris fœmina proferens. Temporis progressu decidentibus flosculis euadit multo durior, & foliorum longitudine tantum à mare discernitur.

LOCVS.

Locis montosis & syluis annascitur.*



Rrr 4

HELIO-

HELIO TROP I V M maius, Græcis, *Ηλιοτρόπιον μέγα*. Officinis, *Verrucaria*. Italis, *Eliotropiomaggiore*.

HELIO TROP I V M MAIUS.

G E N E R A.

Diosc. Heliotropium duū est generum, Maius, & Minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folia habet Ocimi, hirsutiora, candidiora, & maiora, ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis. concavi. Flos in cacumine. candidus aut subfulvus, incurvatus, vt scorpionis. cauda. Radix tenuis est, & inutilis.

L O C Y S.

Diosc. Nascitur in asperis. Quin-
Matth. etiam in ædificiorum plateis, in hortis, & agris incultis, & fabulosis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Diosc. Herba ex aqua decoctum fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilemque per alium extrahit. Prodest in vino potum, quin etiam ad motum, ad scorpionum ictus. Ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnam ante accessiones seminis grana quatuor cum vino pota quartanas finire, tria verò tertianas. Illi- rum semen fornicantes verrucas, penilesque; & thymos exicat. Folia podagricis, luxatisque vulissimè illinuntur. Menses cient, partus trita, & imposita pellunt. Eporum horum decoctum vna cum cumino renum calculos pellit, ac frangit, & intestinorum animalia necat. Formicæ quoque necantur earum foraminibus Heliotropio obturatis. Foliorum succus carcinomatis, ac contumacibus ulceribus mirificè auxiliatur illitus.

Matth.



HELIOTROPIUM minus, Græcis, *Ἡλιοτρόπιον μικρόν*. Italis, *Heliotropio minore*.

HELIOTROPIUM MINUS.



FORMA.

Heliotropium paruum fo- Diosc.
lijs est antedicto proximis, ro-
tundioribus, semine acrochor-
donum, verrucarumq, modo
pensili, rotundo.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & *Idem*.
iuxta lacus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Herba cum suo semine po- Diosc.
ta adiecto nitro, hyssopo, na-
sturtio, & aqua laras tineas, te-
retesque excutit. Pensiles ver-
rucas, quæ acrochordones vo-
cantur, cum sale illita tollit.

* Huius herbæ baccis vtun-
tur infectores lanarum in Gal-
lia Narbonensi, vocantque *la*
Morella.*

Rrr 5

SCORPIO-

SCORPIOIDES, Græcis, Σκορπιοειδής. Italis, Scorpioide.

SCORPIOIDES.

FORMA.

Matth. Herbula est folijs paucis, semine caudæ scorpionis effigie.

LOCVS.


In hortis tantum hâc plantam satam vidimus.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit ordine tertio, deficcat verò secundo.

VIRES.

Gal. li. 8. Illita scorpionum ictibus,
simp. me. præsentaneo est auxilio.



VITIS

VITIS vinifera, Græcis, *Ἀμπέλ* & *ἐνδοχὴ*. Italis, *Vite vinifera*. Arabibus, *Harin Karin*, seu *Karm*. Germanis, *Weinreb*. Gallis, *Vigne*.

VITIS VINIFERA.



F O R M A.

Vitium omnium genera, ac formas adeo tam clavis, quam obscuris viris, tam nobilibus, quam ignobilibus, tam deniq; vrbanis, quam rusticis innotuerunt, vt nemo sanè sit, qui nō de vitium generibus, eandemq; historiam scitè, ac distinctè loqui possit.

Q U A L I T A T E S.

Folia refrigerant, & adstringūt. D I O S C.
Idem præstant & capreoli.

V I R E S.

Folia & triti capreoli capitis dolores illitu mitigant, & inflammationes stomachi, ardoresque cum hordeacea farina. Potus eorū succus dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & gravidarum malacijs medentur. Eadem efficiūt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lachryma quæ velut gummi in caudicibus concrescit, ex vino pota calculos pellit, illita lichenas, & psoras, leprasque nitro prius, perfrictas sanat. Eadem cum oleo pilis sæpius illitis psilothri effectum habet, maximeque sanies quæ ex accensis sarmentis exudaui, qua perunstæ verrucarum infectiones extrahuntur. Vinaceorum & sarmentorum cinis ex aceto illitus detractis in sede con-

dylomatis & thymis medetur. Prodest luxuris, & viperarum morsibus, & contra lienis inflammationem illinitur, cum rosacco, ruta, & aceto. Acerbæ vuz succus admissetur vilitet celiacorum & dysentericorum cibis, quin etiam medicamentis quæ ad sanguinis reiectiones parantur. Id quod etiam præstant acinorum nucleii in farinam triti, & ventri, stomachoquæ illiti. Vua pensilis matura, manibus confracta, & illita, recentibus ambustionibus misicè auxiliatur, statim enim dolorem mulcet. Vuz probè maturæ inter fructus autumnales principatū in cibis obtinent. Itaque fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; prauī succi habent. Pensiles si prius maturæ sunt, & dulces, cæteris minus ventriculum inflant, & aluum conuenienter emolliunt.

Matth.

Gal. 2. de alim. fac.